


TQK314
.W4



Kenneth K. Mackenzie
Collection

Bequest of
Kenneth K. Mackenzie
October 1934



ABK
ABK

C

Wenzel
Flora



Em. 2⁴

FLORA
POMERANO-RUGICA
EXHIBENS
PLANTAS
PER
POMERANIAM ANTERIOREM SVECICAM
ET RUGIAM SPONTE NASCENTES
METHODO LINNEANA
SECUNDUM
SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS
CUM
DIFFERENTIIS SPECIFICIS
NOMINIBUS GERMANICIS
OFFICIALIBUS PHARMACOPOEORUM
LOCIS NATALIBUS
TEMPORE FLORENDI
OBSCURIORUM DESCRIPTIONIBUS

AUCTORE,
CHRIST. EHRENFR. WEIGEL

BEROLINI STRALSUNDIAE ET LIPSIAE.
APUD GOTTL. AUG. LANGE

+QR314
W4

5695

AMPLISSIMO COETUI
GENEROSI SENATUS
INCLYTÆ REIPUBLICÆ
SUNDENSIS

VIRIS
MAGNIFICIS GENEROSIS
CONSULTISSIMIS
DOCTISSIMIS VIGILANTISSIMIS
DEXTERIMIS

abiens ad Academias exteris primordia
studiorum suorum humillime dicat
atque dedicat

C. E. WEIGEL,
Auctor.



VIRI MAGNIFICI
GENEROSSI CONSULTISSIMI
VIGILANTISSIMI.

Cui potius dicanda putem juveniliū studiorum meorum prima hæcce specimina, quam vobis, VIRI MAGNIFICI, qui omnis bonæ eruditionis disciplinas non amatis solum & diligitis, sed colitis etiam atque protegitiſ? Nec dubitandum, quin vobis præsertim attribuenda, quæcunque ex conaminibus meis proficiſci poterit, utilitas, cum per VESTRAM benevolentiam facillimus mihi potuerit

ad Bibliothecam VESTRAM aditus; ornatissimam quidem illam libris ut in omni scientiarum genere, ita & in Botanica præstantioribus. Ex quo favore quantum in investigandis patriæ plantis indigenis excitatus sim ac adiutus, non satis enarrare possum. Ne dedignemini itaque VESTRA, quæ VOBIS retribuo potius, quam offero. Valete, Valete diu optime, bonisque artibus & mihi favere pergit.

Dabam Sundiæ die 22 Februarii 1769.



LECTURIS AUCTOR.

Non omnem tellurem omnes ferre
plantarum species, sed diversas po-
tius eas in diversis progigni regionibus,
cum satis compertum sit; vix ullus dubi-
tabit, quin multum faciant ad perficien-
dam Rem Botanicam enumerationes plan-
tarum cujuscunque regionis indigenaruim.
Quæ magno quoque usui erunt iis, qui
illarum regionum plantas spontaneas ad

Medicos usus colligunt. Quod testabuntur Pharmacopœi nostri, quos sãpius, in visitationibus officinarum pharmaceuticarum publicis, de difficulti plantarum officinalium apud nos sponte nascentium collectione conquerentes audivi. Cum enim nesciant quibus in locis illæ sint querendæ, multas ab exteris regionibus siccas apportandas curare debent, quas minoribus sumtibus recentes intra patriæ limites colligere possent, si exstaret libellus loca, copiam earum producentia, indicans. Sunt quoque non pauci regionis nostræ incolæ, qui Botanicæ eum in finem operam navant, ut varias plantas dignoscere possint, quas ob usus Oeconomicos colligere eorum interest. His quoque gratus erit libellus earum, quas patria alit, plantarum

locæ

loca natalia exhibens. Quare non inutilis erit enumeratio omnium plantarum apud nos sponte provenientium, subjunctis locis natalibus, in quibus præcipua cujusvis plantæ reperitur copia. Quæ denique iis quoque, qui in hac regione, Botanices cultoribus fese adnumerantes, omnes plantarum spontearum species colligere cupiunt, haud parvæ erit utilitati, cum talem collectionem reddat faciliorem. Quam enim difficile sit conquirere omnes species plantarum in regione, cuius Flora indigena adhuc a nemine est enumerata, ejus rei veritatem ipse expertus sum, cum sex abhinc annis in colligendas & di-
gnoscendas plantas patriæ incumbere inciperem. Tali enim duce destitutus cum essem, omnia loca omnesque, necesse mi-

hi fuit, pererrare latebras, eaque diverso tempore iterata perquisitione lustrare, ut tandem quamvis plantam cum flore & fructu obtinerem; (nam deficientibus his partibus nil certi de quavis planta dijudicari potest;) id quod quantæ mihi fuerit molestia, & quoties frustraneas reddiderit excursiones meas, is solus perspiciet cui similis casus obtigit. Prodiit quidem in lucem Ao. 1764 Rev. Dni. Past. WILKE FLORA GRYPHICA, quæ, quanquam Gryphicas tantum recenseat plantas, multum tamen mihi profuit, cum ejus ope jam conjicere quodammodo possem, quænam apud nos nascantur plantarum species. Sed prorsus tamen non sufficit, cum sola loca natalia Gryphiam circumiacentia indicet, & præterea multæ in

Pome-



Pomerania ac Rugia occurrant plantæ quas
non fert Gryphicus ager; quapropter non
ingratum opus fore credidi, si, quæ sexen-
ni tempore observare & detegere potui,
publici juris facerem. Justo quidem fe-
stinantius prodire mihi videbatur hicce
libellus, cum forsan adhuc pauca quædam
deficiant, quæ, si licuerit, imposterum sup-
plere animus est; cum vero negotia al-
tioris momenti editionem hujus FLORÆ
non amplius differri jubeant, faciendum
mihi potius putavi, utile quoddam, licet
imperfectum, ut ederem, quam detecta
oblivioni traderem. Vix enim quis ite-
ratis vicibus tot visitabit patriæ nostræ lo-
ca, quot ego frequentavi. Alios enim
retinet negotiorum accumulatorum mul-
titudo; alios impedit provectiones, vel
valetu-



valetudinis status male tutus; alii denique tanti non faciunt Botanicem, ut ejus ductu omnes lubeant molestias, tempestatis injuriis ceterisque sese exponant incommodis, cum solummodo in finem ut plantas indigenas colligant. Quæ cum me a prosequendo plantarum cognoscendarum studio amoenissimo non detinuerint, conjecti me plerasque collegisse plantas, quas POMERANIA SVECICA & RUGIA alunt, spontaneas.

Definitiones plantarum in hocce libello enumeratarum ex Ill. Equitis de LINNE SPECIEBUS PLANTARUM desumsi, ubi quoque Synonyma sufficientia, qui querit, reperi et, quæ studio omisi, ut parceretur sumtibus, neque in molem cresceret libellus excursionibus Botanicis præ-

primis



primis accommodandus. Nomina Germanica, quæ colligere potui, apposui in gratiam Oeconomorum aliorumque, qui Latinam linguam non callentes aliquas nihilominus plantas ob suos usus cognoscere & legere cupiunt. Nomina Pharmaceutica in usum Medicinæ cultorum & Pharmacopœorum adjeci. Loca Natalia rariorū omnia, vulgarium vero nonnisi illa indicavi, quæ præcipuam alunt cujusvis speciei individuorum copiam, & a Sundia vel alia urbe non nimis remota existunt. Quorum Sundensibus abbreviatum nomen Sund., Gryphicis Gryph., Pomeranicis Pom., Rugianis Rug., Jasmundenibus Jasm., Wittowianis Witt. præmisī. Quæ vero a me ipso detecta non fuere, distinxī ita ut **Gryphica**, quot



ex supra memorata FLORA GRYPHICA
desumsi, uncis [] includenda curaverim,
ceteris vero apposuerim nomina eorum,
qui illa benevole mecum communicarunt.
Tempus florendi subjungere non inutile
judicavi, quo multis parceretur excursio-
nibus frustraneis, pateretque tempus quo
quævis planta perfecta esset reperienda.
Si quando dubius fui, nuni citatum no-
men LINNEANUM plantæ a me lectæ
exacte competeret, signum interrogatio-
nis præmisi, & descriptionem plantæ a me
lectæ subjunxi, ut si quem forte commis-
sem errorem, alii corrigere possent. Quas
vero, a me ipso non lectas, e FLORA
GYRPHICA huc adduxi, signo crucis †
notavi, ne alienos pro meis viderer ven-
ditare labores. Paucissimis illis speciebus,

quas

quas novas vel ab aliis nondum sufficien-
ter descriptas putavi, justum nomen im-
ponere studui, vel saltem descriptionem
dedi. Quod num annuente, an invita
Minerva fecerim, B. L. L. judicabitis. In-
dices completi debentur industriæ amici
dilectissimi MOR. WILlichii, Botanices
cultoris indefessi, qui saepius mihi excur-
siones instituenti comes fuit, nec hunc la-
borem suscipere detrectavit. Ceterum si
quis in hunc libellum irrepserit error,
humaniter quæso illum corrigatis B. L. L.,
cum enim omne sit grave initium, per-
fecta quoque esse nequit hæc prima FLO-
RA POMERANO-RUGICA. Dabam Sun-
diæ die 22 Februarii, 1769.



INDEX SYSTEMATICUS.

CLASSIS I. MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 SALICORNIA	herbacea	1
2 HIPPURIS	vulgaris	2

DIGYNIA.

3 CALLITRICHES	verna	3
	autumnalis †	4

CLASSIS II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

4 LIGUSTRUM	vulgare	5
5 CIRCAEA	lutetiana	6
6 VERONICA	officinalis	7
	serpyllifolia †	8
	Beccabunga	9
	Anagallis ▽	10
	scutellata	11

VERO-

INDEX SYSTEMATICUS

6 VERONICA

<i>Chamædrys</i>	12
<i>agrestis</i>	13
<i>arvensis</i>	14
<i>hederifolia</i>	15
<i>trifyllos</i>	16
<i>verna</i> †	17
<i>peregrina</i>	18
<i>officinalis</i>	19
<i>vulgaris</i>	20
<i>vulgaris</i>	21
<i>minor</i>	22
<i>officinalis</i>	23
<i>europæus</i>	24

7 GRATIOLA

8 PINGUICULA

9 UTRICULARIA

10 VERBENA

11 LYCOPUS

D I G Y N I A.

12 ANTHOXANTHUM	<i>odoratum</i>	25
-----------------	-----------------	----

CLASSIS III.

T R I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

13 VALERIANA

<i>dioica</i>	26
<i>officinalis</i>	27

<i>Locusta</i>	28
<i>Psevd-Acorus</i>	29

14 IRIS

<i>palustris</i>	30
<i>cæspitofus</i>	31

15 SCIRPUS

15 SCIR-

INDEX SYSTEMATICUS

35 ELYMUS	arenarius	84
36 HORDEUM	murinum	85
37 TRITICUM	repens	86

TRIGYNIA.

38 HOLOSTEUM	umbellatum	87
--------------	------------	----

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

39 SCABIOSA	Succisa *	88
	arvensis	89
	Columbaria	90
	? ochroleuca *	91
40 SHERARDIA	arvensis	92
41 ASPERULA	odorata	93
42 GALIUM	palustre	94
	uliginosum	95
	verum	96
	sylvaticum	826
	boreale	97
	Aparine	98
43 PLANTAGO	major	99
	media	100
	lanceolata	101
	maritima	102

43 PLAN-

INDEX SYSTEMATICUS

43 PLANTAGO	Coronopus	103
44 SANGUISORBA	officinalis	104
45 CORNUS	sanguinea †	105
46 ALCHEMILLA	vulgaris	106

D I G Y N I A.

47 CUSCUTA	europaea	107
------------	----------	-----

T E T R A G Y N I A.

48 ILEX	Aquifolium	108
49 POTAMOGETON	natans	109
	perfoliatum	110
	lucens	111
	crispum	112
	marinum	113
	pulillum †	114
50 SAGINA	procumbens	115

C L A S S I S V.

P E N T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

51 MYOSOTIS	scorpioides	116
52 LITHOSPERMUM	officinale	117
	arvense	118
53 ANCHUSA	officinalis	119
54 CYNOGLOSSUM	officinale	120

INDEX SYSTEMATICUS

55 PULMONARIA	officinalis	121
56 SYMPHYTUM	officinale	122
57 ASPERUGO	procumbens	123
58 LYCOPSIS	arvensis	124
59 ECHIUM	vulgare	125
60 PRIMULA	veris	126
	farinosa	127
61 MENYANTHES	trifoliata	128
62 HOTTONIA	palustris	129
63 LYSIMACHIA	vulgaris	130
	thyrsiflora	131
	nemorum	132
	Nummularia	133
64 ANAGALLIS	arvensis *	134
65 CONVOLVULUS	arvensis	135
	sepium	136
66 CAMPANULA	rotundifolia	137
	patula	138
	persicifolia	139
	rapunculoides *	140
	Trachelium *	141
	glomerata	142
67 PHYTEVMA	spicata	143
68 LONICERA	Periclymenum	144
69 VERBASCUM	Xylosteum	145
	Thapsus	146
	nigrum	147

INDEX SYSTEMATICUS.

70	DATURA.	Stramonium	148
71	HYOSCYAMUS	niger	149
72	SOLANUM	Dulcamara	150
		nigrum	151
73	RHAMNUS	catharticus	152
74	EVONYMUS	Frangula	153
75	RIBES	europaeus	154
		rubrum	155
		alpinum	156
		nigrum	157
76	HEDERA	Grossularia *	158
77	GLAUX	Uva crispa	159
		Helix	160
		maritima	161

D I G Y N I A.

78	ASCLEPIAS	Vincetoxicum	162
79	HERNIARIA	glabra	163
80	CHENOPODIUM	BonusHenricus	164
		urbicum	165
		rubrum	166
		murale	167
		album †	168
		viride	169
		glaucum	170
		Vulvaria	171
		polyspermum †	172

INDEX SYSTEMATICUS

80	CHENOPodium	maritimum	173
81	SALSOLA	Kali	174
82	ULMUS	canipestris	175
83	GENTIANA	Pneumonanthe	176
		Centaurium	177
		campestris *	178

Umbellatae.

84	ERYNGIUM	maritimum	179
85	HYDROCOTYLE	vulgaris	180
86	SANICULA	europaea	181
87	TORDYLIUM	Anthriscus	182
88	DAUCUS	Carota	183
89	CONIUM	maculatum	184
90	SELINUM	palustre	185
91	ATHAMANTA	Oreoselinum	186
92	LASERPITIUM	latifolium †	187
93	HERACLEUM	Sphondylium	188
94	ANGELICA	Archangelica *	189
		sylvestris *	190
95	SIUM	latifolium	191
96	OENANTHE	fistulosa	192
97	PHELLANDRIUM	aquaticum	193
98	CICUTA	viresa	194
99	AETHUSA	Cynapium *	195
100	SCANDIX	Anthriscus	196
101	CHAEROPHYLLUM	sylvestre	197

101 CHAR-

INDEX SYSTEMATICUS

101	CHAEROPHYLLUM	temulum	198
102	PASTINACA	sativa	199
103	ANETHUM	graveolens	827
104	CARUM	Carvi	200
105	PIMPINELLA	saxifraga	201
106	APIUM	graveolens	202
107	AEGOPODIUM	Podagraria	203

TRIGYNIA.

108	VIBURNUM	Opulus	204
109	SAMBUCUS	Ebulus	205
		nigra	206
110	ALSINE	media	207

TETRAGYNIA.

111	PARNASSIA	palustris	208
-----	-----------	-----------	-----

PENTAGYNIA.

112	STATICE	Armeria	209
113	LINUM	catharticum	210
		Radiola	211
114	DROSERA	rotundifolia	212
		longifolia	213

POLYGYNIA.

115	MYOSURUS	minimus	214
		a 5	CLAS-

INDEX SYSTEMATICUS

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

116	ALLIUM	Scorodoprasum	215
		arenarium †	216
		oleraceum	217
117	ORNITHOGALUM	luteum	218
		minimatum	219
118	ASPARAGUS	officinalis	220
119	CONVALLARIA	majalis	221
		Polygonatum	222
		multiflora	223
		bifolia	224
120	ACORUS	Calamus	225
121	JUNCUS	conglomeratus	226
		effusus	227
		squarrosum †	228
		articulatus	229
		bulbosus	230
		bufonius †	231
		pilosus	232
		campestris	233
122	BERBERIS	vulgaris	234

TRIGYNYIA.

123	RUMEX	crispus	235
		RU-	

INDEX SYSTEMATICUS

123 RUMEX	maritimus*	236
	acutus	237
	aquaticus	238
	Acetosa	239
	Acetosella	240
124 SCHEUCHZERIA	palustris	828
125 TRIGLOCHIN	palustre	241
	maritimum	242

POLYGYNIA.

126 ALISMA	Plantago ▽	243
	Ranunculoides†	244

CLASSIS VII. HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

127 TRIENTALIS	europaea	245
----------------	----------	-----

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

128 EPHIOBIUM	angustifolium	246
	hirtutum *	247
	montanum	248
	palustre	249
129 VAC-		

INDEX SYSTEMATICUS

129 VACCINIUM

<i>Myrtillus</i>	250
<i>uliginosum</i>	251
<i>Vitis idaea</i>	829
<i>Oxycoccus</i>	252
<i>vulgaris</i>	253
<i>Tetralix</i>	254

130 ERICA

TRIGYNYIA.

131 POLYGONUM

<i>amphibium</i>	255
<i>Hydropiper</i>	256
<i>Perficaria</i>	257
<i>aviculare</i>	258
<i>Convolvulus</i>	259

TETRAGYNYIA.

132 PARIS

<i>quadrifolia</i>	260
<i>Moschatellina</i>	261

133 ADOXA

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNYIA.

134 BUTOMUS

<i>umbellatus</i>	262
-------------------	-----

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNYIA.

135 MONOTROPA

<i>Hypopithys</i>	263
<i>palustre</i>	264

136 LEDUM

137 AN-

INDEX SYSTEMATICUS.

137 ANDROMEDA	Polifolia	265
138 ARBUTUS	Uva ursi	266
139 PYROLA	rotundifolia	267
	secunda	268

DIGYNIA.

140 CHRYSOSPLENIUM	alternifolium	269
141 SAXIFRAGA	granulata	270
	tridactylites †	271
142 SCLERANTHUS	annuus	272
	perennis	273
143 SAPONARIA	officinalis	274
144 DIANTHUS	Armeria	275
	prolifer	276
	deltoides	277
	plumarius *	278

TRIGYNIA.

145 CUCUBALUS	Behen	279
146 SILENE	nutans	280
147 STELLARIA	nemorum	281
	Holostea *	282
148 ARENARIA	graminea	283
	peploides	284
	trinervia	285
	serpyllifolia	286
	rubra	287

PENTAGYNIA.

149 SEDUM	Telephium	288
	acre	289
	Oxa-	290

INDEX SYSTEMATICUS.

167 RUBUS

<i>faxatilis</i>	326
<i>Chamæmorus</i>	830
<i>vesca</i>	327
168 FRAGARIA	
<i>Anserina</i>	328
169 POTENTILLA	
<i>argentea</i>	329
<i>verna</i>	330
<i>reptans</i>	331
<i>erecta</i>	332
170 TORMENTILLA	
<i>urbanum</i>	333
171 GEUM	
<i>rivale</i>	334
172 COMARUM	
<i>palustre</i>	335

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

173 ACTAEA

spicata 336

174 CHELIDONIUM

majus 337

175 PAPAVER

Argemone 338

dubium 339

176 NYMPHÆA

Rhœas 340

lutea 341

177 TILIA

alba 342

europæa 343

TRIGYNIA.

178 DELPHINIUM

Consolida 344

179 ACONITUM

Napellus f. 345

PENTAGYNIA.

180 AQUILEGIA

vulgaris 346

HEXA-

INDEX SYSTEMATICUS.

HEXAGYNIA.

181	STRATIOTES	Aloides	347
------------	-------------------	---------	------------

POLYGYNIA.

182	ANEMONE	Hepatica	348
		Pulsatilla	349
		nemorosa	350
		ranunculoides	351
183	THALICTRUM	minus	352
		flavum	353
184	RANUNCULUS	Flammula	354
		reptans	355
		Lingua	356
		Ficaria	357
		Thora †	358
		auricomus	359
		sceleratus	360
		bulbosus	361
		repens	362
		polyanthemos	363
		acris	364
		Ianuginosus	365
		arvensis	366
		aquatalis	367
185	TROLLIUS	europaeus	368
186	CALTHA	palustris	369

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

187	AJUGA	pyramidalis	370
b			187 AJU-

INDEX SYSTEMATICUS.

187 AJUGA	reptans	371
188 TEUCRIUM	Scordium	372
189 NEPETA	Cataria	373
190 MENTHA	aquatica	374
	arvensis	375
191 GLECOMA	hederacea	376
192 LAMIUM	album	377
	purpureum	378
	amplexicaule	379
193 GALEOPSIS	Ladanum	380
	Tetrahit	381
194 BETONICA	Galeobdolon	382
195 STACHYS	officinalis	383
	sylvatica	384
	palustris	385
196 BALLOTA	nigra	386
197 MARRUBIUM	vulgare	387
198 LEONURUS	Cardiaca	388
199 CLINOPODIUM	vulgare	389
200 ORIGANUM	vulgare	390
201 THYMUS	Serpillum	391
	Acinos	392
202 SCUTELLARIA	galericulata	393
203 PRUNELLA	vulgaris	394

ANGIOSPERMIA.

204 RHINANTHUS	Crista galli	395
205 EUPHRASIA	officinalis	396
	Odontites	397
206 MELAMPYRUM	arvense	398
	nemorosum	399
	pratense	400
	206 Me-	

INDEX SYSTEMATICUS

206 MELAMPYRUM	sylvaticum	401
207 LATHRÆA	Squamaria †	402
208 PEDICULARIS	palustris	403
	sylvatica	404
209 ANTIKRHINUM	minus	405
	Linaria	406
210 SCROPHULARIA	nodosa	407

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

211 MYAGRUM	sativum	408
	paniculatum	409
212 DRABA	verna	410
213 LEPIDIUM	ruderale	411
214 THLASPI	arvense	412
	campestre *	413
	Bursa Pastoris	414
215 COCHLEARIA	officinalis	415
	Armoracia	416
216 IBERIS	nudicaulis	417
217 ALYSSUM	incanum	418

SILIQUOSA.

218 DENTARIA	bulbifera	419
219 CARDAMINE	pratensis	420
220 SISYMBRIUM	Nasturtium ▽	421
	sylvestre	422
	amphibium	423
	Sophia	424

INDEX SYSTEMATICUS.

220	SISYMBRIUM	Irio †	425
221	ERYSIMUM	officinale	426
		Barbaræa	427
		Alliaria	428
		inodora *	429
222	HESPERIS	thaliana	430
223	ARABIS	glabra	431
224	TURRITIS	hirsuta *	432
225	BRASSICA	campestris	433
226	SINAPIS	arvensis	434
227	RAPHANUS	nigra	435
228	BUNIAS	Raphanistrum	436
229	CRAMBE	Cakile	437
		maritima	438

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

230	GERANIUM	cicutarium	439
		sylvaticum	440
		pratense	441
		robertianum	442
		molle	443
		dissectum	444
		columbinum	445
		rotundifolium	446
		sanguineum	447

POLYANDRIA.

231	MALVA	rotundifolia	448
		sylvestris	449
		Alcea	450

CLAS.

INDEX SYSTEMATICUS

CLASSIS XVII.

DIADEPHIA.

HEXANDRIA.

232 FUMARIA	bulbosa	451
	officinalis	452

OCTANDRIA.

233 POLYGALA	vulgaris	453
--------------	----------	-----

DECANDRIA.

234 SPARTIUM	scoparium	454
235 GENISTA	tinctoria	455
236 ONONIS	spinoso	456
237 ANTHYLLIS	Vulneraria	457
238 OROBUS	vernus *	458
	tuberofus *	459
	niger *	460
239 LATHYRUS	pratensis	461
	sylvestris	462
	latifolius	463
240 VICIA	dumetorum	464
	sylvatica	465
	Cracca	466
	sativa	467
	sepium	468
241 ERVUM	Lens	469
	tetraspermum †	470
242 ORNITHOPUS	hirsutum	471
243 HEDYSARUM	perpusillus	472
	Onobrychis	473
b 3	244 ASTRA-	

INDEX SYSTEMATICUS

244 ASTRAGALUS	<i>glycyphyllos</i>	473
245 TRIFOLIUM	<i>M. officinalis</i>	474
	<i>hybridum</i> †	475
	<i>repens</i>	476
	<i>pratense</i>	477
	<i>arvense</i>	478
	<i>montanum</i>	479
	<i>agrarium</i>	480
	<i>procumbens</i>	481
246 LOTUS	<i>corniculatus</i>	482
247 MEDICAGO	<i>lupulina</i>	483

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

248 HYPERICUM	<i>quadrangulum</i>	484
	<i>perforatum</i>	485
	<i>humifusum</i>	486
	<i>montanum</i>	487

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS

Semiflosoulosi.

249 TRAGOPOGON	<i>pratense</i>	488
250 PICRIS	<i>Hieracioides</i> †	489
251 SONCHUS	<i>arvensis</i>	490
	<i>oleraceus</i>	491
	252 LAC-	

INDEX SYSTEMATICUS.

252	LACTUCA	virofa	492
253	PRENANTHES	muralis	493
254	LEONTODUM	Taraxacum	494
		autumnale	495
		hispidum	496
		Pilosella	497
		dubium †	498
255	HIERACIUM	Auricula	499
		murorum	500
		paludosum	501
		sabaudum	502
		umbellatum	503
256	CREPIS	tectorum	504
257	HYOSERIS	minima	505
258	HYPOTHÆRIS	radicata *	506
259	LAPSANA	communis	507
260	CICHORIUM	Intybus	508

Capitati.

261	ARCTIUM	Lappa	509
262	SERRATULA	tinctoria	510
		arvensis	511
263	CARDUUS	lanceolatus	512
		acanthoides	513
		crispus	514
		palustris	515
		acaulis	516
264	CNICUS	oleraceus	517
265	CARLINA	vulgaris	518
266	BIDENS	tripartita *	519
		cernua *	520
267	EUPATORIUM	cannabinum	521

POLYGAMIA SUPERFLUA.

268	TANACETUM	vulgare	§22
269	ARTEMISIA	campestris	§23
		maritima †	§24
		Absinthium	§25
		vulgaris	§26
		arenarium	§27
		dioicum	§28
		sylvaticum	§29
		uliginosum	§30
270	GNAPHALIUM	squarrosa	§31
271	CONYZA	acre	§32
272	ERIGERON	Farfara	§33
273	TUSSILAGO	Petasites	§34
274	SENECIA	vulgaris	§35
275	ASTER	Jacobæa	§36
276	SOLIDAGO	Tripolium	§37
277	INULA	Virgaurea	§38
		Helenium	§39
		Britannica	§40
		Pulicaria	§41
		Salicina	§42
		palustris	§43
278	CINERARIA	montana	§44
279	ARNICA	perennis	§45
280	BELLIS	Levcanthemum	§46
281	CHRYSANTHEMUM	segetum	§47
282	MATRICARIA	Parthenium	§48
		maritima *	§49
		Chamomilla	§50
283	ANTHEMIS	arvensis	§51
283	AN-		

INDEX SYSTEMATICUS.

283 ANTHEMIS

Cotula	552
tinctoria	553
Ptarmica	554
Millefolium	555

284 ACHILLEA

770

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

285 CENTAUREA

Cyanus	556
Scabiosa	557
Jacea	558

POLYGAMIA NECESSARIA.

286 FILAGO

germanica *	559
montana	560
arvensis	561

MONOGAMIA.

287 JASIONE

montana	562
---------	-----

288 VIOLA

palustris	563
-----------	-----

289 IMPATIENS

odorata	564
---------	-----

canina	565
--------	-----

tricolor	566
----------	-----

noli tangere	567
--------------	-----

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

290 ORCHIS

bifolia	568
Morio	569
mascula	570
ustulata	571

INDEX SYSTEMATICUS.

290 ORCHIS	<i>latifolia</i>	572
	<i>maculata</i>	573
	<i>conopsea</i>	574
291 OPHRYTIS	<i>Nidus avis</i>	575
	<i>ovata</i>	576
	<i>Monorchis</i>	577
292 SERAPIAS	<i>Helleborine *</i>	578
	<i>longifolia</i>	579
293 CYPRIPEDIUM	<i>Calceolus</i>	580

POLYANDRIA.

294 CALLA	<i>palustris</i>	581
295 ZOSTERA	<i>marina</i>	832

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

DIANDRIA.

296 LEMNA	<i>trisulca</i>	582
	<i>minor</i>	583
	<i>polyrrhiza</i> †	584

TRIANDRIA.

297 TYPHA	<i>latifolia</i> *	585
	<i>angustifolia</i>	586
298 SPARGANIUM	<i>erectum</i>	587
299 CAREX	<i>pulicaris</i> †	588
	<i>arenaria</i>	589
	<i>uliginosa</i>	590
	<i>leporina</i>	591
	<i>vulpina</i>	592
	299 Carex	

INDEX SYSTEMATICUS

299 CAREX	axillaris	193
	flava	194
	filiformis †	195
	limosa	196
	panicea	197
	Psevdo-Cyperus	198
	cæspitosa	199
	acuta	200
	vesicaria	201
	hirta	202

TETRANDRIA.

300 BETULA	alba	603
	Alnus	604
301 URTICA	urens	605
	dioica	606

PENTANDRIA.

302 XANTHIUM	strumarium	607
---------------------	------------	-----

POLYANDRIA.

303 MYRIOPHYLLUM	spicatum	608
304 SAGITTARIA	sagittifolia	609
305 QUERCUS	Robur	610
306 FAGUS	sylvatica	611
307 CARPINUS	Betulus	612
308 CORYLUS	Avellana	613

MONADELPHIA.

309 PINUS	sylvestris	614
	Abies	615

SYN-

INDEX SYSTEMATICUS

SYNGENESIA.

310 BRYONIA alba 616

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

311 SALIX	triandra	617
	pentandra *	618
	vitellina †	619
	amygdalina	620
	fragilis	621
	purpurea †	622
	arenaria	623
	incubacea	624
	rosmarinifolia	625
	capraea	626
	viminalis	627
	cinerea	628
	alba	629
	polyandra *	630

TETRANDRIA.

312 VISCUM	album †	631
313 HIPPOPHAE	Rhamnoides	632

PENTANDRIA.

314 CANNABIS	sativa	633
315 HUMULUS	Lupulus	634

OCTAN-

INDEX SYSTEMATICUS.

OCTANDRIA.

316	POPULUS	alba	635
		tremula	636
		nigra	637

ENNEANDRIA.

317	MERCURIALIS	perennis	638
		annua	639
318	HYDROCHARIS	Morsus Ranae	640

MONADELPHIA.

319	JUNIPERUS	communis	641
320	TAXYS	baccata	642

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

321	HOLCUS	lanatus	643
322	VALANTIA	Cruciata †	644
323	PARIETARIA	officinalis	645
324	ATRIPLEX	laciniata	646
		hastata	647
		parvula	648
		litoralis	649

326 ACER.

INDEX SYSTEMATICUS.

325 Acer

Psevdo-Platanus	650
Platanoides	651
campestre	652

DIOECIA.

326 FRAXINUS

excelsior

653

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

327 EQUISETUM

sylvaticum

654

arvense

655

palustre*

656

fluviale

657

limosum

658

hyemale

659

vulgatum

660

328 OPHIOGLOSSUM

Lunaria

661

329 OSMUNDA

regalis

662

330 ACROSTICHUM

Septentrionale†

663

331 PTERIS

aquilina

664

332 ASPLENIUM

Trichomanes

665

333 POLYPODIUM

Ruta muraria

666

vulgare

667

Phegopteris†

668

Filix mas

669

Filix femina

670

333 Po-

INDEX SYSTEMATICUS.

333 POLYPODIUM	fragile	671
	Dryopteris	672
334 ISOETES	lacustris	673

M U S C I.

335 LYCOPODIUM	clavatum	674
	Selago	675
	annosinum	676
339 SPHAGNUM	palustre	677
337 SPLACHNUM	ampullaceum	678
338 POLYTRICHUM	commune	679
339 MNIUM	pellucidum*	680
	hygrometricum†	681
	serpyllifolium	682
	Jungermannia †	683
340 BRYUM.	apocarpum	684
	striatum	685
	pomiforme †	686
	pyriforme	687
	extinctorium	688
	rurale	689
	murale	690
	scoparium*	691
	undulatum	692
	truncatulum	693
	viridulum	694
	Hypnoides †	695
	pulvinatum	696
	cæspiticium	697
	capillare	698

341 HIP-

INDEX SYSTEMATICUS.

341 HYPNUM

<i>taxifolium</i>	699
<i>complanatum</i>	700
<i>triquetrum</i>	701
<i>rutabulum</i> †	702
<i>filicinum</i>	703
<i>proliferum</i>	704
<i>parietinum</i>	705
<i>cupressiforme</i> †	706
<i>squarrosum</i> †	707
<i>curtipendulum</i> †	708
<i>purum</i>	709
<i>illecebrum</i>	710
<i>cuspidatum</i>	711
<i>sericeum</i>	712
<i>velutinum</i>	833
<i>serpens</i>	713

A L G A E.

342 JÜNGERMANNIA

<i>asplenioides</i> †	714
<i>bidentata</i> *	834
<i>complanata</i>	715
<i>dilatata</i>	716
<i>tamarisci</i>	717

343 MARCHANTIA

<i>polymorpha</i>	718
<i>hemisphærica</i> †	719

344 RICCIA

<i>minima</i> †	720
<i>scriptus</i>	721
<i>geographicus</i>	722
<i>rugosus</i>	723
<i>sanguinarius</i> *	724

345 LICHEN

345 LI-

INDEX SYSTEMATICUS.

345 LICHEN

<i>fusco-ater</i> f*	725
<i>Fagineus</i>	726
<i>Carpineus</i>	727
<i>ericetorum*</i>	728
<i>candelarius</i>	729
<i>pallefscens</i>	730
<i>subfuscus</i>	731
<i>centrifugus</i>	732
<i>saxatilis</i>	733
<i>olivaceus</i>	734
<i>parietinus</i>	735
<i>physodes*</i>	736
<i>stellaris*</i>	737
<i>ciliaris</i>	738
<i>pulmonarius</i>	739
<i>furfuraceus</i>	740
<i>farinaceus</i>	741
<i>calicaris</i>	742
<i>fraxineus</i>	743
<i>prunastri</i>	744
<i>juniperinus</i>	745
<i>glaucus</i>	746
<i>aphthosus†</i>	747
<i>caninus</i>	748
<i>cocciferus</i>	749
<i>pyxidatus</i>	750
<i>fimbriatus</i>	751
<i>gracilis†</i>	752
<i>cornutus</i>	753
<i>deformis†</i>	754
<i>rangiferinus</i>	755
<i>subulatus†</i>	756

INDEX SYSTEMATICUS.

345 LICHEN

<i>plicatus</i> +	757
<i>barbatus</i> †	758
<i>jubatus</i> *	759
<i>chalybeiformis</i>	760
<i>hirtus</i>	761
<i>vulgaris</i>	762
<i>hispida</i>	763
<i>juniperina</i>	764
<i>Nostoc</i> †	765
<i>Auricula</i>	766
<i>hemisphærica</i>	767
<i>purpurea</i>	768
<i>ferratus</i> †	769
<i>vesiculosus</i>	770
<i>fastigiatus</i>	771
<i>Filum</i>	772
<i>intestinalis</i>	773
<i>compressa</i> †	774
<i>latissima</i>	775
<i>Linza</i>	776
<i>granulata</i> †	777
<i>bullofa</i>	778
<i>litoralis</i>	779
<i>gelatinosa</i>	780
<i>Flos aquæ</i>	781
<i>phosphorea</i>	782
<i>velutina</i>	783
<i>faxatilis</i> †	784
<i>candelaris</i>	785
<i>botryoides</i> *	786
<i>lactea</i>	787

346 CHARA

347 TREMELLA

348 FUCUS

349 ULVA

350 CONFerva

351 BYSSUS

FUN-

INDEX SYSTEMATICUS.

F U N G I.

352 AGARICUS

Cantharellus	788
integer*	789
muscarius*	790
dentatus	791
deliciosus	792
piperatus†	793
campestris	794
violaceus	795
cinnamomeus	796
equestris	797
campanulatus	798
Quercinus	799

353 BOLETUS

Betulinus	800
suberosus	801
fomentarius	802
versicolor	803
svaveolens	804
luteus	805
bovinus†	806
subtomentosus	807
subsquamosus*	808

354 HYDNUM

parasiticum*	835
--------------	-----

355 PHALLUS

esculentus†	809
-------------	-----

356 HELVELLA

Mitra†	810
--------	-----

357 PEZIZA

lentifera†	811
------------	-----

358 CLAVARIA

punctata†	812
-----------	-----

scutellata	813
------------	-----

cochleata	814
-----------	-----

digitata*	815
-----------	-----

INDEX SYSTEMATICUS.

358 CLAVARIA

Hypoxylon	816
fastigiata*	817
Bovista	818
stellatum†	819
epidendrum	820
epiphyllum	821
sepium*	822
Mucedo	823
Erysiphe	824
septicus	825

360 MUCOR



ERRATA.

In dedicatione.

Pag. 5. Lin. ult. potuerit lege patuerit

No.	75	Lin.	8	zwi-	zwischen
	115		2	petatis	petalis
	358		1	petiolarum	petiolorum
	189		22	laterc	latere
	210		8	Rugiae in	in Rugiae
	245		8	Radgas	Raddas
	246		5	varior	rarior
	247		5	repretis	vepretis
	312		1	sep.-tangulis	sept.-angulis
	398		8	infesta	infestum
	459		11	aetius,	aetius.
			13	4 ad	4 ad 6
	517		3	convaris	concavis
	534		3	Laddick	Loddick
	665		6	Stadtmauer	Mauer
	718		7	von	vor
	754		3	anitquis	antiquis
	761		1	filamentosus	filamentosus
	781		1	plumofis	plumosus
	798		2	tamallis	tamellis

B

INDEX I.

INDEX I.

Menyanther

Menyanthes

INDEX II.

Bären

-- *Traube*

Bruch

-- *Weiden*

Fett

-- *Gras*

Fuchs

Schwanz

-- *Knoten*

-- *Wiesen* 41

Gänse

-- *Pappeln*

-- *rich*

Gülden Günsel

kriechender

Wagmeister

Schwanz

-- *Knoten*

-- *Wiesen*

42

Herbst

Sternblume

Hirse

-- *Meer*

Pappeln

rich

-- *kriechender*

Waldmeister

644





CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 **S**ALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice
compressis emarginato - bifidis.

Hinc *Sal Alcali*, (*Soda*;) *Pharinac*.

Habitat in saltis litoribus maritimis.

Gryph. *bey den Gradier - Häusern*.

Floret Junio.

2 **HIPPURIS** *vulgaris*.

Germ.

Habitat passim in fontibus, lacubus, fluviis, fo-
lo profundo, limoso, fluente, ubi gelu radie-
ces non attingit.

Sund. *Am Voigthäger See beym Schütt*. Inter
Prohn et Damitz in prato aquoso, copio-
sissime.

Floret Aprili.

A

DIGYNIA.

D I G Y N I A.

3 CALLITRICE *verna* foliis superioribus ova-
libus, floribus androgynis.

Germ. *Frübjahrs-Sternblühme.*

Habitat in fossis aquosis, v. g. [Gryph. prope
Hohenmühlken.] Sund. am *Voigthäger Moor.*

Floret Majo, Junio.

4 CALLITRICE *autumnalis* foliis omnibus line-
aribus, apice bifidis, floribus herinaphroditis. †

Germ. *Herbst-Sternblühme.*

Habitat in fossis aquosis.



CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

5 LIGUSTRUM *vulgare*.

Germ. *Reinholz*, *Mundholz*, *Harriegel*.

Habitat in sylvestribus rarius.

Sund. *in der Voigthäger Priester-Koppel*.

In *Jasmundia* paßim.

Floret Junio.

6 CIRCAEA *lutetiana* caule erecto, racemis pluribus.

Germ. *Hexen-Kraut*.

Habitat in umbrosis nemorosis, sylvisque.

[Gryph. *in fossa prope viam, qua per sylvam itur nach Grubenhagen*, inter *Eldena* et *Köthenhagen*.]

Sund. inter *Elmenhorst* et *Windbrak* ad dextram in *sylva Mittelbusch* dicta.

Floret Junio, Julio.

7 VERONICA *officinalis* spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente.

Germ. *Ehrenpreis*. *Pharinac*. *Veronica*.

Habitat in sylvestribus sterilibus.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp et supra Hohenmühlens copiose*.] Sund. *auf dem Devinschen Ort et alibi*.

Floret Junio,

8 *VERONICA serpyllifolia*, racemo terminali
subspieato, foliis ovatis glabris crenatis. †
Germ.

Habitat ad vias, agros, inque pascuis.

[Gryph. *Neben dem Richtsteige nach Elmschagen.*]

9 *VERONICA Beccabunga* racemis lateralibus,
foliis ovatis planis, caule repente.

Germ. *Bachbungen.* Nostr. *Lünich.* Pharmac.
Beccabunga.

Habitat ad scaturigines, fossas fluentes. v. g.

Sund. *Hinter dem Käpfenberge et alibi*
frequens. Floret Aprili, Majo.

10 *VERONICA Anagallis aquatica* racemis late-
ralibus, foliis lanceolatis ferratis, caule erecto.

Germ. *Wassergauchheil.*

Habitat ad fossas inque inundatis.

[Gryph. *in fossa wenn man nach dem Galgen-
kamp geht.*] Sund. *Auf der Weide vor dem*
Triebseer Thör locis inundatis frequens.

Floret Junio.

11 *VERONICA scutellata*, racemis lateralibus
alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus
integerrimis.

Germ.

Habitat pàssim in inundatis.

[Gryph. *in fossa sylvatica, qua circumducitur*
sylva Hinrichshagensis versus Hohenmühlen.]

Sund. *Im Moor vor Pütt.* item *auf der Papen-
bäger Wiese.*

Pom. In prato ante sylvam Arbsthagensem ver-
sus *Groß-Kordshagen* et alibi.

Floret Junio, Julio

12 VERONICA *Chamaedrys* racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule debili.

Germ. *Gundermann.*

Habitat in pratis siccis, apricis, Pomoeriis, adque pagos frequens, [Gryph. in vallo urb.
bis.] Sund. ad sepes suburbiorum, inque vallo urbis.

Floret Junio.

13 VERONICA *agrestis* floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus.

Germ.

Habitat in cultis, arvis, ad sepes.

Floret Julio.

14 VERONICA *arvensis* floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus.

Germ.

Habitat in arvis, cultis, novalibus, nec non pascuis frequens.

Floret Majo.

15 VERONICA *bederifolia* floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.

Germ.

Habitat in cultis, ruderatis, ad sepes suburbiorum ubique.

Floret Aprili et serius.

16 VERONICA *triphyllos* floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus.

Germ.

Habitat in agris, passim frequens.

Floret Aprili.

17 VERONICA verna floribus solitariis, foliis
digitato partitis pedunculo longioribus. †

Germ. *Händlein-Kraut.*

Habitat in apricis, juxta agros.

Floret Vere.

18 VERONICA peregrina floribus solitariis se-
filibus, foliis lanceolato-linearibus glabris
obtusis integerrimis, caule erecto.

Germ.

Habitat in cultis, arvis, haud infrequens.

Floret Majo et serius.

19 GRATIOLA officinalis floribus pedunculatis,
foliis lanceolatis ferratis.

Germ. *Gottes Gnaden-Kraut, Erdgalle Pharm.*
Gratiola.

Habitat in aquosis rarissima,

Sund. vor dem Knieper Thor vor der ersten
Bleiche auf der Insel copiose. item im Gra-
ben bey der Allée nach Papenhagen, linker
Hand bey der siebenden Weide frequens.

Alibi non visa.

Floret Julio, Augusto.

20 PINGUICULA vulgaris nectario cylindraceo
longitudine petali.

Germ. *Fettkraut.*

Habitat in uliginosis fere ubique v. g. *Im-*
Voigthäger und Pütter Moor.

Floret Junio.

21 UTRICULARIA vulgaris nectario conico-
scapo paucifloro.

Germ.

Habitat in fossis aquosis, aquis stagnantibus,
paludibus,

paludibus, frequens. [Gryph. in paludibus sylvae Grubenhagensis.] Sund. *Im Voigthäger Priester-Moor.* Item *im Moor vor Pütt* et alibi.

Floret Junio, Julio.

22 UTRICULARIA minor nectario carinato.

Germ.

Habitat in fossis aquosis, paludibus, sed rarior. Sund. *im Moor zwischen Neegass und Seemühlen* zur Rechten passim copiose.

Floret Julio.

23 VERBENA officinalis tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario.

Germ. *Eisenkraut, Eisenhart, Taubenkraut.*

Pharmac. *Verbena.*

Habitat in ruderatis, ad sepes pagorum, viasque, passim frequens.

[Gryph. Ad viam publicam prope Eldena, copiosissima ad vias pagi Hanshagen.]

Sund. ad sepes suburbiorum, item am Steinbäger Kirchhofe, copiofissime.

Floret Junio.

24 LYCOPUS europaeus foliis sinuato-ferratis.

Germ. *Wasser-Andorn.*

Habitat ad ripas lacuum et fluviorum.

[Gryph. im Wampener Busch bey der Trift.]

Sund. am Franken und Knieper Teich, et alibi frequens.

Floret Augusto.

D I G Y N I A.

25 ANTHOXANTHUM *odoratum* spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis aristis longioribus.

Gerin. *Ruchgras.* Schreb.

Habitat in pratis pascuis ubique, verbi gratia.

Sund. auf der Franken Weide, copiose.

Floret Aprili, Mayo, Junio.



CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

26 *VALERIANA dioica* floribus triandris dioicis,
foliis pinnatis integerrimis.

Germ. *Klein Baldrian.*

Habitat in pratis, campis uliginosis, frequens.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp hinten am Rick.*]

Sund. *Am Knieper Mühlen-Graben.* item. *In*

Voigthäger Priester-Moor copiosa. item.

In prato zwischen dem Lüdershäuser Eller-
holz und dem Wege von Voigthagen nach
Wendorf copiosissima.

Floret Majo. Junio.

27 *VALERIANA officinalis* floribus triandris, fo-
liis omnibus pinnatis.

Germ. *Baldrian, Gemein-Baldrian.* Pharmac.
Valeriana.

Habitat in sepibus, sylvis & nemoribus palu-
dosis frequens v. gr. Sund. *Im Haynholz-*
schen Busch. item, *Am Strande nach Devin*
am Ufer. cop.

Floret Junio.

28 *VALERIANA Locusta* floribus triandris, caule
dichotomo, foliis linearibus.

Germ. *Rapunzel, Lämmer-Feld-Lattig, Nüfs-*
gen-Sallat.

Habitat in arvis, ripis maritimis elatis, passim.
[Gryph.

[Gryh. Gegen Elmshagen um das Mittags-Zeichen, am hohen Ufer zu Ludwigsburg hinter die Redouten.]

Sund. Am Strande nach Devin und Parow: item, auf dem Retrenchement vor dem Franken Thor zwischen der Wache und dem Strande cop.

Floret Majo, Junio.

29 *IRIS Pseud-Acorus corollis imberibus: petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus.*

Germ. *Schwertel, gelber Schwertel.* Pharmac. *Acorus palustris.*

Habitat ad ripas paludum, fossarum, lacuum, ubique.

Floret Junio.

30 *SCIRPUS palustris culmo tereti nudo, spica subovata terminali.*

Germ. *Sumpfbinsen.* Schreb.

Habitat in fossis & inundatis frequens v. gr. Gryph. *Bey den Gradierhäusern.* Sund. *In der Papenhäger Wiese.* copiose.

Floret Junio.

31 *SCIRPUS cæspitosus culmo striato nudo; spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis.*

Germ. *Raasenbinsen.*

Habitat in paludibus cæspitosis, sylvaticis.

Sund. *Im Moor zwischen Neegass und Seemühlen zur Rechten* passim copiose.

Floret Junio, Julio.

32 SCIRPUS *lacustris* culmo tereti nudo; spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus.

Germ. *Teichbinsen*. Schreb.

Habitat in stagnis, lacubus, fluviis frequens, ubique.

[Gryph. in Ricco.] Sund. *Am Knieper Teiche*
v. gr. *Bey den Bleichen*.

Floret Junio.

33 SCIRPUS *maritimus* culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata.

Germ. *Seebinsen*. Schreb.

Habitat in litoribus maritimis.

[Gryph. In fossis hinter den Gradierhäusern]

Sund. *Im Moor bey Bauer-Parow am Strande*.

Floret Junio.

34 SCIRPUS *sylvaticus* culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis.

Germ. *Waldbinsen*. Schreb.

Habitat in aquosis, sylvis humentibus, frequ.

[Gryph. Zu Hohenmühl und Ugnad.] Sund.

Zwischen dem Wege nach Piutt und den Grünbusschen Busch copiosissime in prato aquoso

Floret Majo, Junio.

35 ERIOPHORUM *vaginatum* culmis vaginatis teretibus, spica tectoriosa,

Germ. *Sumpfdungrass*. S,

Habitat in paludibus turfosis, sterilibus, paucim frequens.

Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges von Neegass*

Neegass nach Seemühl copiose. Item. Im Voigthäger Priester-Moor.

Floret Aprili.

36 *ERIOPHORUM polystachion culnis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis.*

Germ. *Wollgras, Wiesenendengras.*

Habitat cum præcedente frequentius.

Floret Aprili.

37 *NARDUS stricta. spica setacea recta.*

Germ.

Habitat in sterilibus, duris, campestribus frequens v. g. Sund. *In der Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee* passim copiose.

Floret Junio.

DIGYNIA.

38 *PHALARIS pbleoides panicula cylindrica spiciformi. †*

Germ. *Fönichartiger Glanz. S.*

Habitat in versuris rario.

39 *PHALARIS arundinacea panicula oblonga ventricosa.*

Germ. *Rohrartiger Glanz.*

Variat glumis viridibus & rubris.

Habitat ad ripas lacuum & fluviorum, in subhumidis, frequens. v. gr. Sund. *Am Knieper Teich* copiosa.

Floret Junio.

40 *PANICUM Crus galli spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari.*

Germ.

Germ. *Grauliches Hirzegrass.* Schreb.

Habitat in hortis, cultis.

41 PHLEUM *pratense* spica cylindrica longissima,
culmo recto.

Germ. *Wiesen-Fœnich.* S.

Habitat in versuris & pratis ubique.

Floret Julio.

42 ALOPECURUS *pratensis* culmo spicato erecto,
glumis villosis.

Germ. *Fuchsschwanz, Wiesen-Fuchs-schwanz.* S.

Habitat in pratis fertilibus subhumidis,

Floret Aprili, Majo.

43 ALOFECURUS *geniculatus* culmo spicato in-
fracto.

Germ. *Knoten-Fuchs-schwanz.*

Habitat in uliginosis, inundatis ubique.

[Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund. *Auf der Trib-
seer Weide.* Item *in der Papenhæger Wiese,*
& alibi freq.

Floret Junio.

44 ALOPECURUS *paniceus* panicula subspicata,
glumis villosis, corollis aristatis. †

Germ.

Habitat in hortis, cultis infrequens.

45 MILIUM *effusum* floribus paniculatis dispersis
muticis.

Germ. *Straußiges Fladdergrass.*

Habitat in sylvis, nemoribusque umbrosis pa-
sim.

[Gryph. *In luco Hohenmühlensi.*] Sund. *In
cæduis sylvæ Abshagensis frequens.*

Floret Junio.

- 46 AGROSTIS** *spica venti* petalo exteriore exserte aristam rectam strictam longissimam.
 Germ. *Acker Straussgrass.*
 Habitat inter segetes copiosissima.
- 47 AGROSTIS** *arundinacea* panicula oblonga, petalo exteriore basi villoso, arista torta calyce longiore.
 Germ. *Rohrartiges Straussgrass.*
 Habitat in glareosis, juniperetis passim.
- 48 AGROSTIS** *rubra* paniculæ parte florente patentissima, petalo exteriore glabro terminato arista tortili recurva.
 Germ. *Rothes Straussgrass. S.*
 Habitat in campis, apricis, v. gr. Sund. *In der Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee.*
- 49 AGROSTIS** *canina* calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis.
 Germ. *Braunes Straussgras. S.*
 Habitat in humidiusculis.
- 50 AGROSTIS** *capillaris* panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. †
 Germ. *Haar-Straussgras. S.*
 Habitat in umbrofis solo fertili. [Gryph. zu *Hohenmühlen.*]
- 51 AIRA** *cærulea* foliis planis, panicula coarcta ta, floribus pedunculatis muticis convoluto subulatis.
 Germ. *Blaue Schmielen.*
 Habitat in pascuis aquosis, cæspitosis, uliginosis

sis frequens. v. gr. Sund. *In der Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee.*

- 52 AIRA aquatica foliis planis, panicula patente, floribus muticis lœvibus calyce longioribus.

Germ. *Wasser-Schmielen.*

Habitat in pascuis fossis aquosis passim freq.

Sund. In fossis vor dem Knieper Thor zwischen dem Glacis und der Salpeter-Siederey, wo chedem das Retrenchement gelvesen copiofissima. Rug. in fossis aquosis prati Camp-Wiese dicti, prope Tribberaz.

Floret Junio, Julio.

- 53 AIRA cæspitosa foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque : arista recta brevi.

Germ. *Raasen-Schmielen.* S.

Habitat in pratis cultis & fertilibus passim.

Sund. *Am Barth'schen Wege, ehe man nach der Vogelsang'schen Brücke kömt, zur Rechten, in den Wiesen* copiose.

- 54 AIRA flexuosa foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis.

Germ. *Drat-Schmielen.* S.

Habitat in glareosis, ericetis, apricis, fccis, frequens.

Sund. *In der Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee.*

Floret Junio.

- 55 AIRA montana foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis : arista tortili longiore,

Germ.

Germ. *Berg-Schmielen.*

Habitat in apricis, aridis, ericetis, vulgaris.

§6 *AIRA canescens* foliis setaceis: summo spatheo paniculam inferne obvolvente. †

Germ. *Graue Schmielen.*

Habitat in duris arenosis siccis.

[Gryph. *Zu Hanshagen bey dem Kirchenholz.*]

§7 *MELICA nutans* petalis imberibus, panicula nutante simplici.

Germ. *Hangendes Schængras.* Schreb.

Habitat in sylvestribus montosis rarius.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp, circa Hinrichshagen.*] Jasm. *Am Wege von Sagard nach Hagen, zur Rechten.*

Floret Junio.

§8 *POA aquatica* panicula diffusa, spiculis sexforis linearibus.

Germ. *Wasser-Viehgras.* S.

Habitat ad ripas lacuum, in fossis aquosis, frequens.

[Gryph. *Im äußern Stadtgraben beym Fetten Thor am Steg, worüber man nach den Galgenkamp geht.*]

Sund. *Am Knieper Teich.* v. gr. *beym Tribseer Thor.*

Floret Julio.

§9 *POA trivialis* panicula subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti.

Germ. *Dreyblüthiges Viehgras.* S.

Habitat in pascuis graminosis, frequens.

Floret Julio.

60 *POA pratensis* panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.

Germ. *Fünfblütiges Viehgras.* Schreb.

Habitat in pratis. [Gryph. *Bey Eldena.*] Sund.

Vor dem Knieper Thor, rechter Hand, zwischen dem Glacis und der Salpeter-Siederey, an den Graben.

Floret Junio.

61 *POA annua* panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso.

A) viridis. B) spiculis rubentibus.

Germ. *Sommer-Viehgras.* S.

Habitat ad vias vulgaris. Sund. *Auf dem Franken-Glacis copiosissime.*

Floret Junio, Julio.

62 *POA compressa* panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso.

Germ. *Berg-Viehgras* S.

Habitat in siccis, muris, tectis. Gryph. *Auf und an der Stadtmauer, v. gr. beym Fleischer-Thor.* Sund. *Auf der Stadtmauer, frequens.*

Floret Junio.

63 *POA nemoralis* panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.

Germ. *Wald-Viehgras.* S.

Habitat in nemorosis umbrosis [Gryph. *Vorne im Eldenaer Holz, neben dem Wege nach Kætenhagen.*] Sund. *Am Barth'schen Wege Kettenhæger Remel.*

Floret Julio.

64 *BRIZA media* spiculis ovatis, calyce flosculis
(7) breviore.

Germ. *Wiesenzittergras*. Schreb.

Habitat in apricis siccis, ad vias, frequens.

Floret Junio, Julio.

65 *DACTYLIS glomerata* panicula secunda glo-
merata.

Germ. *Knaulgras* Schreb.

Habitat in cultis, ruderatis, ad vias, in litoribus
apricis praeruptis, ubique.

Floret Junio.

66 *CYNOSURUS cristatus* bracteis pinnatifidis.

Germ. *Gefiedertes Kammgras*. Schreb.

Habitat in pratis frequens, & juxta vias.

Floret Julio.

67 *FESTUCA ovina* panicula secunda coarctata
aristata, culno tetragono nudiusculo, foliis
setaceis.

Germ. *Schaaf-Schwingel*. Schreb.

Habitat in collibus apricis aridis sterilibus, eri-
cetosis, vulgaris. v. gr. [Gryph. *Auf dem*
Fuchsberge; zu Ludwigsburg.] Sund. *In der*
Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee.

Floret Junio, Julio.

68 *FESTUCA rubra* panicula secunda scabra, spi-
culis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mu-
tico, culino semitereti.

Germ. *Rother-Schwingel*. S.

Habitat in sterilibus siccis.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. in litorie
summo inter *Alte-Fähr & Grabl* frequens
item

item, in pratis *am Barth'schen Wege nach der Vogelsang'schen Brücke.*

Floret Julio.

- 69 FESTUCA *decumbens* panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. †

Germ. *Kriechender Schwingel.*

Habitat in pascuis paßim, ad vias publicas rārior. [Gryph. *An der Landstrasse nach Hinrichshagen.*]

- 70 FESTUCA *elatior* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis, exterioribus teretibus.

Germ. *Wiesen-Schwingel.* Schreb.

Habitat in pratis fertilibus.

Floret Julio.

- 71 FESTUCA *fluitans* panicula ramosa erecta, spiculis subfessilibus teretibus muticis.

Germ. *Manna, Mannschwingel.* Schreb.

Habitat ubique in fossis aquosis, & paludosis, hinc inde copiosissima. v. gr. Sund. *In einem Soll zwischen dem Haynholzschen und Vogelsang'schen Busch* copiosissima. item *in der Papenbäger Wiese & alibi.*

Floret Junio.

- 72 BROMUS *secalinus* panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis.

Germ. *Tresp, Rockentresp.* Sch. Nostr. *Drespel.*

Habitat in agris secalinis arenosis nimius ruricolis invisus.

- 73 BROMUS *arvensis* panicula nutante, spiculis ovato-oblongis.

Germ. *Ackertresp.* Schreb.

Habitat locis ruderatis, siccis, ad vias, & margines agrorum, frequens, v. gr. Sund. in vallo urbis.

74 BROMUS tectorum panicula nutante, spiculis linearibus.

Germ.

Habitat in agris siccissimis, secalinis & triticeis.

75 BROMUS giganteus panicula nutante, spiculis quadrisfloris, aristis brevioribus.

Germ. *Hoher Tresp.*

Habitat in sylvestribus; adque litora maris passim.

Sund. *Am Drigger Ort am Strandे* copiose.
item *Am Barth'schen Wege zur Linken im Busche gegen Grünhufe.* Witt. *Am Ufer zw. Viitte und Arcona* copiose.

Floret Julio.

76 AVENA fatua paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus basi pilosis aristis totis lævibus.

Germ. *Wildhafer.* S.

Habitat in agris inter segetes, inque campis siccis sterilibus, passim.

Floret Julio.

77 AVENA pratensis spicata calycibus quinquefloris.

Germ. *Wiesenhafer.* Schreb.

Variat calycibus 5-6-7-9 floris.

Habitat in paucis siccis, apricis, ruderatis; v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Auf dem Alt-Fährschen Walle, beym Wege nach*

nach Gustow zur Linken copiose. item *Auf dem Stadt Walle* frequens.

- 78 ARUNDO *phragmitis* calycibus quinquefloris,
panicula laxa.

Germ. *Rohrschilf*. S.

Habitat in lacubus, piscinis, fossis, paludibus.

[Gryph. in Ricco.] Sund. *Im Knieper Teich*.

- 79 ARUNDO *epigejos* calycibus unifloris, pani-
cula erecta, foliis subtus glabris.

Germ. *Bergschilf*. S.

Habitat in collibus, aggeribus, agrorumque
acervis.

[Gryph. in agris circa Subsolw.] Sund. *An
Barthschen Wege*.

- 80 ARUNDO *Calamagrostis* calycibus unifloris,
culmo ramoso.

Germ.

Habitat in paludibus graminosis, fossis aquosis
nemorosis, rario.

Sund. *beym Barthschen Wege zur linken gegen
Grünhufe im Busch am Graben*. copiose.

Floret Julio.

- 81 ARUNDO *arenaria* calycibus unifloris, foliis
involutis mucronato-pungentibus.

Germ. *Sandschilf*.

Habitat in litoribus maritimis arenosis.

Sund. In summo litore prope *Alte-Fähr* versus
Poppelviz frequens.

- 82 LILIUM *perenne* spica mutica: spiculis com-
pressis muticis.

Germ. *Perennirender Lüch*. S. Nostrat. *Dnekl.*

Habitat ad yersuras agrorum, ad vias, inque
pratis

pratis, pascuis, solo fertili argilloso haud infrequens.

- 83 *LOLIUM temulentum* spica aristata: spiculis aristatis compressis.

Germ. *Taumel-Lilch.* S.

Habitat in agris inter *Hordeum & Linum*.

Floret Junio.

- 84 *ELYMUS arenarius* spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus.

Germ. *Flugsandgrass.* Schreb.

Habitat ad litora marina, in arena alba, mobili.

[Gryph. *Bey Wampen und auf dem Streng.*]

Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow, auf dem Parowschen Haken.* item zwischen Barboft und Zarentin. Rug. *Auf den Ralswykischen Dûnen bey Ahlbek cop.* Jasim. *Am Strande zwischen Lischow und Vorwerk.* Witt. *Am Strande bey Drewohlk.*

Floret Julio.

- 85 *HORDEUM murinum* flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis.

Germ. *Mause-Gerste.* Schreb.

Habitat in aggeribus urbium, ruderatis, ad vias, ubique, v. gr. Sund. in vallo urbis zwischen dem Küter und Triebseer-Thor. copiose.

- 86 *TRITICUM repens* calycibus subulatis quadri-floris acuminatis.

Germ. *Quækgrass.* *Quækweizen.* Schr. Nostr. *Quaken,* Pharmac. *Gramen.*

Habitat in cultis; vix extirpanda.

TRIGYNTA.

87 *HOLOSTEUM umbellatum* floribus umbellatis.

Germ.

Habitat in collibus siccis apricis passum copiose.
 [Gryph. In vallo urbis meridiem versus, *beym Fleischer Thor.* copiosissime.] Sund. Am Wege nach Voigdthagen linker Hand gleich hinter dem Käpfenberge. item Am hohen Graben jenseits des Grabens linker Hand, bey der hohen Brücke. copiose.

Floret Aprili.





CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

88 SCABIOSA Succisa corollulis quadrifidis aequalibus caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.

Germ. *Abbiss*, *Teufelsabbiss*. Pharmac. *Morsus Diaboli*.

Habitat in pratis, pascuis, sylvestribus humidiusculis frequens. v. gr. [Gryph. in collibus zu Klein-Zastrow.] Sund. *Am VVege von Neegass nach Seemühlen zur Rechten im Moor* copiose & alibi.

Floret Julio.

Varietatem foliis radicalibus hirsutis, caulinis nullis, vel duobus minimis, scapo simplicissimo vix palmari, frequentem legi in *Rugia auf der VVeide zwischen Trent und Libniz*.

89 SCABIOSA arvensis corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis: lobis distantibus.

Germ. *Apostem Kraut*, *Scabiosen*. Pharm. *Scabiosa*. Habitat juxta segetes, inque pratis haud infrequens.

Floret Junio, Julio.

90 SCABIOSA Columbaria corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis setaceis pinnatis.

Germ.

Habi-

Habitat in siccioribus, collibus apricis rarioꝝ.
 [Gryph. in colli & siccis ante ponticulum juxta
 viam qua itur ad Klein-Zasjrow.] Pom. ad
 viam publicam qua itur Sundiā Tribbeſeam,
 ultra pagum Drechow passim. Circa Sundi-
 am non reperi.

Floret Iulio, Augusto.

- 91 SCABIOSA ochroleuca corollulis quinquefidis
 radiantibus, foliis linearibus pinnatis, radica-
 libus bipinnatis, petiolis perfoliatis.

Germ.

Habitat in siccis, elatis, rarioꝝ apud nos planta.
 Jasim. An den Ufern der Stubbenitz passim co-
 piōſiſſime. Rug. In der Ralſelwyker Heide
 am VVege von Bergen nach der Jasmundi-
 ſchen Fähre; nec alibi viſa.

Floret Julio.

Obſ. Planta (mihi) Foliis radicalibus ovatis,
 obtusis, crenatis, petiolatis, pubescentibus; cau-
 linis oppositis, (petiolorum basibus perfoliatis
 vaginantibus, vaginis pubescentibus) infimis
 pinnatis, pinnis incisis, extima majori ovata
 obtusa crenata: ſequentibus pinnatis, pinnis
 pinnatifidis, pinnulis acutis linearibus; ſum-
 mis pinnatis, pinnis acutis linearibus. Cau-
 lis ſimplex, vix uno alteroꝝ ramulo instru-
 etus, Pedunculis longis, striatis, prope florem
 pubescentibus. Flores pallide cœrulei.

- 92 SHERARDIA arvensis foliis omnibus verti-
 cillatis, floribus terminalibus.

Germ.

Habitat in agris, novalibus, rarer circa Sun-diam Gryphiamque; frequentior in Jasim. Floret Julio.

93 *ASPERULA odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis.

Germ. *VValdmeister, Sternleber-Kraut. Pharm. Matrisylvia.*

Habitat in sylvis, umbrosis. v. gr. [Gryph. *Im Eldenaer Holze zur rechten des VVeges nach Kætenhagen copiosissime.*] Sund. *An der Voigthæger Priester Trift zur rechten. item im Abshæger Holz frequens.* Jasim. *in der Stubniz beym Kænigstuhl & aliis locis copiosissima.*

Floret Junio, Julio.

94 *GALIUM palustre* foliis quaternis obovatis in-æqualibus, caulibus diffusis.

Germ.

Habitat in rivulis limosis, paludibus frequens v. gr. [Gryph. *inter Hohenmühlen & Elns-hagen.*] Sund. *Im Pütter Moor. item in der Papenhæger VViese copiole & alibi.*

Floret Junio, Julio.

95 *GALIUM uliginosum* foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus.

Germ.

Habitat in campis humidiusculis, pascuis aquosis. Floret Junio.

96 *GALIUM verum* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus.

Germ.

Germ. *Meyenkraut, Lab-Kraut, unser Frauen Bettstroh, VValdstroh.* Pharmac. *Galium luteum.*

Habitat in pratis siccis, graminosis, ad viarum agrorumque margines frequens. v. gr. Sund. *Am Alt-Fährschen VVall.* item, *am Barth-schen VVege.* item, *vorm Knieper Thor & alibi,* Floret Majo, Junio.

97 *GALIUM boreale* foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, feminibus hispidis.

Germ. *VVeissmeyenkraut,*

Habitat in pratis humidis, sterilibus.

Poin. prope *Barth im Satelschen Moor;* circa Sundiam a me non repertum.

Floret Julio.

98 *GALIUM Aparine* foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis fructo hispido.

Germ. *Klebkraut, Zaunreiss, Klebrick.*

Habitat in cultis, ruderatis, ad sepes ubique.

Floret Junio, Julio.

99 *PLANTAGO major* foliis ovatis glabris, scapotereti, spica flosculis imbricatis.

Germ. *VVegerich, VVegeblat.* Pharmac. *Plan-tago latifolia*

Habitat in viis, hortis ubique & in pratis.

Floret Junio & serius.

100 *PLANTAGO media* foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti.

Germ. *Kleiner VVegerich.*

Habitat in pasquis sterilibus argillosis apricis. Sund.

Sund. Auf der Franken VVeide bey der Helle.
item, Auf den Devinschen Ort copioſa & alibi.
Floret Julio, Augufto.

101 PLANTAGO *lanceolata* foliis lanceolatis, spi-
ca subovata nuda, ſcapo angulato.

Germ. Schmaler VVegerich.
Habitat in campis sterilibus, juxta vias & agros
ubique.

Floret Majo, Junio.

102 PLANTAGO *maritima* foliis ſemicylindraceis
integerrimis: baſi lanatis, ſcapo tereti.

Germ. See-VVegerich.
Habitat in litoribus marinis fabulofis frequens.
v. gr. [Gryph. pone VVampen.] Sund. Auf
der VVeide vor dem Franken Thor, bey der
Schinder-Brücke copioſe. item, Am Drigger
Ufer gegen den Devinschen Ort, über copio-
fiffime & alibi.

Floret Julio

103 PLANTAGO *Coronopus* foliis linearibus den-
tatis, ſcapo tereti.

Germ.
Habitat in maritimis paſſim frequens. v. gr.
Sund. Auf der Franken VVeide cum præce-
dente. item, Am Drigger Ufer gegen den
Devinschen Ort über frequentiffime.

Floret Julio; Augufto.

104 SANGUISORBA *officinalis* spicis ovatis.
Germ. Blutkraut, VViesenknäpf, Biebernell.

Pharmac. Pimpinella Italica.
Habitat in ſiccioribus rariffima. Semel legi in
VVittowiae litore Arcona dicto.

105 COR.

105 CORNUS *sanguinea* arborea, cymis nudis. †
Gerin.

Habitat in arbustis & dumetis.

106 ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis.

Germ. *Sinau*, *Læwenfuss*. Pharmac. *Alchemilla*.

Habitat in paucis, siccis passim. v. gr. [Gryph.
zu Ludwigsburg oben im Elmshæger Holz
nach Höhenmühlen hin.] Sund. *Am Ufer bey
Barbæft* & alibi rario. Rug. prope *Bergen*
in monte *Rüdigard* dicto, copiose.

Floret Majo, Junio.

D I G Y N I A.

107 CUSCUTA *europaea* floribus sessilibus.

Germ. *Frauenhaar*, *Flachsseide*. Pharmac. a)

Cuscuta b) *Epithymum*.

Habitat a) in fruticibus, nec non *Urtica*, *Lupo-*
lo, *Cannabi*, parasitica. v. gr. [Gryph. *auf*
dem Galgenkamp in vepretis ad fossam, quæ
est inter agrum et arbusta.] Sundiae, *in*
der Voigtbæger Priester Trift, *rechter*
Hand, item *im Haynholzschen Busch*.
b) *Epithymum* nondum reperi.

Floret Junio.

T E T R A G Y N I A.

108 ILEX *Aquifolium* foliis ovatis acutis spinosis.

Germ. *Stechpalmen*. Nostrat. *Hülzen-Busch*.

Habitat in sylvis passim frequens solo sterili
glareoso.

[Gryph.

† [Gryph. In sylva Eldenaensi.] Sund. *im Steinbäger Holz*, item *im Absbæger VValde*.
 Iasmund. *am Ende der schmalen Heide nach Iasmund zu, am VVege nach Reez frequens*
adultior. Floret Junio.

109 POTAMOGETON *natans* foliis oblongo-ovalis petiolatis natantibus.

Germ. *Saamkraut, fliessend Saamkraut, VVeyer-Blätter.*

Habitat in lacubus, fossis aquosif v. gr.

[Gryph. in Ricco.] Sund. *im Knieper Teiche et alibi frequens.* Floret Julio.

110 POTAMOGETON *perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulibus..

Germ. *durchgewachsenes Saamkraut*

Habitat in lacubus argillofisis.

Sund. *im Andershæffchen und Voigthægenschen Teich* copiose; alibi minus frequens,

111 POTAMOGETON *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus.

Germ. *Klar Saamkraut.*

Habitat in lacubus, stagnis, fluviis argillofisis infrequens.

[Gryph. in piscina zu Hohenmühlen.]

Sund. *im Knieper Teich, item im Andershæffchen Teich.*

112 POTAMOGETON *Crispum* foliis lanceolatis alternis undulatis ferratis.

Germ. *Krauss-Saamkraut.*

Habitat in lacubus, fossis, et rivulis.

Sund. *im Knieper Teich copiosissimum.*

Floret Junio.

113 POTAMOGETON *marinum* foliis linearibus
alternis distinctis inferne vaginantibus.

Germ. - See-Saamkraut.

Habitat in mari Balthico versus litora. v. gr.
Sund. im Strande vor dem Knieper Thor, et
alibi frequens.

Floret Julio.

114 POTAMOGETON *pustillum*, foliis linearibus
oppositis, alternisque distinctis: basi paten-
tibus, caule tereti. †

Germ. klein Saamkraut.

Habitat [Gryph. in palūdibus passim et in in-
undatis Ricco adjacentibus.]

115 SAGINA *procumbens* rāmis procumbenti-
bus, petatis brevissimis.

Germ.

Habitat in pascuis sterilibus apricis frequens,
v. g. [Gryph. juxta agrum et prope pratum
inundatum bey Hohenmühlen.] Sund. in der
Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee.

Floret Junio.



CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

#16 *MYOSOTIS scorpioides* seminibus nudis: foliorum apicibus callosis.

(A) *arvensis* foliis hirsutis.

Habitat in campis, arvis, aridis ubique.

(B) *palustris* foliis glabris.

Germ. *Vergiss mein nicht.*

Habitat in aquosis, scaturiginosis, palustribus frequens.

(C) *minima*, flosculis subluteis.

Habitat in campis apricis sterilibus siccis, v. g.

Sund. *Auf der Franken Weide gegen dem Käpfenberge, nach dem Strande zu, am Ufer.*

Floret Junio.

#17 *LITHOSPERMUM officinale* seminibus lăvibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis.

Germ. *Steinsaame, Steinhirse, Meerhirse.* Pharmac. *Lithospermum.*

Habitat in glareosis, siccis, ruderatis, passim copiose.

[Gryph. *An der Stadtmauer & in vallo.*] Sund.

Am Andershæf'schen See bey der Helle am Bollwerk. Pom. *Auf dem Loitzer Schloss-Platze copiosissime.*

Floret Junio, Julio.

118 LITHOSPERMUM arvense seminibus rugosis,
corollis vix calycem superantibus.

Germ. *Acker-Steinsaame.*

Habitat in agris & arvis frequens. Gryph. &
Sund. *Auf den VVällen.*

Floret Aprili, Majo.

119 ANCHUSA officinalis foliis lanceolatis, spicis
imbricatis secundis.

Germ. *Ochsenzunge, rothe Ochsenzunge.* Phar-
mac. *Buglossa.*

Habitat in ruderatis, ad vias, agros. v. gr.
[Gryph. *Zu Hanshagen & auf dem Kirchho-
fe zu Neuenkirchen.*] Sund. *Auf dem Voigt-
bæger Kirchhofe.* Iten *Auf dem Altfährschen
VValle,* item *am Devinschen Ort.* & alibi.

Floret Junio.

120 CYNOGLOSSUM officinale staminibus corol-
la brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomen-
tosis sessilibus.

Germ. *Hundeszunge.* Pharmac. *Cynoglossa.*

Habitat in ruderatis, ad vias, pagos, locis ar-
gillosis ubique.

Floret Junio.

121 PULMONARIA officinalis foliis radicalibus
ovato-cordatis scabris.

(A) foliis maculosis.

Germ. *Fleckigtes Lungenkraut.* Pharmac. *Pul-
monaria maculosa.*

Habitat in sylvaticis, nemorosis, rario.

Pom. *Im Læbnitzer Holz.* Prope Barth im Zat-
telschen Busch copiose.

(B) foliis non maculosis.

C

Germ.

Germ. *Lungenkraut.*

Habitat in nemoribus frequentior, v. g. [Gryph. Zu Hohenmühlen & sylva Grubenhagensi locis subhumidis.] Sundiae Im Haynholzschen Busch copiose & vor dem Devinschen Ort auf dem Ufer sub fruticibus. Jasm. In dem Borowschen Bach, & prope Sagard an dem bohlen VVege nach dem Täpferberge.

Floret Aprili, Majo.

122 SYMPHYTUM *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus.

Germ. *Schwarzwurz*, *Beinwelle*, *VWallwurz*.
Pharmac. *Consolida major*.

Habitat in umbrosis, humidis, aquosis, fossis, ad ripas lacuum graminosas, ubique; variat flore albo, purpureo & cœruleo.

Floret Majo, Junio.

123 ASPERUGO *procumbens* calycibus fructus compressis.

Germ. *Zaunreiss.*

Habitat in ruderatis, ad pagos, & sepes suburbanum frequens. v. gr. Gryph. Vor dem Fleischer Thor. Sund. Auf dem Tribseer Damm.

Floret Junio & serius.

124 LYCOPSIDIS *arvensis* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis.

Germ. *Schminkwurz.*

Habitat in agris ubique.

Floret Majo, Junio.

125 ECHIUM *vulgare* caule tuberculato-hispido, foliis

foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus
spicatis lateralibus.

Germ. *VVilde Ochsenzunge, blaue Ochsenzunge.*
Variat fioribus albis sed rarius.

Habitat ad vias & agros.

[Gryph. rarius; zu Griebenow vor dem Schlosse
ad viam publicam Gryphiam inter & Sund.]

Circa Sundiam frequens v. gr. Auf dem
Knieper Kirchhofe. Item vor dem Käpfenber-
ge, zur Rechten, item am VVege nach Stein-
bagen copiose & alibi. Kug. *Am VVege bey*
Rothenkirchen.

Floret Junio, Julio.

126 PRIMULA veris officinalis foliis dentatis ru-
gosis, limbo corollarum concavo.

Germ. *Schlüsselblume, Schlagkraut.* Pharmac.
Primula veris.

Habitat in pratis, nemorosis passim copiose.

[Gryph. *An den Gräben im Eldenaischen Holze*
nahe bey dem VVege nach Kätenhagen.]

Sund. Auf dem Devinschen Ort & in litore des
Devinschen oder Nonnen-Sees an der Devin-
schen Seite. Item am Ufer inter Zarrentin
& Barhæft. copiose.

Pom. Haud procul a Barth prope villam Zat-
tel in nemore Steinbrings Busch dicto. cop.

Jasm. *Im Hagenschen Gehege* copiose. Item am
Ufer in der Gegend von Stubbenkammer pas-
sim frequens.

Witt. *bey Arcona.*

Floret Aprili, Majo.

127 PRIMULA farinosa foliis crenatis glabris,
florum limbo plano.

Habitat in campis sterilibus humidiusculis, ra-
rissima.

Sund. Am Franken Retrenchement von der
Wache gegen dem Franken Teich zu in einer
Bastion solo humidiusculo. Nos Poin. Am
Wege von Barth nach Planitz beym Galgen-
berge. Th. Pyl. Med. Cultor.

Floret Majo, rarius Aprili.

128 MENYANTHES trifoliata foliis ternatis.

Germ. *VVasser-Dreyblatt*, *Bieberklee*, *Sumpf-
klee*. Nostr. *Dreyblatt*. Pharm. *Trifolium a.
quaticum*.

Habitat in paludibus, fossis aquosis, pratis u-
bique. v. g. [Gryph. Zwischen dem Fleischer
und Fetten Thor; copiosissima hinter der
letzten Mühle etc.]

Sund. Am Knieper Mühlengraben frequens. Item
am Franken Teich gegen der *VVeide* zwi-
schen dem Franken und Tribseer Thor co-
piosissima & alibi.

Floret Junio.

129 HOTTONIA palustris pedunculo verticilla-
to-multifloro.

Germ. *VVasser-Viole*.

Habitat in paludibus, præcipue pratensibus, sta-
gnis, fossis aquosis, frequens.

Floret Júnio, rarius Majo.

130 LYSIMACHIA vulgaris paniculata, racemis
terminalibus.

Germ. *Gelber VVeiderich*.

Habitat ad ripas & paludes. v. gr. [Gryph. Auf dem Galgenkamp.] Sund. Im Voigtbäger Moor, item Papenhäger VViese & alibi frequens.

Floret Junio, Julio.

131 LYSIMACHIA thrysiflora racemis lateralibus pedunculatis.

Germ. *VVasser-VVeiderich.*

Habitat in aquosis, paludosis passim frequens. [Gryph. Im Stadtgraben hinter dem Collegio.]

Sund. vor dem Tribseer Thor, hinter dem zweyten Thor, wo die Scheide zwischen dem Knieper und Franken Teiche ist, item, an der Insel, die im Knieper Teich vor der ersten Bleiche ist copiosissime, item, im Graben bey der Allée nach Papenhagen zur Linken, copiose. item, vor Neegass im Busche & alibi.

Floret Junio.

132 LYSIMACHIA nemorum foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente.

Germ. *VVald-VVeiderich.*

Habitat in sylvis, nemoribus rarer.

Rug. Im Boldevitzer Holze, item, am VVege von Bergen nach der Jasmundischen Fähre in quodam nemore. Jasim. In der Stubbenitz passim frequens. solo humidiusculo.

Floret Junio, Julio.

133 LYSIMACHIA Nummularia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente.

Germ. *Egelkraut, Pfennigkraut. Pharmac. Nummularia.*

Habitat in umbrosis, sylvaticis, solo humido.

[Gryph. *Im Eldenaer Holze nicht weit vom Hofe.*] Sund. *Im Abskæger Holze hinter des Heide-Reuters Wohnung copiosissima.* Item *am Franken Teich.*

Floret Julio.

134 ANAGALLIS arvensis foliis indivisis, caule procumbente.

Germ. *Gauchheil, Grundheil.*

Habitat in agris, novalibus frequens.

In solo fertiliori major evadit simillima A. latifolix excepto colore corollarum, quin & continet legere varietatem foliis oppositis ternis cordatis amplexicaulibus magnis & latis, pedunculisque ternis, licet rarius.

Floret Junio.

135 CONVOLVULUS arvensis foliis sagittatis untrinque acutis, pedunculis unifloris.

Germ. *Ackerwinde, kleine V. Vinde. Nostrat.*

V. Veedwinde.

Habitat in agris, litoribus, apricis limosis frequens. v. gr. Sund. *Beym Knieper Brunnen, item, am See-Ufer vorm Knieper Thor bey der Redoute & alibi frequens.*

Floret tota æstate.

136 CONVOLVULUS sepium foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris.

Germ. *Zaunwinde, Zaunglocken.*

Habitat in sepibus ubique v. gr. Gryphiæ & Sundiæ ad sepes suburbiorum.

Floret Augusto.

I37 CAMPANULA *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.

Germ. *Gläcklein.*

Habitat in pascuis frequens, nec non in pratis & ad margines agrorum.

Floret Julio, Augusto.

I38 CAMPANULA *patula* foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula.

Germ.

Variat floribus purpurascientibus & albis.

Habitat in nemorosis, vepretis, passim frequ.

v. gr. Sund. *Im Busch vor Klein-Kordshagen,* item *in der Voigthäger Priester-Trift & al.*

Floret Junio.

I39 CAMPANULA *persicifolia* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus sub-serratis sessilibus remotis.

Germ. Nostr. *Glockenblume.*

Habitat in dumetis, asperis, juniperetis, ericetis, infrequens.

Sund. *In der Heide vor Brandshagen, rechter Hand bey den Hügeln.* Jasmi. in litoribus inter pagos Sasseniz & Criviz passim.

I40 CAMPANULA *rapunculoides* foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis.

Germ.

Habitat in pratis siccis, dumetis, aliisque locis aridis, passim.

Sund. *Beym Haynholz, auf der Wiese vor der Vogelstange,* item *auf dem Ufer zwischen Alte-Fehr und Grahl.*

Floret Julio.

C 4

Caulis

Caulis *simplex*, uno altero *ramulo instructus*,
sulcatus, vix *bispidus*. Folia *ovato-lanceo-*
lata, *sessilia*, (*infima rarius ovato-petiolata*)
inequaliter serrata, *scabra*. Flores *sparsi*,
dispositi in racemum simplicem, subsecundum,
foliatum, cernui, pedicellis brevibus. Ad
ortum singulorum pedicellorum singula folia,
quorum superiora sensim minora, angustiora,
summa minima, lanceolata, integerrima.
Calyces scabri, reflexi. Corollæ *ceruleæ*,
interne nuda, infundibuliformes, supra dimi-
diam partem quinquefidae.

141 CAMPANULA Trachelium caule angulato,
foliis petiolatis, calycibus ciliatis, peduncu-
lis trifidis.

Germ.

Habitat in nemoribus, sepibus.

Floret Julio.

Folia *hispida* ut. caulis. Corollæ *interne bir-*
sutæ. Variat pedunculis *simplicibus*, corollis
interne nudis.

142 CAMPANULA glomerata caule angulato sim-
plici, floribus sessilibus, capitulo terminali.

Germ.

Habitat in aridis, elatis, passim.

[Gryph. Im Helmsbæger Holz nach dem Pott-
 krug hin.] Sund. Auf dem Devinschen Ort
 copiose. Pom. Auf der alten Burg vor Barth

Floret Junio, Julio.

143 PHYTEVMA spicata spica oblonga, capsu-
 lis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis.

Germ.

Habitat

Habitat in Jasmundia sylva montosa Stubbenitz dicta. v. gr. Auf dem Koenigstuhl und am Stege von da nach dem Strande frequ. item bey Sasseniz im Lenzer Busch.

Floret Junio, Julio.

144 LONICERA Periclymenum capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis.

Germ. Waldwinde, Alfranken.

Habitat in sylvis, fruticetis frequens. v. gr. [Gryph. Auf dem Galgenkamp.] Sund. in der Andershaeßchen Koppel copiosissime.

Floret Julio.

145 LONICERA Xylosteum pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerimis pubescentibus.

Germ.

Habitat in litoribus Jasmundia inter pagos Sasseniz & Kriviz passim frequens. v. gr. Am Stege beym Koenigstuhl, und unten am Ufer beym Koenigstuhl copiose.

Floret Junio.

146 VERBASCUM Thapsus foliis decurrentibus utrinque tomentosis.

Germ. Wollkraut, Koenigskerze, Fackelkraut.

Pharmac. Verbascum (Folia.)

Habitat in glareosis sterilibus rarius.

Sund. Auf dem Devinschen Ort passim. Auf dem Danbohn.

Floret Junio & serius.

147 VERBASCUM nigrum foliis oblongo-cordatis petiolatis.

Germ. Wegkerze, Braunwurz. Pharmac. *Verbascum* (Radix. Flores.)

Habitat ad pagos, vias, inque sylvis cæduis, nemoribusque asperis passim frequens.

[Gryph. Zu Derschow.] Sund. Auf dem Ufer des Voigthaeger Teiches, an der Seite wo die Mühle ist, item am Ufer zwischen Altefehr und Grabl, item im Busch bey Grünhufe & alibi.

Floret Junio, Julio.

148 *Datura Stramonium* pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris.

Germ. Stechapfel, Dornapfel.

Habitat in ruderatis v. gr. in suburbii inter urbium rejectamenta; copiosissimum zu Gustow zwischen dem Baakenberge und dem Hofe zur Linken am Kubberge & ibidein am Kirchhofe.

Floret Junio.

149 *Hyoscyamus niger* foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus.

Germ. Dollkraut, Bilsenkraut. Nostr. Dullbilkerkrut. Pharm. *Hyoscyamus*.

Habitat in ruderatis pinguibus ubique frequens. Floret Julio, Augusto.

150 *Solanum Dulcamara* caule inerini frumento flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosif.

Germ. Je lenger je lieber. Hindschkraut. Ph. *Dulcamara*.

Habitat in fossis, ad ripas lacuum, locisque humentibus nemorosis.

[Gryph.

[Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund. *Am Knieper und Franken Teich.* item, *im Haynholzschen Busch & alibi.*

Floret Junio.

151 *SOLANUM nigrum vulgatum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus.

Germ. *Nachtshatten, Saukraut.* Pharmac. *Solanum.*

Habitat in hortis, cultis, ad pagos, & vias ubique frequens.

Floret æstate.

152 *RHAMNUS catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis.

Germ. *Creuzbeer, Wegdorn.* Pharmac. *Spina cervina.*

Habitat in sepibus, dumetis passim.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Am Ufer zwischen Barhæft und Zarrentin.* Jasin. prope *Sagard* in colli Dubberwört dicto copiose. item *An den Ufern der Stubbeniz.* v. gr. *beym Fusteige vom Königstuhl herunter nach dem Strande* frequens.

Floret Junio.

153 *RHAMNUS Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerriinis.

Germ. *Pinnholz, Faulbaum, Nostrat.* Pharmac. *Frangula.*

Habitat in nemorosis, humidiusculis, v. gr. Sund. *in der Andershöfischen Koppel,* item *zwischen dem Voigthäger Priester-Moor und dem*

dem Wege von Voigthagen nach Devin im
Kaalholz et alibi haud infrequens.

Floret Majo, Junio.

154 EVONYMUS Europaeus floribus plerisque
quadrisfidis.

Germ. Spillbaum, Spindelbaum.

Habitat in sepibus, dumetis passim.

[Gryph. auf dem Galgenkamp.] Sund. am ho-
ben Graben, item in der Andershöfchen-
und Voigthäger Priester-Koppel.

Floret Junio.

155. RIBES rubrum inerme, racemis glabris pen-
dulis, floribus planiusculis.

Germ. Johannisbeeren. Pharmac. Ribia.

Habitat in sylvis rarius,

Sund. vor Elmenhorst zur Rechten am Wege,
und im Holze copiose. Nos. Iasmund. im Moor
in der Gräflich Brabischen Westevizzser
Koppel am Bach. M. Willich.

Floret Aprili, Majo.

156 RIBES alpinum inerme, racemis erectis,
bracteis flore longioribus.

Germ. Nostrat. Schmargeln, Schmarten.

Habitat in Rugiae et Iasmundiæ nemorosis,
siccis elatis.

Rug. prope Bergen im Raddas, item am We-
ge von Bergen nach der Iasmundischen Febre.

Iasm. an den Ufern der Stubbennitz, Nos. item pro-
pe Sagard an der Middelbeck copiose: et
alibi. M. VVillich.

In Pomerania nondum visum.

Floret Majo, Junio.

157 RIBES *nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis.

Gerin. Gichtbeerbaum, Gichtbeeren. Pharm.

Ribia nigra.

Habitat in nemorosis, humidis frequens. v. gr.
[Gryph. in fossa Hinrichshagensi, und auf
dem Galgenkamp.]

Sund. am Voigthäger Teich an der Seite nach
Zitterhagen copiose, item in der Anders-
bößchen Koppel, vor dem Lüdershager Eller-
holze, et alibi.

Floret Aprili, Majo.

158 RIBES *Grossularia* ramis aculeatis, petiola-
rum ciliis pilosis, baccis hirsutis.

Gerin. Rauhbeeren.

Habitat in sylvestribus rarissima.

Sund. in der Voigthäger Priester Koppel.

Floret Maji initio.

Baccae hirsutae pilis brevioribus, quam in sati-
va, setae ad latera petiolorum subpennatae.

Folia tenerrime villosa, mollissima. Bracteae
diphylla; altero majori.

159 RIBES *Uva crispa* ramis aculeatis, baccis
glabris, pedicellis bractea monophylla.

Gerin. Stachelbeeren. Nostr. Stikkelbeeren.

Habitat in sepibus passim, forte ex hortis au-
fuga; et in sylvis. v. gr. Iasm. in der Stub-
benitz, am Ufer zur Rechten des König-
stuhls beym Fusssteige, rarius.

Floret Aprili.

160 HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque.

Gerin. *Epheu.* Nostr. *VVintergrün.* Pharmac. *Hedera arborea.*

Habitat in sylvis frequens. v. gr. [Gryph. in sylva Grubenhagensi et Eldenaensi.] Sund. *in der Andershæffschen Koppel copiose, et alibi.*

Floret Autumno.

161 GLAUX maritima.

Germ. *Milchkraut.*

Habitat in maritimis, salmis, frequens: v. gr. [Gryph. *auf dem Rosenthal.*] Sund. *am Strande vor dem Knieper Thor, und bey der Reiferbahn, item am Franken Retrenchements-Grabens linker Hand des Weges et alibi.*

Floret Junio Julio.

D I G Y N I A.

162 ASCLEPIAS Vincetoxicum foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis.

Gerin. *Schwalbenwurz.* Pharmac. *Hirundinaria.*

Habitat in siccis sterilibus.

[Gryph. *Auf dem Streng, inter Wampen continentem & insulam Kooss.*] Rug. *Auf der schmalen Heide, und in der Prora.* Jasim. in litoribus inter pagos *Sasseniz & Kriviz.* v. gr. *Bey dem Kieler-Bach, bey Trip-Ort, bey der Fahrniz & alibi frequens.* Witt. in summo litore inter *Gore & dem Gorschen Brunnen,* copiosissime. Sundia a me non reperta.

Floret Julio, Augusto.

163 HERNIARIA glabra glabra herbacea.

Germ.

Germ. Bruchkraut, Harnkraut. Pharmac. Her-maria.

Habitat in apricis, siccis, glareosis, ericetis frequens. v. gr. [Gryph Zu Ludwigsburg auf der Strandweide.] Sund. In der Heide zwischen Voigthagen und Zarndorf, & auf dem Devinschen Ort.

Floret Majo, Junio.

164 CHENOPODIUM Bonus Henricus foliis triangulari-sagittatis integerriminis, spicis compositis aphyllis.

Germ. Stolzer Heinrich, Guter Heinrich, Schmirgel. Phar. Bonus Henricus.

Habitat in ruderatis, ad pagos, juxta parietes, muros ubique.

Floret Majo, Junio.

165 CHENOPODIUM urbicum foliis triangulibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis.

Germ.

Habitat ad pagos & plateas infrequens.

166 CHENOPODIUM rubrum foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis foliosis caule brevioribus.

Germ. Rothe Melthe. Pharmac. Atriplex sylvestris.

Habitat in cultis, ruderatis, fmetis. Sund. Hinter die Hecken am Stadtgraben zwischen dem Küter und Tribseer Thor copiosissime.

167 CHENOPODIUM murale foliis ovatis nitidis acutis dentatis, racemis ramosis nudis.

Germ.

Habi-

- Habitat in ruderatis, aggeribus, adque inuros
passim. Sund. *Hinter die Hecken zwischen
dem Küter und Tribseer Thor.*
- 168 CHENOPODIUM album** foliis rhomboideo-
triangularibus erosis postice integris; sum-
mis oblongis, racemis erectis. †
Germ. *Weisse Melthe* Rupp. len.
Habitat passim in agris, cultis, ruderatis.
- 169 CHENOPODIUM viride** foliis rhomboideis
dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis.
Germ. *Grüne Melthe*.
Habitat in cultis, ruderatis, oleraceis, locisque
fertilibus nimium abundans.
Floret cum affinibus æltate,
- 170 CHENOPODIUM glaucum** foliis ovato-oblon-
gis repandis, racemis nudis simplicibus glo-
meratis.
Germ. *Gelbe Melthe, kleiner Schmirgel*.
Habitat ad summa, in plateis suburbiorum, fre-
quens; nec non interduum in litoribus mari-
timis arenosis.
- 171 CHENOPODIUM Vulvaria** foliis integerri-
mis rhoimboeo-ovatis, floribus conglomeratis
axillaribus.
Germ. *Wuhlkraut, Bockskraut, stinkende Mel-
the* etc. Pharmac. *Vulvaria*.
Habitat in cultis, oleraceis, rarius.
- 172 CHENOPODIUM polyspermum** foliis integer-
ris ovatis, caule decumbente, cymis dicho-
tomis aphyllis axillaribus. †
Germ. *Stauderich*.
Habitat in cultis.

173 CHENOPODIUM *maritimum* foliis subulatis
semicylindricis.

Germ.

Habitat in maritimis, salcis.

Gryph. *Bey den Gradierhäusern* copiose.

174 SALSOLA *Kali* herbacea decumbens, foliis
subulatis spinosis, calycibus marginatis axil-
laribus.

Germ. *Salzkraut*.

Habitat ad litora maris arenosa. v. gr. [Gryph.
Zu Wampen hinter der Koppel.] Sund. *Am
Strande nach Devin.* item, *Hinter Bauer-
Parow am Strande*.

Floret Julio.

175 ULMUS *campestris* foliis duplicato-serratis:
basi inæqualibus.

Germ. *Ulmbaum*. Nostrat. Röster. Phar. *Ulmus*.

Habitat ad pagos, inque sylvis.

Floret Martio, Aprili.

176 GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quin-
quefidis campanulatis oppositis peduncula-
tis, foliis linearibus.

Germ. *Herbstenzian*.

Habitat in humidis, sterilibus, ericotosis, rarior.

Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges zwi-
schen Neegass und Seemühlen*, locis ericeto-
sis copiose. item *In der Heide bey dem Mar-
tensdorfer Kruge*. Pom. *In der Cummerow-
schen Heide*. Alibi non visa.

Floret Augusto, Septembri.

177 GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefi-
dis infundibuliformibus, caule dichotomo. (A.

D

Germ,

Germ. *Tausendguldenkraut*. Pharmac. *Centaurium minus*.

Habitat locis apricis, passim. [Gryph. inter *Helmsbagen und Pottkrug, zu Hansbagen.*] Sund. *Bey Teschenhagen & alibi.*

(B *Centaurium minus pumilum ramosissimum.*
Habitat in pratis falfis rarius. [Gryph. zu *Wampen.*] Sund. *Auf dem Drigge in der Wiese zwischen dem Drigger Holz und Wampen.*

Floret Julio, Augusto.

178 *GENTIANA campestris* corollis quadrifidis fauce barbatis.

Germ. *Feldenzian.*

Habitat in pratis, pascuisque siccis, apricis frequens v. g. [Gryph. *In Hindrichshagen & auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Auf dem Käpfenberg an der Süderseite copiose. item, Auf dem Devinschen Ort frequens.* & alibi.

Floret Julio, Augusto, Septembri.

Folia calycina alterna majora. Corollae interdum quinquefidæ, sed rarius.

UMBELLATAE.

179 *ERYNGIUM maritimum* foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis.

Germ. *Mannes-Treu, Gemein Mennes-Treu.*

Habitat ad litora maris arenosa. v. gr. [Gryph. zu *Ludwigsburg & auf dem Streng.*] Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow copiosissimum.*

Floret Julio, Augusto.

180 *HYDROCOTYLE vulgaris* foliis peltatis, umbellis quinquefloris.

Germ.

Habitat in inundatis, paludosis subnemorosis ad radices fruticum, frequens. v. gr. Sund.

Im Moor hinter Bauer-Parow am Ende der Trift. item *Im Voigthaeger Moor im Haasen-Winkel, & auf dem Devinschen Ort an feuchten Stellen,* copiosissime.

Floret Augusto.

181 *SANICULA europaea* foliis radicalibus superplicibus, flosculis omnibus sessilibus.

Germ. *Sannikel.* Pharmac. *Sanicula.*

Habitat in sylvis nemoribusque umbrosis sat frequens. [Gryph. zu Ludwigsburg.] Sund. *in der Andershaeffschen Koppel* copiose, item *im Vogelsangischen Busch & alibi.*

Floret Junio.

182 *TORDYLIUM Anthriscus* umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis.

Germ.

Habitat prope vias, ad sepes, inque nemoribus, & in ruderatis, ante portas passim.

Floret Julio.

183 *DAUCUS Carota* seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *sylvestris.*

Germ. *Vogelnest.* Pharmac. *Daucus sylvestris.*

Habitat ad versuras agrorum, ad vias, & sepes, aliisque locis aridis. passim frequens, v. gr. [Gryph. ad fossam *bey der Trift am Busch zu VVampen* copiose.] Sund, *an hohen Gräben*

ben, item am Ufer des Devinschen oder Nonnen-Sees & alibi.

Floret Julio, Augusto.

184 *CONIUM maculatum* *seminibus striatis.*

Germ. *Schierling.* *Pharmac. Cicuta.*

Habitat in ruderatis ubique. v. gr. Sund. *vor der Garbodenhæger-Mühle am VVege linker Hand copiosissimum.*

Floret Junio, Julio.

185 *SELINUM palustre* *sublaetescens, radice unica.*

Germ.

Habitat in paludibus, sylvaticis umbrosis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey Hohenmühlten.*]

Sund. *Im Busch vor Neegass zur Linken, item bey Voigthagen im Kaalholz & alibi.*

Floret Augusto.

186 *ATHAMANTA Oreoselinum* *foliolis divaricatis.*

Germ.

Habitat in collibus siccis apricis.

Sund. *Auf dem Devinschen Ort frequens, & am hohen Ufer des Devinschen oder Nonnen-sees an der Devinschen Seite. Jasim. Am Wege von Sagard nach der Fehr zur Linken nahe vor der Fehr copiose.*

Floret Junio, Julio, Augusto.

187 *LASERPITIUM latifolium* *foliolis cordatis inciso-ferratis.* †

Germ. *Weis Hirtzwurz.* *Pharm. Gentiana alba.*

Habitat in umbrosis & sylvis densis solo sub-humido. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*]

188 *HERACLEUM Sphondylium* *foliolis pinna-tifidis.*

Germ.

Germ. *Teutsch Baerenklau.*

Habitat in nemorosis, pratis frequens. v. gr.

Sund. *im Haynholz'schen Busch und an der Voigthaeger Priester-Trift.* Variat foliis auratis licet rarius.

Floret Julio, Augusto.

189 ANGELICA *Archangelica* foliorum impari lobato.

Germ. *Angelik.* Pharm. *Angelica sativa.*

Habitat ad paludes rario. Sund. *im Priester-garten zu Gustow, am Teich* copiosissime.

Pom. *vor Barth an der Seite gegen der alten Burg zu.*

Floret Julio, Augusto.

Observ. Umbella universalis [*sapius prolifera*] copiosa, radiis angulatis, tenuerrime villosis; Partiales globosæ. Involucrum ut plurimum polyphyllum, foliolis lanceolatis integris, rarius trifidis, post florescentiam deciduum. Involucella polyphylla, linearia, reflexa. Petala acuta, viridia. Caulis striatus glaber. Folia inferiora supradecomposita, media decomposita, summa sapius ternata, vel biter-nata. Foliola ovato-lanceolata [majora, quam in sequenti] serrata, serraturis inaequalibus, acuminatis; Imparia omnia triloba, intermedio majori, interdum truncato; Paria non raro externo laterc lobo aucta.

Valde affinis sequenti, forsan solummodo varietas.

190 ANGELICA *sylvestris* foliis æqualibus ovato lanceolatis ferratis.

Germ. Wilde Angelik. Pharmac. *Angelicae sylvestris.*

Habitat ad paludes & locis sylvaticis humidis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey der letzten Windmühle vor dem Fetten Thor*] Sund. *Im Holze zwischen Bisdorf und Kinbackenbagen, beym Jagdhause* frequens, item *am Strande nach Devin, am Ufer copiose, item zwischen Gustow und Prossenitz an dem Graben copiosissime.*

Floret Augusto.

Observ. Umbella *universalis copiosa, radiis striatis, tenerrime villosis; Partiales subglobosae.* Involucrum nullum, vel, si adest, unifolium, lanceolatum aut subulatum; *Involucella polyphylla, subulata, reflexa.* Petala acuta, alba. Caulis *striatus, glaber, at Rami versus umbellas tenerrime villosi.* Folia inferiora supradecomposita, media decomposita, summa pinnata. Foliola ovato-lanceolata, serrata, serraturis inaequalibus acuminatis; *Imparia & Paria non raro lobo aucta.*

191 SIUM *latifolium* foliis pinnatis, umbellis terminalibus.

Germ. *Wasser-Pastinak.*

Habitat in rivulis, & ad ripas paludosas ubique Floret Julio, Augusto.

192 OENANTHE *fistulosa* stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis.

Germ. *Wasser-Steinbrech.*

Habitat in fossis aquosis, inundatis & ad ripas lacuum frequens. v. gr. [Gryph. *Am Steg worüber*

worüber man nach dem Galgenkamp geht.]
Sund. Am Knieper Mühlengraben. item in
der Papenhäger und Vogelsang'schen Wiese.

Floret Julio.

- 193 PHELLANDRIUM aquaticum foliorum rami-
ficationibus divaricatis.

Germ. *Unächter Schierling.*

Habitat in fossis aquosis, & ripis lacuum limo-
sis v. gr. [Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund.
Am Knieper Teich.

Floret Julio.

- 194 CICUTA virosa umbellis oppositifoliis, pe-
tiolis marginatis obtusis.

Germ. *Wasser-Schierling, achter Schierling.*

Pharmac. *Cicuta.*

Habitat cum præcedente in paludibus, & ad
ripas lacuum v. gr. Sund. *Am Knieper Teich*
copiosissime.

Floret Junio.

- 195 AETHUSA Cynapium.

Germ. Nostrat. *wilde Petersilie, Hunds-Peter-*
silie.

Habitat in hortis oleraceis.

Floret Junio, Julio.

Inter Apium Petroselinum habitans, interdum
ab ignorantibus lecta, nocet, quare probe di-
stinguenda. Hæc ante florescentiam distin-
guitur caule ad radicem fusco, quod non in
illo. Hæc primo anno floret, illud secundo.
Hujus flores albi, illius flavi &c.

- 196 SCANDIX Anthriscus semenibus ovatis hispi-
dis, corollis uniformibus, caule lævi.

Gerin.

Habitat in aggeribus, ruderatis, v. gr. Sundiæ
in vallo urbis inter Kütter & Catharinæ Ba-
stion frequens &c.

Floret Julio.

197 *CHAEROPHYLLUM sylvestre* caule striato,
geniculis tumidiusculis.

Germ. Nostrat. *Kalwerkropp*. Pharmac. *Cicu-
taria*.

Habitat in ruderatis, pratis, juxta sepes freq.
Floret Julio.

198 *CHAEROPHYLLUM tenuulum* caule scabro :
geniculis tumidis.

Germ. *Klein Kalwerkropp*.

Habitat ad arva, vias, & sepes passim, nec non
in vallis urbium.

Floret Junio.

199 *PASTINACA sativa* foliis simpliciter pin-
natis.

Germ. *wilde Pastinaken*. Pharm. *Pastinaca*.

Habitat in aggeribus, pascuis, passim v. gr.

[Gryph. *Auf dem Wall beym Fleischer Thor.*]

Sund. *aufferhalb des Tribseer Damms am
Barthschen Wege copiosissima, item am U-
fer des Strandes vor dem Knieper Thor.*

Floret Julio.

200 *CARUM Carvi*.

Germ. *wilder Kærwel, Wiesen-Kümmel*. Pharm.
Carvi.

Habitat in pratis siccis, duris.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. in pratis
am Barthschen Wege, zur Rechten, item zu

Alte-

Alte-Fehr auf dem Glacis an der Nordostlichen Seite *cypiosissimum.*

Floret Junio.

- 201 *PIMPINELLA saxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; suminis linearibus.

Germ. *Bocks-Peterlein.* Pharmac. *Pimpinella nostras.*

Habitat cum variationibus, in pratis paucisque siccis, sylvis & umbrosis v. gr. [Gryph. auf dem Galgenkamp, item im Helmshæger Holz nach dem Pottkruge bin.]; Sundiæ auf der Franken Weide, item am Wall zu Alte-Fehr, item in der Heide zwischen Voigthagen und Zarendorf, item in der Andershaeffschen Koppel, item im Vogelsangischen Busch & alibi.

Floret Julio, Augusto.

- 202 *APIUM graveolens* foliolis caulinis cuneiformibus, umbellis sessilibus.

Germ. *wilder Sellerie,* *Wasser-Eppich.* Pharm. *Apium.*

Habitat in humectis, praesertim maritimis, falsis.

Sund. am Devinschen oder Nonnensee, unten am hohen Ufer auf der Devinschen Seite frequens, alibi. rario. Gryphiæ semel a mœlectum ad viam, qua itur ad pagum Neuenkirchen a dextris in fossa aquosa.

Floret Julio.

- 203 *AEGOPODIUM Podagraria* foliis caulinis summis ternatis.

Germ. *Ziegenfuß.*

Habitat ad sepes, inque pomariis aliisque locis
graminosis frequens. v. gr. Sund. in vallo
urbis gegen dem Schützenhause copiosissime.
Floret Junio.

TRIGYNTA.

204 VIBURNUM *Opulus* foliis lobatis, petiolis
glandulosis.

Germ. *Hirschholder*. Nostrat. *Gooss-Fleder*.

Habitat in dumetis, sepibus, & sylvis loco hu-
midiusculo, passim. [Gryph. auf dem Gal-
genkamp.] Sundiae in der Andershæffchen
Koppel und am hohen Graben.

Floret Junio.

205 SAMBUCUS *Ebulus* cymis trifidis, stipulis
foliaceis, caule herbaceo.

Germ. *Attich*. Pharmac. *Ebulus*.

Habitat in sylvis & sepibus infrequens. Sund.
*an der Trift die vom Wege von Hof-Parow
nach Bauer-Parow zur Linken nach dem Moor
abgeht, zur Rechten am Graben, copiose,
alibi non visa.*

Floret Julio

206 SAMEBUCUS *nigra* cymis quinquepartitis,
caule arboreo.

Germ. *Fliederbaum*, *Hollunder*. Pharm. *Sam-
bucus*.

Habitat ad pagos & sepes ubique.

Floret Junio.

207 ALSINE *media* petalis bipartitis, foliis ova-
to-cordatis.

Germ.

Germ. *Hünerdarm. Hünerbiss. Nostr. Mihre.*
 Habitat in cultis ubique.
 Floret æstate.

TETRAGYNIA.

208 PARNASSIA palustris.

Germ. *Parnass-Gras, weisse Leberblumen. Ph.*
Hepatica alba.
 Habitat in uliginosis, frequens. v. gr. [Gryph.
hinter Hinrichshagen.] Sund. *in der Heide*
zwischen Seemühlen, Moysahl und dem Stein-
bæger Holze, locis uliginosis copiose, item
im Voigthæger Priester-Moor.
 Floret Junio, Julio, Augusto.

PENTAGYNIA.

209 STATICE *Armeria* scapo simplici capitato,
 foliis linearibus.

Germ. Nostr. *Haasenpoten.*
 Habitat in campis aridis, apricis ubique. v. gr.
 Sund. *zur Rechten am Wege zwischen dem*
Tribseer und Knieper Thor &c.
 Floret Julio.

210 LINUM catharticum foliis oppositis ovato-
 lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis.

Germ. Pharmac. *Linum catharticum.*
 Habitat in pratis humentibus, pascuis succulen-
 tis, passim frequens. v. gr. Sund. *in der*
Wiese zwischen dem Haynholzschen und Vo-
gelsangischen Busch, & alibi. Semel quoque
frequens

frequens legi Rügenæ in collibus aridis inter
Tribberaz & Dollahn magnitudine eximum.

Floret Julio.

- 211 LINUM Radiola** foliis oppositis, caule dichoto-
mico, floribus tetrandis tetragynis.

Germ.

Habitat locis sabulosis, inundatis rarius. [Gry-
phiæ bey Weidenhagen in der Moor-Koppel
nach dem Pottkrugē bin.] Sund. cum prio-
ri aliquoties lectum, sed rarius. Forsan
tantum varietas præcedentis, cui simillimum,
licet minus.

Floret Julio.

- 212 DROSERA rotundifolia** scapis radicatis, fo-
liis orbiculatis.

Germ. Sonnenthau. Pharm. Ros Solis.

Habitat in paludibus uliginosis in cæspitibus
Sphagni palustris. v. gr. [Gryph. im Moor
beym Pottkrugē.] Sund. im Voigthäger Prie-
ster-Moor, item im Moor vor Pütt, zur Lin-
ken; & alibi, copiose.

Floret Julio, Augusto.

- 213 DROSERA longifolia** scapis radicatis, foliis
oblongis.

Germ. Sonnenthau.

Habitat & floret cum præcedente.

POLYGYNIA.

- 214 MYOSURUS minimus.**

Germ. Mauselschwanz.

Habitat in ambulacris hortorum, viis, & agris,
& collibus apricis, solo limoso, sicco.

Floret Majo.

CLASSIS

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

215 ALLIUM *Scorodoprasum*, caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis anticipibus, staminibus tricuspidatis.

Habitat in nemorosis rarius.

Poin. *bey Barth im VVobbelkower Remel*, copiose, item *auf der alten Burg vor Barth*.

Floret Junio, Julio.

216 ALLIUM *arenarium* caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis. †

Germ. *Sandlauch*.

Habitat in campis arenosis, rarius.

217 ALLIUM *oleraceum* caule teretifolio bulbifero, foliis scabris seimiteribus subtus fulcatis, staminibus simplicibus.

Germ.

Habitat in aggeribus, litoribus, collibus siccis, paissim.

Sund. *Zu Alte-Fehr am VVall*, v. gr. *an der Norderseite, nahe beym Ufer*, copiose, item *an der Süderseite hinter dem Pfarrhause*, item *auf dem Devinschen Orte, und dem Ufer des Devinschen Sees*.

Floret Julio, Augusto.

218 ORNITHOGALUM luteum scapo angulofo
diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus.
Germ. Ackerzwiebel.

Habitat in agris, & umbrofis graminosis ubi-
que. v. gr. [Gryph. auf dem *VVall* hinter
dem Collegio.] Sund. an dem hohen Graben
und auf den daran liegenden Aeckern nach
dem Andershaeffchen See zu, item in der An-
dershaeffchen Koppel, item auf dem Elmenbor-
ster Kirchhofe copiosissimum.

Floret Aprili.

219 ORNITHOGALUM minimum scapo angulato
diphylo, pedunculis umbellatis ramosis.

Germ. Klein Ackerzwiebel.

Habitat in cultis, rarius in sylvis.

[Gryph. im Helmsbæger Holz, beym Richtsteig
nach Grubenhagen.] Sund. seimel legi ante
quinque annos am hohen *VVall* beym Knieper
Thor, postea frustra quæsivi; alibi non vi-
sum est. Floret Aprili.

220 ASPARAGUS officinalis caule herbaceo ere-
cto, foliis setaceis, stipulis duabus interiori-
bus, una exteriore.

Germ. wilder Spargel. Pharm. Asparagus.

Habitat in arenosis, passim frequens. v. gr.
[Gryph. auf dem *Wall* gegen Süden und auf
dem Galgenkamp] Pom. auf der alten Burg
vor Barth, copiose. Nos Sund. non visus.

Copiose nascitur in arenosis Insulæ Hiddensee
& auf Mænchgut, lectus a Patre meo.

Floret Junio.

221 CONVALLARIA *majalis* scapo nudo.

Germ. *Mayblumen*, *Lilien-Convallien*. Pharm.
Lilium Convallium.

Habitat in sylvis Gryphiæ & Sundiæ rario.
Sund. am Ufer des Strandes nach Devin unter
den Büschchen. Jasim. in der Stubbenitz pas-
sim copiosissima. Nos Rugs. im Boldevitzer
Holz copiose. M. Willich, Botan. Cultor.

222 CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis
amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis
axillaribus subunifloris.

Germ. *Weisswurz*. Pharmac. *Sigillum Salo-
monis*.

Habitat in sylvis, umbrosis. [Gryph. frequens
v. gr. auf dem Galgenkamp.] Sund. rario.
Jasim. prope Sagard in monticulo Dubber-
wort dicto copiose.

Floret Majo, Junio.

223 CONVALLARIA *multiflora* foliis alternis
amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis
axillaribus multifloris.

Germ. *Klein Weisswurz*.

Habitat in umbrosis, sylvis, nemoribus, fre-
quens. v. gr. [Gryph. auf dem Galgenkamp
bey Hohenmühlen.] Sund. in der Andershæf-
schen Koppel.

Floret Majo, Junio.

224 CONVALLARIA *bifolia* foliis cordatis.

Germ. *Einblatt*.

Habitat in sylvis, pratis depresso, asperis, un-
brosis, frequens. v. gr. [Gryph. auf dem
Gal-

*Galgenkamp nach Wackerow.] Sundiae cum
præcedenti. Jasm. in der Stubbenitz copiose.
Floret Junio, Julio.*

225 ACORUS *Calamus vulgaris.*

Germ. *Kalmuss.* Pharm. *Calamus vulgaris.*

Habitat in fossis aquosis, ubique v. gr. [Gryph.
im Stadtgraben.] Sund. an der Allée nach
Papenhagen zur Linken im Graben copiose,
item zu Pütt, im Moor hinter dem Priester-
hause copiose.

Floret Junio.

**226 JUNCUS *conglomeratus* culmo nudo stricto,
capitulo laterali.**

Germ. *Knopfkrætengras.* Schreb.

Habitat in uliginolis frequens.

**227 JUNCUS *effusus* culmo nudo stricto, pani-
cula laterali.**

Germ. *Buschkrætengras.* S.

Habitat in uliginofisi, umbrosis humidis.

**228 JUNCUS *squarrosum* culmo nudo, foliis se-
taceis, capitulis glomeratis aphyllis. †**

Germ.

Habitat in uliginosis, cæspitosis. [Gryph. zu
Helmshagen.]

**229 JUNCUS *articulatus* foliis nodoso-articula-
tis, petalis obtusis.**

Germ. *Glieder-Krætengras.*

Habitat ad ripas lacuum, inque campis aquosis
turfoisis ubique. v. gr. [Gryph. im Moor
beym Pottkrug, auf der Wiese gegen Wa-
ckerow hin.] Sund. am Knieper Teich zwi-
schen

schen der letzten Bleiche und Papenbagen copiose.

Floret Julio.

- 230 *JUNCUS bulbosus* foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis.

Germ.

Habitat in pascuis aquosis, ad vias & litora marina vulgaris, v. gr. Sund. am *Strande vor dem Knieper Thor*, item am *Barthschen Wege gegen Grünehuse über* locis inundatis copiolissimus.

Floret Junio.

- 231 *JUNCUS bufonius* culino dichotoimo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. †

Germ. *Kriechendes Krætengras.*

Habitat in inundatis.

- 232 *JUNCUS pilosus* foliis planis pilosis, corymbo ramoso.

Germ. *Haariges Krætengras.* Schreb.

Habitat in sylvis passim frequens. v. gr. [Gryphiæ zu Elmshagen.] Sund. zur Rechten des *Wege nach Voigthagen im Stubbenbroock*, item im *Abshæger und Elmenhorster Holz.*

Floret Aprili.

- 233 *JUNCUS campestris* foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque.

Germ. *Wiesen-Krætengras.*

Habitat in siccoribus graminosis, pascuis ubique.

Floret Aprili, Majo.

- 234 *BERBERIS vulgaris* pedunculis racemosis.

Germ. *Berberitschen.* Pharm. *Berberis.*

Habitat Sundiæ in litore Insulæ Dänholm, paſſim inter dumeta. Nos. Jasim. in der Bobbinschen Priester Koppel. M. VVillich. Bot. Cult.

Floret Junio, Julio.

T R I G Y N I A.

235 RUMEX crispus floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis.

Germ. Krause Grind-Wurz.

Habitat in humosis, ad agros et pagos paſſim.
Floret Junio.

236 RUMEX maritimus floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus.

Germ. Strand-Grind-Wurz.

Habitat ad litora maris Balthici paſſim.

Sund. am Strande, da der Graben von dem Andershøeffſchen See hinein fließt, copiosissimus.
item am Strande zwischen Devin und dem Devinschen Ort.

Floret Junio.

Folia undulata.

237 RUMEX acutus floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis.

Germ. Grindwurz, wilde Rhabarber.

Pharmac. Lapatnum acutum.

Habitat in umbrosis, succulentis.

[Gryph.]

[Gryph. zu Hanshagen.] Sund. im Kettenhæger Remel beym Barth'schen Wege & alibi. Copiosissimus in Jasmundia in succulentis pagi Crivitz.

Floret Junio.

238 RUMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis.

Germ. *Wasser-Grindwurz*.

Habitat ad ripas lacuum et paludum, inque fossis aquofisis, v. gr. Sund. am Knieper Teich frequentissimus.

Floret Julio.

239 RUMEX *Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.

Germ. *Wild Sauerampfer*. Pharm. *Acetosa nostras*.

Habitat in pascuis ubique frequens.

Floret Junio.

240 RUMEX *Acetosella* floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis.

Germ. *Kleiner Sauerampfer*.

Habitat in pratis siccis et arvis arenosis, locisque elatis duris, frequens.

Floret Majo, Junio.

241 TRIGLOCHIN *palustre* capsulis trilocularibus sublinearibus.

Germ. Nostrat. *Fettgras*.

Habitat in pratis humidis, pascuis udis, locisque uliginosis passim frequens. v. gr. [Gryph. auf der Wiese zwischen der Landstraße und Hokenmühlen.] Sund. auf der Papenbæger

*Wiese copiose. Nos. Jasm. in einer Wiese
zur Linken am Wege von Wostewitz nach
Dubnitz copiosissimum. M. Willich Botan.
Cultor.*

Floret Junio.

- 242 *TRIGLOCHIN maritimum capsulis sexlocularibus ovatis.*

Germ.

Habitat in pratis maritimis vulgaris, v. g. Sund.
auf der Wiese neben dem Graben von Hof-
Parow nach dem Strande, item am Strande
zwischen der Reiserbahn und dem Retren-
chement. Rarius in pratis non salsis cum
praecedente.

Floret Junio.

POLYGYNIA.

- 243 *ALISMA Plantago aquatica foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis.*

Germ. Wasserwegerich, Froschläffelkraut.

Habitat in fossis aquosis, ad ripas fluviorum,
lacuum, et paludum, vulgatissima.

Floret Junio.

- 244 *ALISMA Ranunculoides foliis linear-lanceolatis, fructibus globolo-squarrofis. †*

Germ.

Habitat in aquosis rarior. [Gryph. in sylva
zu Helmshagen locis minus umbrosis.]



CLASSIS

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

245 TRIENTALIS *Europæa* foliis lanceolatis integrermis.

Germ.

Habitat in sylvis & juniperetis. [Gryphiæ frequens.] Sund. *Im Moor zur Rechten zwischen Neegass und Seemühl, an buschigten Stellen rarissima.* In Ruggia prope Bergen in nemore Radgas dicto, & Jas mundiæ sylva Stubbeniz dicta copiosa.

Floret Junio.



CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

246 EPILOBIUM *angustifolium* foliis sparsis linearie-lanceolatis, floribus inæqualibus.

Germ. *Weiderich-Rösslein*.

Habitat ad litora lapidosa inundata Maris Baltici, varior apud nos planta.

Jasm. *Am Strande der Stubbeniz*. v. gr. *Bey Tripp-Ort*. Rug. *Bey Pert und dem Granitzer Ort*.

Floret Julio.

247 EPILOBIUM *birsutum* foliis oppositis lanceolatis ferratis decurrenti-amplexicaulibus.

Germ. *Wasser-Violen*.

Habitat in humidiculis, ad fossas, paludes, inque repretis. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp*.] Sund. *in der Voigthaeger Priester Trift*. item, *im Busche vor Neegass & alibi frequens*.

Floret Julio.

Datur varietas foliis glabris semiamplexicaulibus lanceolatis denticulatis, caule mollissimo, *media inter hoc & seqvens*.

248 EPILOBIUM *montanum* foliis oppositis ovatis dentatis.

Germ.

Habitat in humidis, ad scaturigines, locis umbrosis,

brosis, passim. v. gr. Sund. *Vorne in der Voigthaeger Priester Trift zur Rechten am Graben & alibi.*

Floret Julio.

249 *EPILOBIUM palustre* foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto.

Germ.

Habitat in humidiusculis, paludosis, passim. v. gr. Sund. *Im Busch vor Neegass.*

Floret Julio.

250 *VACCINIUM Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato.

Germ. *Heidelbeeren.* Nostr. *Bixbeeren.* Pharn. *Myrtillus.*

Habitat in sylvis umbrosis] frequens. v. gr. [Gryph. *Im Kirchenholz zu Hanshagen copiose.*] Sund. *In der Andershaeffschen Koppel nicht weit vom Graben, der diese von der Voigthaeger Priester Koppel scheidet, nahe beym Teich.* item, *im Abshaeger Holz copiose.* item, *auf den Devinschen Ort copiose.*

Floret Majo.

251 *VACCINIUM uliginosum* pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis.

Germ. Nostr. *Puttgaden, Bullgrafen.*

Habitat in uliginosis turfosis.

[Gryph. *Im Moor hinter dem Pottkrug.*] Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges von Neegass nach Seemühlen.* item, *im Moor am Ende der*

der Trift, die linker Hand des Weges von dem Hofe Parow nach Bauer-Parow abgeht.

[Maturescit Julio.] Florentem non vidi.

- 252 VACCINIUM Oxycoccus** foliis integerrimis revolutis ovatis, caulis repentibus, filiformibus nudis.

Germ. *Moosbeerens, Sumpfbeerens.* Nostr. *Rug. Kramsbeerens.*

Habitat in paludibus, in Sphagno, cum Drosēris frequens. v. gr. [Gryph. zu *Ludwigsburg in der Moor-Koppel.*] Sund. im *Voigtbæger Priester-Moor*, item *im Moor vor Pütt zur Linken*, item *im Moor zur Rechten zwischen Neegass und Seemühlens.*

Floret Junio, Julio.

- 253 ERICA vulgaris** antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat in sylvestribus campestribusve sterilissimis, vulgatissima.

Floribus albis & purpureis variat.

Floret Augusto.

- 254 ERICA Tetralix** antheris bicornibus inclusis, corollis subglobosis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat cum præcedenti, sed rarior.

Sund. *Im Moor zur Rechten des VVeges von Neegass nach Seemühlens locis cæspitosis copiose.* Pom. *In der Cummerowschen Heide.*

Copiosissima in isthmi Jälinundiam cum
Rugia

Rugia connectentis, *schmale Heide* dicti,
collibus sterilissimis.

Floret Augusto.

T R I G Y N I A.

255 POLYGONUM *amphibium* floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus.

A) *terrestre* staminibus corolla longioribus.

Habitat in pratis argillosis, juxta vias & agros frequens. v. gr. Sund. *vor Klein Kordshagen*.

B) *palustre* staminibus corolla brevioribus.

Habitat in fossis aquofisis, lacubus, fluitans vulgaris. v. gr. Sund. *Im Knieper Teich*. item, *Im Andershaeffchen See*, copiosissimum.

Floret Julio.

256 POLYGONUM *Hydropiper* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis.

Germ. *V Wasserpeffer, Bitterling*. Pharm. *Persicaria*.

Habitat in subhumidis frequens. v. gr. Sund. *vor Neegass*. item, *am VVege von Kettenhagen nach der Mühle*.

Floret Julio.

257 POLYGONUM *Persicaria* floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.

Germ. *Pfersingkraut, Flæhkraut*.

Habitat cum variationibus in cultis, ruderatis, ad fossas, frequens. v. gr. Sund. *vor dem*

*Knieper Thor am VVege nach dem Kirchhofe
zur Linken am Graben. etc.*

Floret Junio, Julio.

258 POLYGONUM *aviculare* floribus octandris
trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule
procumbente herbaceo.

Germ. *VVegetritt, VVegegras.* Pharm. *Cen-
tumnodia.*

Habitat in limosis, agris, viis, litoribus ubique
vulgatissimum.

Floret Junio.

259 POLYGONUM *Convolvulus* foliis cordatis, cau-
le volubili, floribus planiusculis.

Germ. *Vogelzunge, VVildheidenkorn.*

Habitat in agris, hortis, cultis, dumetis passim
copiose. v. gr. Sund. *Auf dem Hünenberg
zwischen Gustow und Proseniz* copiose. item,
*zu Niederhoff an den Ellern in der Allee, die
beym Hause vorbey nach dem Strande geht*
copiosissime.

Floret Julio, Augusto.

T E T R A G Y N I A.

260 PARIS *quadrifolia.*

Germ. *Einbeer, VVolfsbeer.*

Habitat in nemoribus, sylvis, locis umbrosis,
succulentis. v. gr. [Gryph. *Im Hohenmühler
Holz*] Sund. *Im Lüdershäger Ellerholz* pas-
sim. item, *Im Abshäger Holz im Heller*
copiosissima.

Floret Majo.

261 ADOXA Moschatellina.

Germ.

Habitat in nemoribus umbrosis frequens. v. gr.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp inter arbusta.*]Sund. *Am hohen Graben. Copiosissima zur Rechten des VVeges nach Voigthagen in nemore Stubbenbrook dicto.*

Floret Aprili,



CLASSIS IX.


ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

262 BUTOMUS umbellatus.

Germ. *Blumenbinsen.*Habitat in fossis aquosis, ad ripas lacuum & piscinarum, ubique. v. gr. Sund. *am Knieper Teich, & in fossis zwischen dem Knieper Glacis und der Salpeteriederey &c.**Floribus purpureis albisque variat.*

Floret Junio, Julio.



CLASSIS



CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

263 MONOTROPA *Hypopithys* floribus laterali-
bus octandris; terminali decandro.

Germ.

Habitat in sylvis umbrosis, præsertim acifoliis
Parasitica radicum, rarissima apud nos plan-
ta. [Gryph. im Kirchenholz zu Hanshagen.]
Rug. im Boldevitzer Holz. Sund. non vifa.
Floret Julio.

264 LEDUM palustre.

Germ. Pors, Post. Pharm. *Rosmarinus sylve-*
stris.

Habitat in paludibus uliginosis nemorosis, syl-
vaticisque passim.

[Gryph. im Helmshäger Torfmoor.] Sund. im
Moor zur Rechten des VVege zwischen
Neegass und Seemühlen, ohngefähr 300
Schritte vom VVege copiose. Rug. inter
Tribberaz & sylvam Graniz dictam, unter
den Ahlbek'schen Tannen.

Floret initio Julii.

265 ANDROMEDA *Polifolia* pedunculis aggrega-
tis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis
revolutis.

Germ.

Habitat in uliginosis, turfosis frequens. v. gr.
[Gryph.

[Gryph. zu Ludwigsburg in der Moor-Koppel.] Sund. im Voigthaer Priester-Moor, item im Moor vor Pütt, zur Linken copiose.

Floret Junio.

266 ARBUTUS *Uva urſi* caulis procumbentibus, foliis integerrimis.

Germ. Bärentraube. Noſtrat. Bewell. Pharm. *Uva urſi*.

Habitat in collibus fabulosis aridis apricis elatis Rugiæ. v. gr. In collibus prope Tribberaz, copiose, item auf den Ralſewykschen Dünēn bey Ahlbek. Copiosissima auf der schmalen Heide zwischen Rügen und Jasmund, zwischen beyden Heidekrügen und der offnenbaren See.

Gryph. im Grubenhaer Holz, ubi semel copiosa lecta a Rev. P. Wilke.

Floret Majo, Junio.

267 PYROLA *rotundifolia* staminibus ascendentibus, pistillo declinato.

Germ. Wald-Mangolt. Pharm. *Pyrola*.

Habitat in umbrosis, sylvis, paſſim frequens.

[Gryph. im Eldenaer, Hanshaer Holz.] Sund. im Tannenholze, zur Rechten des Weges zwischen Arendſee und Benkenhagen, item im Abshäger Holz. Frequentissima in litoribus Jasmundiæ inter Sasseniz & Criviz pagos.

Floret Junio, Julio.

268 PYROLA *secunda* racemo unilaterali.

Germ.

Habitat in sylvis cum præcedente licet rarior. [Gryph.

- [Gryph. im Hanshæger Kirchenholze.] Sund.
im Abshæger Holze. Nos. Pom. im Tribseer
Stadtholze copiose. M. Willicb Bot. Cult.
Floret Julio.

D I G Y N I A.

269 *CHRYSPLENIUM alternifolium* foliis al-
ternis.

- Germ. *Gildenmilzkraut.*
Habitat ad scaturigines in umbrofis frequens.
v. gr. [Gryph. im Helmshæger Holz beym
Moor copiose.] Sund. an den kleinen Pfülen
in der Andershæffschen Koppel, item in der
Voigthæger Priester-Trift, zur Rechten am
Graben & alibi.

Floret Majo, Junio.

270 *SAXIFRAGA granulata* foliis caulinis reni-
formibus lobatis, caule ramoso, radice gra-
nulata.

Germ. *Weisser Steinbrech.* Pharm. *Saxifraga*
alba.

Habitat in apricis.

[Gryph. auf dem Galgenkamp.] Sund. auf dem
Ufer vor Devin. Poin. in litore promonto-
rii Barhæft.

Floret Majo.

271 *SAXIFRAGA tridactylites* foliis caulinis cu-
neiformibus trifidis alternis, caule erecto
ramoso. †

Germ.

[Habi]

Habitat in arvis. [Gryph. zu Ludwigsburg.]
Floret Majo.

272 SCLERANTHUS *annuus* calycibus fructus
patulis.

Germ.

Habitat in arvis, campestribus arenosis ubique
v. gr. Sund. in agris zwischen Seemühlen und
der Windmühle, item in agris hinter Bauer-
Parow copiose.

Floret Junio.

273 SCLERANTHUS *perennis* calycibus fructus
clausis.

Germ. Johanniskraut.

Habitat in campis apricis arenosis rario.

Floret Junio.

274 SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis,
foliis ovato-lanceolatis.

Germ. Seifenkraut. Pharn. Saponaria.

Habitat Sundiae hinter dem Kruge zu Voigtha-
gen an dem Zaune copiosissima, item am
Ende des Knieper Kirchhofes, wo der schma-
le Weg von dem Parowschen Wege nach der
Vogelstange vorbey geht copiose. Forsan
olim ex hortis aufuga, quod flores semi-
pleni testantur, nunc per plures annos spon-
tanea.

Floret Augusto.

275 DIANTHUS *Armeria* floribus aggregatis fa-
sciculatis : squamis calycinis lanceolatis villo-
sis tubum æquantibus.

Germ.

Habitat Pom. auf der alten Burg vor Barth
frequens. Alibi non visus.

Floret Julio.

276 DIANTHUS prolifer floribus aggregatis ca-
pitatis: squamis calycinis ovatis obtusis mu-
ticis tubum superantibus.

Germ.

Habitat in sterilibus arenosis rario-

[Gryph. zu Hanshagen.] Sund. am Altfehr-
schen Valle gegen Süden, item auf dem De-
vinschen Ort, und am hohen Ufer des Devin-
schen oder Nonnensees, an der Seite nach
Devin.

Floret Julio, Augusto.

277 DIANTHUS deltoides floribus solitariis: squa-
mis calycinis lanceolatis binis, corollis cre-
natis.

Germ. Heide-Nelken.

Habitat in pratis duris & pascuis sterilibus pas-
sim v. gr. [Gryph. hinter Hohenmühlen.]
Item ad viam publicam inter Gryphiam &
Colvald. Sund. in der Heide zwischen Zar-
rendorf und dem Elmenhorster Holze, zur
Linken des VVege. Jasm. am VVege von
der Fehr nach Sagard, nahe vor der Fehr
zur Rechten copiose. Nos. Pom. auf den
Bergen an der Trebel, zur Rechten des Trib-
seeschen Passes. M. VVillich.

Floret Junio, Julio.

278 DIANTHUS plumarius floribus solitariis:
squamis calycinis subovatis brevissimis, co-
rollis multifidis fauce pubescentibus.

Germ.

Germ. Feder-Nelke.

Habitat Sundiae beym VVege der vor Brandsbagen zur Linken nach Niederhoff abgehet, nahe vnr Niederhoff zur Rechten, auf der sumfigten VViese copiose. Alibi non visus. Floret Septembri.

Observ. Caulis erectus pedalis simplex uniflorus, vel 2 seu 3 pedalis paniculatus. Folia viridia glauca. Calycum squamæ obtusæ, acuminatae; Tubus purpurascens, praesertim prope limbum. Corollæ Petala ad medium multifida, laciniis profundis angustis, incarnata, basi Maculâ luteo-lividâ, pilis brevibus saturate purpureis adspersâ, notata.

TRIGYNIA.

279 CUCUBALUS Behen calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis.

Germ.

Habitat in pratis siccis.

[Gryph. am VVege nach Kœtenhagen, unter den Büschen.] Sund. am Barthischen VVege bey der Vogelsangschén Brücke am Graben copiose, item auf dem Altfehrschen VValle, frequens.

Floret Julio.

280 SILENE mutans petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, panicula nutante.

Germ.

Habitat in montosis umbrosis siccis Rugiæ;

præfertim Jasmundiæ. v. gr. Rugiæ in der Prora. Nos. item am VVege von Ralsewyk nach Pazig, zur Linken an dem Ufer des hohlen VVeges, nahe vor Ralsewyk. M. VVillich, Botan. Cultor. Jasim. in litoribus sylvæ Stubbeniz frequens. v. gr. beym Hengst, item am Fusssteige beym Königstuhl. Nos.

Floret Junio.

281 *STELLARIA nemorum* foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis.

Germ. *VValdsternblume.*

Habitat in sylvis, nemoribus, locis umbrosis succulentis. v. gr. [Gryph. zu Hohenmühlen] Sund. im Haynholzschen Busch, item im Steinhæger und Elmenhorster Holz.

Floret Majo.

282 *STELLARIA Holostea* foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis.

Germ.

Habitat in nemorosis umbrosis frequens. v. g. Sund. am hohen Graben disseits der hohen Brücke zur Linken copiosa. Copiosissima im Haynholzschen Busch.

Floret Majo & serius.

Differt a sequente, caule firmiori, foliis latioribus acutioribus, margine serraturis minutissimis notatis, floribus duplo fere majoribus.

283 *STELLARIA graminea* foliis linearibus integrerrimis, floribus paniculatis.

Germ. *Sternblume.*

Habitat

Habitat in siccis, juniperetis.

Floret Majo.

284 ARENARIA peploides foliis ovatis acutis car-nosis.

Germ.

Habitat ad litora marina arenosa frequens.

[Gryph. *Bey Wampen in dem Seedank*] Sund.
am Strande nach Parow, und am Strande
bey dem Parotschen Haaken copiose. Rug.
am Ende der Graniz nach Pert zu copiosa.

Floret Julio.

285 ARENARIA trinervia foliis ovatis acutis pe-tiolatis nervosis.

Germ.

Habitat in sylvis & umbrofis passim.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. im Hayn-holzschen Busch, item in der Voigthaeger
Priester-Koppel.

Floret Majo, Junio.

286 ARENARIA serpyllifolia foliis subovatis a-cutis sessilibus, corollis calyce brevioribus.

Germ.

Habitat in glareofis, aridis, rario

Sund. am Barth'schen Wege, vor Kleinkordsha-gen, und gegen Grünhuse.

Floret Majo.

287 ARENARIA rubra foliis filiformibus, stipu-lis membranaceis vaginantibus.

Germ. Sandblume.

A) *campestris*, Habitat in collibus, arvis, gla-reofis nudis, frequens.

B) *marina*. Habitat in litoribus arenosis marinis, falsis. v. gr. [Gryph. auf dem Rosenthal] Copiosissima bey den Gradierhäusern. Sund. bey Wampen.

Floret Junio.

PENTAGYNA.

288 *SEDUM Telephium* foliis planiusculis serratis, corynbo folioso, caule erecto.

Germ. *Fette Henne*. Pharm. *Telephium*.

Habitat in agris arenosis, & nemorosis siccissimum.

[Gryph. inter *Helmshagen und Grubenbagen*.]

Sund. am Ufer nach Devin. Pom. auf der alten Burg vor Barth copiose, & alibi. In Rugia frequentior.

Floret Julio.

289 *SEDUM acre* foliis subovatis adnato - sessiliibus gibbis erectiusculis alternis, cymatrifida.

Germ. *Mauerpfeffer*. Pharm. *Sedum minus*.

Habitat in muris, tectis, campis sterilissimis arenosis siccissimum, vulgatissimum.

Floret Junio.

290 *OXALIS Acetosella* scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamofo-articulata.

Germ. *Sauerklee*. Nostr. *Haasenkohl, Gukguks-kohl*. Pharm. *Acetosella*.

Habitat in sylvis & nemoribus umbrosis ad radices arborum, frequens. v. gr. Sund. im Haynholzschen Busch copiose.

Variatio

Variatio flore purpurascente Sundiae circum
Kordsmühl frequens, alibi rario.

Floret Aprili, Majo, Junio.

291 AGROSTEMMA *Githago hirsuta*, calycibus
corollam æquantibus, petalis integris nudis.

Germ. *Radel*.

Habitat in agris præsertim fecalinis nimia.

Floret Junio.

292 LYCHNIS *Flos Cuculi* petalis quadrifidis,
fructu subrotundo.

Germ. *Gukguksblume*.

Habitat in pratis humidiusculis ubique.

Varietas flore albo Sundiae in der Wiese am
Barthschen Wege, zur Linken vor der Vogel-
gangschen Brücke copiosa cum rubra, alibi
rario.

Floret Junio, Julio.

293 LYCHNIS *Viscaria* petalis integris.

Germ. *Pech-Nelke*.

Habitat in pratis & collibus siccis rarissima.

Sund. am Ufer des Devinischen oder Nonnensees,
an der Devinischen Seite.

Floret Majo.

294 LYCHNIS *dioica* floribus dioicis.

Germ.

A) *rubra*. Habitat in umbrosis, nemorosis,
succulentis. v. gr. [Gryph. auf dem Galgen-
kamp.] Sund. am hohen Graben.

B) *alba*. Habitat locis siccis, apricis, ubique.

v. gr. [Gryph. auf dem Wall.] Sund. auf
dem Knieper Kirchhofe & alibi.

Floret Junio.

295 CERASTIUM vulgatum foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulis diffusis.

Germ.

Habitat in pratis, areis, ruderatis, frequens.

Floret Junio.

296 CERASTIUM viscosum erectum villoso viscosum.

Germ.

Habitat in pratis macilentis. [Gryh. auf dem Wall.] Sund. in der ersten Wiese, am Wege nach Steinbagen, zur Rechten.

Floret Junio.

297 CERASTIUM femidecandrum floribus pentandris, petalis emarginatis.

Germ.

Habitat in apricis, campis sterilissimis. [Gryph. auf dem Wall.] Sundiæ semel lectum an der Steinmauer zwischen Hof-Parow und Bauer-Parow.

Floret Majo, Junio.

298 CERASTIUM arvense foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus.

Germ.

Habitat in arvis litoribusque limosis, aridis, passim.

Sund. auf dem Ufer vor Devin copiosissimum.
Floret Majo.

299 CERASTIUM aquaticum foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis.

Germ.

Habitat in nemorosis humentibus paßim.

Sund. an dem Graben in der Voigthager Prieſter-Trift copioſe, & alibi.

Floret Junio, Julio, Augusto.

300 SPERGULA arvensis foliis verticillatis, flori-
bus decandris.

Germ. Knäterich. Noſtr. Nægenknee.

Habitat in agris, præprimis arenofis, inter fe-
getes, vulgatissima.

Floret Junio.

301 SPERGULA nodosa foliis oppositis subulatis
lævibus, caulis simplicibus.

Germ.

Habitat in campis sterilibus depreſſis rarior.

[Gryphiæ versus Derschow.] Sundæ auf der
VVeide zwischen dem Franken und Tribſeer
Thor.

Floret Junio, Julio.



DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

302 LYTHRUM *Salicaria* foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.

Germ. *brauner Veiderich*.

Habitat in fossis aquofis, ad ripas lacuum & fossarum, ubique.

Floret Julio, Augusto.

DIGYNIA.

303 AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis.

Germ. *Aggermennig*, *Odermennig*. Pharmac. *Agrimonia*.

Habitat in apricis argillaceis frequens. v. gr. Sund. *am Strandc nach Devin*, item *am Devinschen Ort am Ufer* & alibi.

Floret Julio.

TRIGYNIA.

304 RESEDA *Luteola* foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis.

Germ. *tinct. VViede, VVau*.

Habitat in ruderatis rarior. Sund. *auf der Redoute vor dem Tribseer Thor, am Steinba-*

ge

ger *VVege*, item *bey Born. Pom. zu Franzburg auf dem Schloßplatz* copiose.

Floret Augusto.

305 EUPHORBIA Peplus umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerimis obovatis, petiolatis.

Germ. *UVolfsmilch*.

Habitat in cultis, oleraceis, ubique.

Floret æstate.

306 EUPHORBIA helioscopia umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis.

Germ. *UVolfsmilch, Milchkraut*.

Habitat in cultis, oleraceis, agris, cum præcedente, sed rarior.

Floret æstate.

DODECAGYNIA.

107 SEMPERVIVUM tectorum foliis ciliatis, propaginibus patentibus.

Germ. *Hauslauch*. Pharm. *Sempervivum majus*.

Habitat in tectis passim.

Floret Julio.





CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

308 PRUNUS Padus floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis.

Germ. *Vogelkirschen*. Nostrat. *Faulbaum*.

Habitat in sylvis passim.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Abschæger Holze v. gr. wenn man von des Heiderreuters Hause nach dem Heller geht, zur Lincken, & an der Wiese beym Heller copiosissime Floret Majo.*

309 PRUNUS Cerasus umbellis subsessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris.

Germ. *Kirschen*. Pharin. *Cerasa rubra*.

Habitat in sylvis, sepibus, rarissima.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Am behen Graben. Forte ex hortis aufuga:*

Floret Majo.

310 PRUNUS avium umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis subtus pubescentibus.

Germ. *Vogelkirschen*. Pharinac. *Cerasa nigra. Fructu rubro variat.*

Habitat in sylvis passim frequens. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *In der Anderhæfsschen und Voigthaeger Priester Kopp copiose.*

Floret Aprili, Majo.

311 PRUNUS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis.

Germ. Schleendorn. Pharm. *Acacia nostras.*

Habitat in sepibus, sylvis, agrorumque acervis, frequens. v. gr. [Gryph. auf dem Galgenkamp.] Sund. am hohen Graben. item, zwischen dem Lüdershæger Eichholze und Elterholze copiose & alibi.

Floret Aprili.

DIGYNIA.

312 CRATAEGUS *terminalis* foliis cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis.

Germ. Wilder Sperberbaum. Elzbeer. Rupp. Jen. Habitat in declivitate litoris Jas mundensis altissimi, am Fusteige der beym Königstuhl herunter gehet.

Floret Junio.

Folia supra glabra, sub:us leviter tomentosa, basi subcordata seu ovata, semipinnatifida; Laciniis septem, superioribus approximatis infimis duabus longioribus divaricatis, omnibus acutis, inaequaliter ferratis.

313 CRATAEGUS *Oxyacantha* foliis obtusis subtrifidis ferratis

Germ. Hagedorn.

Habitat in pratis apricis duris, sepibus, sylvis, ubique. v. gr. [Gryph. Auf dem Galgenkamp.] Sund. am hohen Graben. item, am VVege nach Andershoff beym Andershæffchen Teich & alibi.

Floret Vere.

TRI-

TRIGYNTA.

314 *SORBUS aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris.

Germ. *Sperberbaum*, *Vogelbeeren*. Nostr. *Quitschen-Baum*. Pharm. *Sorbus aucuparia*.

Habitat in sylvis passim. v. gr. Sund. In der Andershæfsschen und Voigdthæger Priester-Koppel.

Floret Junio.

Observ. *Folia saepius subtus villosa*.

PENTAGYNTA.

315 *MESPILUS Cotoneaster* inermis, foliis ovatis integerrimis. †

Germ.

Habitat in collibus apricis duris.

Floret Vere.

316 *PYRUS communis* foliis ferratis, pedunculis corymbosis.

Germ. *WWilder Birnbaum*. Nostr. *Hæltik Beeren*.

Habitat in sylvis passim. Frequens in Jasminidiæ sylva *Stubbeniz* dictâ.

Floret Majo.

317 *PYRUS Malus* foliis ferratis, umbellis sessilibus.

Germ. *Wilder Apfelbaum*. Nostr. *Hæltik Aeppel*.

Habitat in sylvis cum præcedente.

Floret Junio.

318 *SPIRAEA Filipendula* foliis pinnatis; foliolis uniformib[us] ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis.

Germ.

Gerin. *rother Steinbrech*. Pharmac. *saxifragia rubra*.

Habitat in siccis rarissima. Pom. *Auf der alten Burg vor Barth.*

Floret Junio.

319 SPIRAEA *Ulmaria* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis.

Gerin. *Geißbart*. Pharmac. *Ulmaria*.

Habitat in pratis uliginofis, umbrosis, vulgaris. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Haynholzschen Busch* & alibi, frequens.

Floret Junio, Julio.

POLYGYNIA.

320 ROSA *villoso* germinibus globosis aculeatis, pedunculis hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis.

Gerin. *wilde Rosen*.

Habitat in vepretis, sepibus, siccis, passim. v. gr. In summo litore inter *Alte-Fehr & Grahl*.

Floret Junio.

321 ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.

Gerin. *wilde Rosen, Hanbuttenstræuche*. Pharm. *Rosa sylvestris*.

Habitat in sepibus, ad margines viarum passim. v. gr. Sund. In summo litore inter *Alte-Fehr & Grahl* cum *precedente*; & alibi.

Floret Junio.

322 *Rosa spinosissima* germinibus globosis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatissimis.

Germ. nostr. *Luusbeeren.*

Habitat ad agrorum margines eorumque acer-
vos passim.

Sund. *Auf dem Devinischen Ort* frequens.

Floret Julio.

323 *RUBUS idaeus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.

Germ. *Hindbeeren, Hohlbeeren.* Pharmac. *Ru-
bus idaeus.*

Habitat in sylvis passim. v. gr. [Gryph. *Im
Busch zu Wampen beym alten Wege.*] Sund.
*Am Wege nach Elmenhorst im Elmenhorster
Holze* frequens. item, zwischen Arendsee und
Benkenhagen im Holze & alibi.

Fructu albo rario. v. gr. Sund. *An der Voigt-
hæger Priester-Trift zur Reckten jenseits
des Grabens unter den Büschen.*

Floret Junio.

324 *RUBUS cæsius* foliis ternatis subnudis: late-
ralibus bilobis, caule tereti aculeato.

Germ. nostr. *Brummelbeeren.*

Habitat in dumetis, novalibus, litoribus, freq.

Floret Majo.

325 *RUBUS fruticosus* foliis quinato-digitatis ter-
natisque, caule petiolisque aculeatis.

Germ. nostr. *Braambeeren, Krazbeer, Barendrek.*

Habitat in sylvis, sepibus, frequens. v. gr.
Sund. *In der Voigdthæger Priester-Koppel,
und in der Andershæfsschen Koppel.*

Floret Majo.

326 RUBUS *saxatilis* foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus herbaceis.

Germ.

Habitat in umbrosis lapidosis passim.

Sund. *Im Abshæger Kronholze.* In litoribus Jasmundensibus. v. gr. *Bey Stubbenkammer* frequens.

Floret Junio.

327 FRAGARIA *vesca* flagellis reptans.

Germ. *Erdbeerkraut.* Pharn. *Fragaria.*

Habitat in campis apricis, aridis, sylvestribus, sterilibus, frequens, nec non in pinetis passim copiose.

Floret Majo, Junio.

328 POTENTILLA *Anserina* foliis pinnatis ferratis, caule repente.

Germ. *Gänserich.* Pharmac. *Anserina.*

Habitat in pascuis, *viridis*; in argillosis *argentea*; ubique

Floret Junio.

329 POTENTILLA *argentea* foliis quinatis cu-neiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto.

Germ. *Weiss Fünffingerkraut.*

Habitat in ruderatis, apricis, v. gr. [Gryph. *auf dem Wall.*] Sund. *Am Haynholzschen Busch.* item, *vor der Vogelsangischen Brücke zur Linken* copiose. item, *auf dem Devinschen Ort.*

Floret Junio.

330 POTENTILLA *verna* foliis radicalibus quinatis acute ferratis retusis; caulinis ternatis, caule declinato,

Germ.

Germ. Klein Fünffingerkraut.

Habitat in paucis maritimis passim. v. gr. Sund.
Am Ende des Devinischen Orts auf der kleinen Weide copiose.

[Hujus an Variatio? Foliis radicalibus septenis, copiose crescit. Gryph. zu Ludwigsburg auf den Wiesen am Strand.]

Floret Majo.

331 *POTENTILLA reptans* foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris.

Germ. Fünffingerkraut. Pharm. *Pentaphyllum*.

Habitat in apricis, argilosis, haud infrequens. v. gr. [Gryph. auf dem Streng.] Sund. Am Barthischen Wege nahe außer dem Tribseer Damm zur Rechten copiose. item, auf der Tribseer Weide & alibi.

Floret Julio

332 *TORMENTILLA erecta* caule erectissimo, foliis sessilibus.

Germ. *Tormentillawurzel*. Pharmac. *Tormentilla*.

Habitat in paucis & sylvestribus siccis, sterilibus, ericotosis, ubique. v. gr. Sund. In der Heide zwischen dem Lüdershäger Holze. item in der Heide zwischen Seemühl, Moysahl, und dem Steinhäger Holz copiose.

Floret Junio, Julio.

333 *GEUM urbanum* floribus erectis, fructu globoso villoso: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis.

Germ. *Garaffel*, *Benedicten-Kraut*. Pharmac. *Caryophyllata*.

Habitat ad sepes, muros, in umbrosis frequens

quens. v. gr. Sund. *Im Haynholzschen Busch.*
item, *am Ufer zwischen Alte-Fehr und Grahl,*
item, an der Stadt-Mauer.

Floret Majo.

334 GEUM rivale floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis.

Germ.

Habitat in pratis subhumidis. v. gr. Sund. zwischen Papenhagen und dem Schütt zur Linken copiose.

Floret Aprili.

335 COMARUM palustre.

Germ. *Siebenfingerkraut.*

Habitat in paludibus uliginosis ubique. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Voigthaeger Priester Moor.* item, *im Moor vor Pütt zur Linken.* Copiosissimum *im Moor zur Rechten des Weges von Neegass nach Seemühlen;* & alibi.

Floret Junio.





CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

336 ACTAEA spicata raceino ovato, fructibus baccatis.

a) *nigra*, bacca nigris.

Germ. *Christoph-Wurzel*, *Schwarzwurzel*.

Habitat in sylvis, nemoribusque umbrosis.

Jasm. am *Wege von Hagen nach dem Borgsee*,
im Hagenschen Gehege copiosissima, alibi rarior. Floret Junio.

337 CHELIDONIUM majus pedunculis umbellatis.

Germ. *Schellkraut*. Pharm. *Chelidonium majus*.

Habitat in ruderatis, ad muros frequens. v. gr.
Sund. am *Wall und der Stadt-Mauer*, &c.

Floret Majo, Junio.

338 PAPAVER Argemone capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro.

Germ. *Akkermohn*.

Habitat in campis et agris, præferti in arenosis.
Floret Majo.

339 PAPAVER dubium capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis.

Germ. *Wilder Mohn*.

Habitat inter segetes et in aggeribus terrenis.
v. gr. Sund. zur *Alten-Fähr*, an der *Grabschen Seite*, an der *Redoute* copiose.

Floret Junio.

340 PAPAVER *Rhoeas* capsulis glabris globosis,
caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis
incisis.

Germ. *Klapperrosen*. Pharmac. *Rhoeas*.

Habitat in arvis, agris.

341 NYMPHAEA *lutea* foliis cordatis integerri-
mis, calyce petalis majore pentaphyllo.

Germ. *Seeblumen*. Nostr. *Geele Mümmelken*.

Habitat in lacubus et fluviis frequens. v. gr.

[Gryph. in Ricco hinter den Mühlen vor dem
Fetten Thor &c. Sund. im Knieper Teich
und im Knieper Mühlen-Graben, item im
Andershæffchen u. Voigthæger See copiose &c.

Floret Junio, Julio.

342 NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerri-
mis, calyce quadrifido.

Germ. *Wasserrosen, weisse Seeblumen*. Nostr.
witte Mümmelken. Pharmac. *Nymphaea alba*.

Habitat cum praecedente, sed rarer. v. gr.
Sund. im Andershæffchen und Voigthæger
See. Copiosissima in aquosis am Wege nach
der schmalen Heide, zur Linken gegen Bergen
über.

Floret Julio, Augusto.

343 TILIA *europea* floribus nectario destitutis.

Germ. *Linde*. Pharmac. *Tilia*.

Habitat passim in sylvis, ad pagos, et domus.

Floret Junio.

TRIGYNA.

344 DELPHINIUM *Consolida* nectariis mono-
phyllis, caule subdiviso.

Germ. *Rittersporn.* Nostr. *Adbars-Nibben.*

Pharmac. *Consolida regalis.*

Habitat in agris inter segetes paßsim copiose.

Floret Junio, et serius

345 ACONITUM Napellus foliorum laciniis linearibus superne latoribus linea exaratis. †

Germ. *Eisen-Hüthlein.* Nostr. *Miz un Huiwe.*

Habitat [Gryphiae. Grubenhägæ forte non spontanea.]

Floret Julio et Augusto.

PENTAGYNIA.

346 AQUILEGIA vulgaris nectariis incurvis.

Germ. *Ackley.* Pharmac. *Aquilegia.*

Habitat in nemoribus rarissima.

Gryph. *in der Koppel vor Wakkerow.* Sund.
zu Middelhagen im Ellerbruch beym Irrgarten

Floret Junio, Julio.

HEXAGYNIA.

347 STRATIOTES Aloides foliis ensiformibus triangulis ciliato-aculeatis.

Germ. *Wasser-Aloe.*

Habitat in lacubus et fluviis pigrioribus frequens. v. gr. Sund. *im Knieper Mühlen-Graben,* item *im Graben bey der Papenhäger Allée* copiose. *Copiosissima vor dem Triebser Thor zwischen der zweiten Zugbrücke und der Tenaille zur Linken im Franken Teich.*

Floret Julio, Augusto.

POLYGYNIA.

348 ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerimis.

Germ. *Edel Leberkraut*. Nosfr. *Blaage Oeg-schen*. Pharm. *Hepatica nobilis*.

Habitat in sylvis et nemoribus passum frequens.

v. gr. Sund. *im Prossnitzer Holz* frequens, item *im Abshæger Holz* copiose. Iasm. *in der Stubbenitz* v. gr. *beym Kœnigs-Stuhl* copiosissima.

Floret Aprili et serius.

349 ANEMONE *Pulsatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis.

Germ. *Küchenschellen*. Pharmac. *Pulsatilla*.

Habitat in campis apricis aridis sterilibus praeferunt Rupiae et Jasmundiae.

Sund. *in der Heide beym Martendorfer Krug*. Rug. *in der Ralselfykschen Heide am Wege von Bergen nach der Jasmundischen Fæbre* copiose. Nos. Iasm. *Am Wege von Sagard nach Spieker, auf dem Polchofschen Mühlen Berge* copiosissima. M. Willich.

Floret Julio.

350 ANEMONE *nemorosa* seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro.

Germ. Nosfr. *Witte Oeg-schen*. Pharmac. *Ranunculus albus*.

Habitat in sylvestribus nemorosis ubique. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp* copiose.]

Sund. *im Haynholzschen Busch*, item *in der Anderthæffschen Koppel* copiose.

Floret Aprili.

351 *ANEMONE ranunculoides* seiminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro.

Germ. Nostr. *geele Oegschen*.

Habitat in pratis nemorosis passim.

[Gryph. *neben dem Holz bey Hohenmühlten et alibi.*] Sund. *im Lüdershæger Ellerholz* frequens. item *am Mühlen Graben zu Corts-Mühl* copiose etc.

Floret Aprili.

352 *THALICTRUM minus* foliis sexpartitis, floribus cernuis.

Germ.

Habitat in apricis, siccis, sterilibus arenosis elatis.

Pom. *auf der alten Burg vor Barth.* Rug. *auf den Aekkern und in der Heide zwischen Bergen und der Iasmundschen Fähr* copiose.

Floret Junio.

353 *THALICTRUM flavum* caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta.

Germ. *Wiesen-Raute.*

Habitat in pratis subhumidis passim.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *in der Wiese zwischen Hof-Parow und dem Strand neben dem Graben.* Pom. *am Wege nach Loitz nahe bey Schwingen, itein bey Barth im Sattelschen Moor.* Iasm. *am Fusssteige von Sagard nach Niehoff in einer Wiese* copiosissime.

Floret Junio.

354 *RANUNCULUS Flammula* foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato.

Germ.

Germ.

Habitat in pascuis udis passum.

Floret Junio.

355 RANUNCULUS *reptans* foliis linearibus, caule repente.

Germ.

Habitat in pascuis et ericetis, locis humidis, inundatis, frequens.

Floret Junio.

356 RANUNCULUS *Lingua* foliis lanceolatis, caule erecto.

Germ.

Habitat in fossis aquosis, aquis limosis, ad ripas lacuum. v. gr. [Gryph. auf der Wiese bey Eldena et alibi.] Sund. in fossis auf den Wiesen zwischen dem Knieper Mühlen-Graben und dem Haynholzschen Busch, item am Knieper Teich.

Floret Junio, Julio.

357 RANUNCULUS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis.

Germ. Feigwarzenkraut. Pharm. *Chelidonium minus*.

Habitat in ruderatis, sylvis, et nemoribus umbrosis frequens. v. gr. Sund. an der Stadtmauer bey der Stärkels-Mühle, item in der Andershæffschen Koppel, und dem Haynholzschen Busch copiose et alibi.

Floret Aprili, Majo.

358 RANUNCULUS *Thora* foliis reniformibus subtrilobis crenatis: caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbisfloro. †

Germ. *Wolfswurz, Leopardenwurz.*

Habitat in hortis, cultis, oleraceis. Ame non lectus.

- 359 RANUNCULUS *auricomus* foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.

Germ. *Goldblumen.*

Habitat in humidiusculis præpriis sylvaticis passim frequens. v. gr. [Gryph. *Im Elmshæger Holz.* Sund. *Am Franken Retrenchenment zur Rechten des Weges rario.* *Im Absæger Holz* copiose.

Floret Majo, Junio.

- 360 RANUNCULUS *sceleratus* foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis

Germ. *Wasser-Hahnenfuss.*

Habitat in humidis, paludosis, & ad aquarum ripas frequens. v. gr. Sund. *An der Stadtmauer zwischen dem Fehr und Knieper Thor.* item, *beym Knieper Brunnen & alibi.*

Floret Majo, Junio, Julio.

- 361 RANUNCULUS *bulbosus* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis.

Germ.

Habitat in pratis & pascuis siccis ubique. v. gr. Sund. *Auf der Franken Weide.* item, *Im Haynholzschen Busch.*

Floret Majo, Junio, Julio.

- 362 RANUNCULUS *repens* calycibus patulis, pedunculis sulcatis, farmentis repentibus, foliis compositis.

Germ.

Germ. *Habnenfuss, Krähenfuss.*

Habitat in cultis, ruderatis, passim v. gr. Sund.

An der Stadtmauer hinter dem Zeughaus.

Floret cum præcedente.

- 363 RANUNCULUS *polyanthemos* calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis.

Germ. Nostr. *Butterblumen.*

Habitat in pratis & locis graminosis rario.

- 364 RANUNCULUS *acris* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multipidis: suminis linearibus.

Germ. Nostr. *Butterblumen.*

Habitat in pratis frequens.

Floret Majo, Junio.

- 365 RANUNCULUS *lanuginosus* calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirtis, foliis trifidis lobatis crenatis holofericeis.

Germ. *Seiden-Habnenfuss.*

Habitat in sylvis cæduis, umbrosis, graminosis.

[Gryph. *Im Grubenbæger, Elmshæger Holz.*]

Sund. *Am Haynholzschen Busch.* item, *am Mühlengraben zu Corts-Mühl.* item, *Im Absbæger Holz.*

Floret Majo.

- 366 RANUNCULUS *arvensis* seiminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus.

Germ. *Stachel.*

Habitat inter segetes passim frequens.

Floret Junio.

- 367 RANUNCULUS *aquatilis* foliis submersis capillaceis, eimeris subpeltatis.

Germ. *Weisser Habnenfuss, Haarkraut.*

Habitat in aquis stagnantibus, fossis aquosis,
ad ripas lacuum, ubique cum variationibus.
v. gr. Sund. *Auf der Weide vorm Franken
Thor rechter Hand & alibi.*

Floret Junio, Julio.

368 *TROLLIUS europaeus* corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum.

Germ.

Habitat in pratis, nemorosis rario.

Pom. *Bey Satel im Steinbrings-Busch* copiose.
Jasm. *Bey Sagard in der alten Gross-Volk-
fizzer Koppel.* Floret Junio.

369 *CALTHA palustris,*

Germ. *Wiesenblume. Dotterbluhme. Nostr.
Kuhblume.*

Habitat in pratis inundatis copiosissima.

Floret Aprili.



CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

370 AJUGA pyramidalis tetragono-pyramidalis.

Germ. *Güldengünsel.* Pharm. *Consolida media.*

Habitat in duris, montolis, siccis rario.

[Gryph. inter *Eldena & Diedrichshagen.*] Sun-
dix am hohen Ufer des Devinschen oder Non-
nensees, an der Devinschen Seite.

Floret Majo.

371 AJUGA reptans stolonibus reptantibus.

Germ. *Kriechender Güldengünsel.*

Habitat in nemorosis umbrolis. v. gr. [Gryph.
bey klein Zastrow am VVege, gleich wenn
man über den Bach geht.] Sund. am Strande
nach Devin unter den Büschen frequens.
item im Haynholzschen Busch copiose.

Floret Majo.

**372 TEUCRIUM Scordium foliis oblongis sessi-
libus dentato-ferratis, floribus geminis late-
ralibus pedunculatis, caule diffuso.**

Germ. *Scordien.* Pharm. *Scordium.*

Habitat in nemorosis paludosis rarius.

Sund. im Haynholzschen Busch infrequens. Nos.
Pom. in der Alten-Pleenschen Koppel. Kug.
in der Gegend um Trent bey Venz; ex re-
latione aliorum. Floret Julio, Augusto.

**373 NEPETA Cataria floribus spicatis, verticil-
lis**

lis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis
dentato-ferratis.

Germ. *Kazzenmünze*. Pharm. *Nepeta*.

Habitat in ruderatis, ad sepes passim.

[Gryph. *Unten am Bollwerk bey den Salzko-
then.*] Sund. *am Voigthæger Kirchhofe*, item
ad sepes pagi *Devin*.

Floret Julio, Augusto.

374 MENTHA aquatica spicis capitatis, foliis
ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla
longioribus.

Germ. *Wassermünze*. Nostr. *Zeesenbraan*.

Habitat ad ripas lacuum, fossarum, locisque
depressis, umbrosis, humentibus, frequens.
Floret Julio.

375 MENTHA arvensis floribus verticillatis, fo-
liis ovatis acutis ferratis, staminibus corol-
lam æquantibus.

Germ. *Ackermünze*.

Habitat in novalibus, agris post messem, in-
que pratis humidis, sat frequens.

Floret æstate.

376 GLECOMA bederacea foliis reniformibus
crenatis.

Germ. *Gundelreben*. Nostr. *Huder*. Pharm. *He-
dera terrestris*.

Habitat in umbrosis, ad sepes, inque pomariis,
ubique.

Floret Majo, Junio.

377 LAMIUM album foliis cordatis acuminatis
petiolatis, verticillis vigintifloris.

Germ. *weisse taube Nessel*. Pharn. *Lamium album*.

Habitat ad sepes, in cultis, ruderatis, ubique.
Floret Majo, Junio.

378 *LAMIUM purpureum* foliis cordatis obtusis petiolatis.

Germ. *rothe taube Nessel*.

Habitat in cultis, ruderatis, ubique.

Floret Martio, Aprili, & tota æstate.

379 *LAMIUM amplexicaule* foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis.

Germ.

A) *minus*.

B) *majus*.

Habitat A) in cultis, agris passim. B) in horitorum locis stercoratis rarius.

Floret Majo, Junio.

380 *GALEOPSIS Ladanum* internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis.

Germ. *blaue taube Nessel*.

Habitat in agris fabulosis, requietis & demetiatis passim frequens. v. gr. [Gryph. gegen Elmshagen zu.] Sund. auf den Aeckern zwischen Devin und den Devinschen Ort copiose, item in agris prope Elmenhorst.

Floret Majo, Junio, Julio, Augusto.

381 *GALEOPSIS Tetrahit* internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis suminis subcontiguis.

Germ. *bunte taube Nessel*.

Habitat inter segetes & olera vulgaris.

Colore variat.

Floret Majo, Junio.

- 382 *GALEOPSIS Galeobdolon* verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo.

Germ. *gelbe taube Nessel, Goldnessel.*

Habitat in nemoribus umbrosis, sylvisque cæduis, frequens. v. gr. [Gryph. im Holz zu Hohenmühlten.] Sund. *in der Andershæffchen Koppel*, item *im Haynholzschen Busch* cop.

Floret Majo.

- 383 *BETONICA officinalis* spica interrupta, collarium lacinia labii intermedia emarginata.

Germ. *Betonic.* Pharm. *Betonica.*

Habitat in pratis, & sylvis locis humidiusculis graminosis rarer.

Pom. *bey Barth auf der Mastwiese*, item *am Wege nach Loiz*, *gegen Wüst Eldenow*, *im Fritten Holz.* Alibi non visa.

Floret Julio.

- 384 *STACHYS sylvatica* verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis.

Germ. *taube Heckennessel.*

Habitat in umbrosis, nemorosis frequens. v. gr. Sund. *zwischen dem Küter und Tribseer Thor*, *hinter die Hecken*, item *im Grünhuf-schen Busch & alibi.*

Floret Junio.

- 385 *STACHYS palustris* verticillis sexfloris, foliis linear-lanceolatis semi-amplexicaulibus.

Germ.

Habitat in agris & pratis humidiusculis, nec non

non ad ripas, inque nemoribus paludosis
frequens.

Floret Julio.

386 *BALLOTA nigra* foliis cordatis indivisis ser-
ratis, calycibus acuminatis.

Germ. *Schwarzer Andorn*.

Habitat in ruderatis, ad sepes suburbiorum
ubique.

Floret Julio.

387 *MARRUBIUM vulgare* dentibus calycinis fe-
taceis uncinatis.

Germ. *weißer Andorn*. Pharmac. *Marrubium
album*.

Habitat in ruderatis, ad vias & sepes suburbio-
rum paßim.

Floret Julio.

388 *LEONURUS Cardiaca* foliis caulinis lanceo-
latis trilobis.

Germ. *Herzgespann*. Phar. *Cardiaca*.

Habitat in ruderatis, & tantum ad domos &
pagos.

Floret Junio, Julio, Augusto.

389 *CLINOPODIUM vulgare* capitulis subrotun-
dis hispidis, bracteis setaceis.

Germ. *Wirbeldost*.

Habitat in umbrosis aridis, & dumetis frequ.
v. gr. [Gryph. auf dem Galgenkamp.] Sund.
im Haynholzschen Busch, item an der Land-
strasse zwischen Andershoff und Teschenba-
gen &c.

Floret Julio.

390 *ORIGANUM vulgare* spicis subrotundis pa-
niculatis

niculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.

Gerin. *Organ,* *Dosten,* *Wolgemuth.* *Pharmac.*
Origanum vulgare.

Habitat in apricis & subumbrosis sylvestribus montofisis.

[*Gryph.* In *glareosis* prope *Danneberg.*] *Pom.*
auf der alten Burg vor Barth frequens.
Rug. *am Granizzer Ort,* item *bey Pert.*
Jasm. in litoribus cretaceis inter *Sasseniz* &
Criviz, & ad rivos *Jasmundiæ* paſſim freq.
Floret Julio, Augusto.

391 **THYMUS Serpyllum** floribus capitatis, caulinibus decumbentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis.

Gerin. *Quendel,* *Feldkümmel.* *Pharmac.* *Serpyllum.*

Habitat in campis, pascuis siccis sterilibus, collibus apricis exaridis frequens. v. gr. [*Gryph.* *auf dem Galgenkamp.*] *Sund.* *auf der Franken und Tribseer Weide.*

Floret Julio.

392 **THYMUS Acinos** verticillis sexfloris, caulinibus erectis subramosis, foliis acutis ferratis.

Germ. *wild Basilien.*

Habitat in collibus, litoribusque *glareosis*, cretaceis siccis.

[*Gryph.* *bey Derschow.*] *Sund.* *am Ufer der Insul Dænholm,* *an der Seite nach dem Brige zu,* frequens, item *am Wall zu Altfehr,* *an der Süderseite rario.* *Pom.* *auf der alten Burg vor Barth* copiole. *Jasm.* In litoribus

ribus cretaceis inter *Sasseniz* & *Criviz*,
passim.

Floret Julio, Augusto.

- 393 *SCUTELLARIA galericulata* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.

Germ. *Helmkraut*.

Habitat ad ripas lacuum, & ad fossas passim.

v. gr. Sund. *am Knieper Teich bey den Bleichen*, und *am Knieper Mühlengraben*, item *am Strandte nach Devin*.

Floret Junio.

- 394 *PRUNELLA vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis.

Germ. *Brunellen*. Pharm. *Prunella*.

Habitat in pascuis & pratis sterilibus frequens.

v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund.
auf der Franken Weide & alibi.

[Variatio grandiflora, in sylvis rarer. Gryph.
bey Ehnshagen.].

Floret Junio.

ANGIOSPERMIA.

- 395 *RHINANTHUS Crista galli* corollaruin labio superiore compresso breviore.

Germ. *Hahnenkamm*. Nostrat. *Doofradel*.

Habitat in pratis, passim copiosissime.

Floret Junio.

- 396 *EUPHRASIA officinalis* foliis ovatis lineatis
argute dentatis.

Germ. *Augentrost*. Pharm. *Euphrasia*.

Habitat in pascuis aridis, ericetis, ubique. v.

H

gr.

gr. Sund. auf der Franken Weide, item
auf dem Devinschen Ort & alibi.

Floret Junio, Julio.

397 EUPHRASIA *Odontites* foliis linearibus: o-
innibus ferratis.

Germ. brauner Augentrost.

Habitat in agris, pascuisque sterilibus, passim
copiose. v. gr. [Gryph. auf dem Galgen-
kamp.] Sund. vor dem Tribseer Thor, am
Wege nach dem hohen Graben & alibi.

Floret Julio.

398 MELAMPYRUM *arvense* spicis conicis laxis:
bracteis dentato-setaceis.

Germ. schwarzer Taubrader.

Habitat inter Secale, in agris elatis arenosis
siccis, praesertim Rugiæ. v. gr. auf den Aek-
kern in der Ralselwykschen Heide zwischen
Bergen und der Jasmundischen Fehr copiose.
Agricolis valde infesta.

Floret Junio.

399 MELAMPYRUM *nemorosum* floribus secundis
lateralibus: bracteis dentatis cordato-lance-
olatis: summis coloratis sterilibus, calyci-
bus lanatis.

Germ. Nostrat. Tag und Nacht.

Habitat in pratis, nemoribus umbrosis, sylvis-
que locis succulentis, ubique, pulcherrima
planta.

Floret Junio, Julio.

400 MELAMPYRUM *pratense* floribus secundis
lateralibus: conjugationibus remotis, corol-
lis clausis.

Germ.

Germ.

Habitat in nemorosis siccis.

Sund. auf dem Devinischen Ort copiose. Rug.
in der Ralselwykschen Heide, am Wege von
Bergen nach der Jasmundischen Fehr, im
Busche copiose.

Floret Junio.

401 MELAMPYRUM *sylvaticum* floribus secun-
dis lateralibus: conjugationibus remotis,
corollis hiantibus.

Germ.

Habitat in sylvis.

402 LATHRAEA *Squamaria* caule simplicissimo;
corollis pendulis: labio inferiore trifido. †

Germ. Zahnwurz.

Habitat in sylvis umbrosissimis, [Gryph. *im*
hohen Holz bey Eldena.]]

Floret Aprili, Majo.

403 PEDICULARIS *palustris* caule ramoso, ca-
lycibus calloso-punctatis, corollis labio o-
bliquis.

Germ. Lauskraut. Pharm. *Pedicularis aquatica*.

Habitat in pratis & pascuis aquosis, locisque
paludosis, frequens. [Gryph. *bey Wakke-
row.*] Sund. vor dem Tribseer Thor, in den
Wiesen vor Garbodenhagen &c.

Floret Junio, Julio.

404 PEDICULARIS *sylvatica* caule ramoso, ca-
lycibus oblongis angulatis levibus, corollis
labio cordato.

Germ. Lauskraut.

Habitat in pratis sylvaticis, nemoribus palu-
dosis

dosis passim. [Gryph. zwischen Wampen und Ladebow.] Sund. rarior.

Floret Junio.

405 ANTIRRHINUM minus foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso.

Germ. kleiner Orant.

Habitat in maritimis glareosis & cretaceis sylvae Jasimundensis Stubbenez passim copiose. v. gr. *beym Hengst und bey der Fahrniz.* Alibi non visum.

Floret Julio.

406 ANTIRRHINUM Linaria foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis.

Germ. Leinkraut, Harnkraut. Ph. *Linaria.*

Habitat in ruderatis, litoribus, ad margines & fossas agrorum, passim. v. gr. Sund. auf dem Devinschen Ort frequens.

Floret Junio, Julio, Augusto.

407 SCROPHULARIA nodosa foliis cordatis trinervatis, caule acutangulo.

Germ. Braunwurz. Pharm. *Scrophularia.*

Habitat in umbrosis succulentis ubique. v. gr. [Gryph. hinter der Stadtmauer gegen Norden.] Sund. am Scheidegraben zwischen der Andershaeßchen und Voigthäger Priester-Koppel, item am Barth'schen Wege, zur Linke im Busch, gegen Grünebuse über & alibi.

Floret Junio, Julio.



CLASSIS XV.

TETRADYNA MIA.

SILICULOSA.

408 *MYAGRUM sativum* siliculis obovatis pendunculatis polyspermis.

Germ. *Leindotter*.

Habitat in agris inter Linum paßim.

Floret Julio, Augusto.

409 *MYAGRUM paniculatum* siliquis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis.

Germ. *Leindotter*. Nostr. *Knütgen*.

Habitat eum præcedente inter Linum & Hordeum frequens.

Floret Julio, Augusto.

410 *DRABA verna* scapis nudis, foliis lanceolatis subincisis.

Germ. *Hungerblümchen*.

Habitat in aridis pascuis, arvis, agris frequens.
v. gr. Sund. *auf der Franken Weide* copiose & alibi.

Floret Aprili, Majo.

411 *LEPIDIUM ruderale* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integrerrimis.

Germ. *Stink-Kresse*.

Habitat in ruderatis & ad vias publicas haud infrequens. v. gr. [Gryph. *vor dem Fleischer Thor.*]
H 3

- Thor.] Sund. vor dem Knieper Thor bey den Zugbrücken und auf dem Materialhofe.*
- Floret Julio.
- 412 THLASPI arvense** siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris.
 Germ. *Baurensenf.* Pharm. *Thlaspi.*
 Habitat in agris frequens.
 Floret Junio, Julio.
- 413 THLASPI campestre** siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis.
 Germ. *Baurensenf.*
 Habitat in arvis, argillosis infrequens.
Planta (mea) foliis glabris; affinis præcedenti, sed major, foliaque superiora subhastata, magisque dentata.
- 414 THLASPI Bursa Pastoris** siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis.
 Germ. *Täschelkraut.* Pharm. *Bursa Pastoris.*
 Habitat in apricis, ruderatis, cultis, ad vias, ubique. v. gr. Sund. am *Retrenchement vor dem Franken Thor* copiose &c.
 Floret Vere.
- 415 COCHLEARIA officinalis** foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis.
 Germ. *Läffelkraut.* Pharm. *Cochlearia.*
 Habitat ad litora maris Balthici rarissima, leta ante 4 annos Sundiae, unten am hohen Ufer des Devinschen oder Nonnensees, an der Devinschen Seite, wo die Quellen sind.
 Floret Majo.
- 416 COCHLEARIA Armoracia** foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis.
- Germ.

Germ. *Meer-Rettich.* Pharm. *Armoracia.*
 Habitat in ruderatis & fossarum aggeribus pa-
 sim frequens. v. gr. Sund. *auf dem Knieper
 Kirchhofe und vor dem Franken Thor, bey
 der letzten Zugbrücke auf dem Walle co-
 piolissime.*

Floret Majo, Junio.

- 417 *IBERIS nudicaulis* herbacea, foliis sinuatis,
 caule nudo simplici.

Gerin.

Habitat in arenosis, sterilibus, nudis. v. gr.
 [Gryph. *auf dem Fuchsberge bey Hohenmühlen*]
 Sund. *auf der Heide zwischen Voigthagen
 und Zarrendorf.*

Floret Majo, Junio.

- 418 *ALYSSUM incanum* caule erecto, foliis lan-
 ceolatis incanis integerrimis, floribus co-
 rimbosis.

Germ.

Habitat in apricis, siccis, arenosis, rarius. Rug.
*am Wege nach Bergen, zur Linken auf dem
 Rothenkircher Berge copiose. Nos. item auf
 dem Paziger Kirchhofe, an der Seite nach
 dem Hofe. M. Willich. Jasim. am Wege von
 Lanken nach Sasseniz, hinter dem Lenzer
 Busch, zur Linken, copiose. Nos. Sundia
 non visum.* Floret Julio.

S I L I Q U O S A.

- 419 *DENTARIA bulbifera* foliis inferioribus pin-
 natis, summis simplicibus.

H 4

Germ.

Germ. *Schuppen-Wurz, Zahn-Wurz, Gelkkraut.*

Rupp. Jen.

Habitat in Jasminundiæ sylva *Stubbeniz dicta*
passim v. gr. *am Wege von Hagen nach*
Stubbenkammer, item *auf dem Ufer beym*
Koenigstuhl. Alibi non lecta.

Floret Junio.

420 **CARDAMINE pratensis** foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lan-

ceolatis.

Germ. *Wiesen-Kresse.*

Habitat in pratis & fossis aquosis frequens. v.
gr. Sund. *vor dem Knieper Thor auf den*
Bleichen und den Wiesen neben dem Mühl-
engraben.

Floret Majo, Junio.

421 **SISYMBRIUM Nasturtium aquaticum** fili-
quis declinatis, foliis pinnatis: foliolis sub-
cordatis.

Germ. *Brunnen-Kresse, Born-Kresse.* Pharm.
Nasturtium aquaticum.

Habitat ad fontes & rivulos sylvaticos passim
frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen.*]
Sund. *am Graben der aus dem Lüdershæger*
Ellerholz in den Voigthæger Teich gebet.

Floret Majo & ferius.

422 **SISYMBRIUM sylvestre** siliquis declinatis, fo-
liis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis.

Germ.

Habitat in ruderatis, aggeribus terrenis passim.
Sund. *vor dem Tribseer Thor, am Wege nach*
dem Vogelsang, zur Rechten.

Floret Julio.

- 423 SISYMBRIUM *amphibium*** siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis.
 Germ.
 Habitat in aquofis.
 Floret Junio.
- 424 SISYMBRIUM *Sophia*** petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis.
 Germ. *Sophienkraut*. Pharm. *Sophia*.
 Habitat in ruderatis frequens.
 Floret Julio.
- 425 SISYMBRIUM *Irio*** foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, siliquis erectis. †
 Habitat in cultis, ruderatis, hortis.
 Floret Junio, Julio.
- 426 ERYSIMUM *officinale*** siliquis spicæ adpresis, foliis runcinatis.
 Germ. *Wegeſenf*. Pharm. *Erysimum*.
 Habitat in ruderatis, plateis, juxta muros, frequens. v. gr. Sund. *an den Hecken zwischen dem Küter und Tribseer Thor*.
 Floret Julio.
- 427 ERYSIMUM *Barbarea*** foliis lyratis, extimo subrotundo.
 Germ. *Winter-Kresse*, *St. Barbenkraut*.
 Habitat in cultis, aliisque locis succulentis passim.
 Floret Junio, Julio.
- 428 ERYSIMUM *Alliaria*** foliis cordatis.
 Germ. *Knoblauchskraut*. Pharm. *Alliaria*.
 Habitat ad sepes passim.
 Sund. *bey Kortsmühl am Wege nach Reinkenbagen*, item *auf dem Tribseer Damm, in dem*
 H 5 Wulf-

*Wulfschen Garten, hinter dem Wagenschauer,
an dem Graben der aus dem Garten nach
der Koppel leuft copiose.*

Floret Majo, Junio.

429 *HESPERIS inodora* caule simplici erecto,
foliis subhaftatis dentatis, petalis obtusis.

Germ.

Habitat Gryphiæ in monticuli *Galgenkamp* dumetis frequens, lecta Julio 1764. Alibi non visa.

Flores in hac odorati ut in H. matronali, colore rubro & albo variant.

430 *ARABIS thaliana* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis.

Germ.

Habitat in arvis & sabulosis aridis rario v. gr. [Gryph. supra *Helmshagen.*] Sund. zwischen *Voigthagen* und *Zarrendorf.*

Floret Junio.

431 *TURRITIS glabra* foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.

Germ. *Thurmkraut, Glatt Thurmkraut.*

Habitat in siccis, apricis, v. gr. [Gryph. *Auf dem Walle*] zwischen *Steinbecker* und *Feten Thor.* item, *auf dem Galgenkamp.* Sund. *Auf dem Ufer zwischen Alte-Fehr und Grahl.* item, *am hohen Ufer des Devinschen oder Nonnensees an der Devinschen Seite.* Jas. *Auf dem Ufer zwischen Criviz und Lohm.*

Floret Junio.

432 *TURRITIS hirsuta* foliis omnibus hispidis,
caulinis amplexicaulibus.

Germ. *Rauch-Thurmkraut.*

Habitat in Jas mundiæ litoribus inter pagos
Sasseniz & Criviz. v. gr. *Auf Trip-Ort.*

Floret Julio.

Obs. Caulis *ramosus diffusus, pedalis;* Folia
caulina amplexicaulia, vix sagittata angulis
posticis obtusis, subdentata, hispida. Flores
albi. At in præcedente: Caulis *altior, bi-*
pedalis, strictus, vix ramosus: Folia *caulina*
amplexicaulia, sagittata angulis posticis acu-
tis, glabra, integerrima. Flores *lutei.* Si-
lique *strictissimæ.*

433 *BRASSICA campestris* radice cauleque tenui,
foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus.

Germ. Nostr. *Küdik.*

Habitat in agris inter segetes.

Floret Junio & serius.

434 *SINAPIS arvensis* siliquis multangulis toro-
so-turgidis, rostro longioribus.

Germ. *Acker Senf.* Nostr. *Küdik.*

Habitat in agris inter Hordeum frequens.

Floret æstate.

435 *SINAPIS nigra* siliquis glabris apice tetra-
gonis.

Gerin. *wilder Senf.* Nostr. *Küdik.* Pharm. *Sinapi.*

Habitat in agris, cultis, cum præcedente ubique.

Floret Junio, Julio.

436 *RAPHANUS Raphanistrum* siliquis teretibus
articulatis lævibus unilocularibus.

Germ. *Hederich.*

Habitat in agris inter segetes.

Floret Junio, Julio.

437 BUNIAS *Cakile siliculis ovatis lævibus anticipitibus.*

Germ.

Habitat ad litora marina arenosa. v. gr. [Gryph. Bey Wampen:] Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow* copiose.

438 CRAMBE maritima foliis cauleque glabris.

Germ. *Seekohl, Strandkohl.*

Habitat in Wittowiæ litore marino arenoso inter *Arcona & Varnkeviz* copiose, alibi non visa.

Floret Julio



CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

439. *GERANIUM cicutarium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis.

Germ. *Gemein Storchenschnabel.*

Habitat in paucis, cultis, viis, sterilibus frequens.

Floret tota æstate.

440 *GERANIUM sylvaticum* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto, petalis emarginatis.

Germ. *Wald-Storchenschnabel.*

Habitat in sylvis paßim. v. gr. [Gryph. *Bey Klein Zastrow.*] Sund. *Am Wege nach Klein-Kordshagen zur Linken, gegen Grünebuse über.* Nos. Pom. *Im Triebseer Stadt-Holze* copiose. v. gr. *Im Halse.* M. Willich. Botan. *Cultor.*

Floret Junio.

441 *GERANIUM pratense* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis, pinnato-laci-natis rugosis acutis, petalis integris.

Germ. *Wiesen-Storchenschnabel.*

Habitat in pratis umbrosis, ad margines syl-varum, rarius.

Floret Junio.

442 GERANIUM robertianum pedunculis bifloris,
calycibus pilosis decemangulatis.

Germ. *Ruprechts-Kraut.* St. *Roberts-Kraut.*

Pharm. *Geranium robertianum.*

Habitat in sylvis nemoribusque asperis, ruderatis, ad muros ubique. v. gr. [Gryph. *an der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *am hohen Graben an der hohen steinernen Brücke,* item *in der Andershæffchen und Voigthæger Priester Koppel.*

Floret Majo, Junio.

443 GERANIUM molle pedunculis bifloris foliis-
que floralibus alternis, caule ramoso erecti-
usculo, calycibus inuticis, arillis laevibus.

Germ. *weicher Storchenschnabel.*

Habitat ad pagos, plateas, in cultis.

Sund. *vor dem Franken Thor am Retrenchement.*

Floret Majo.

444 GERANIUM dissectum pedunculis bifloris,
foliis quinquepartito-trifidis, petalis emargi-
natis longitudine calycis, arillis villosis.

Germ.

Habitat in cultis, rarius.

Floret Junio.

445 GERANIUM columbinum pedunculis bifloris
folio longioribus, foliis quinquepartito-mult-
ifidis: laciniis acutis, arillis glabris, calyci-
bus aristatis.

Germ.

Habitat in argillosis rarius.

Sund. *am Ufer des Devinschen oder Nonnensees,*

an der Devinschen Seite, zwischen dem Ort und dem hohen Ufer. Alibi non visum.

Floret Julio.

- 446 GERANIUM *rotundifolium* pedunculis bifloris, petalis integris obtusissimis longitudo calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis.

Germ. *Runder Storchenschnabel.*

Habitat in cultis, aggeribus terrenis, ubique v. gr.

Sund. in vallo urbis copiose; et alibi.

Floret Junio et serius.

- 447 GERANIUM *sanguineum* pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis.

Germ.

Habitat in siccis umbrosis rarius.

Rug. *in der Granitz.* v. gr. *am Ende derselben nach Pert zu, oben auf dem Ufer* copiose.

Floret Julio.

POLYANDRIA.

- 448 MALVA *rotundifolia* caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis

Germ. *Gänse-Pappeln.* Nostr. *Kattenkees.* Pharmac. *Malva vulgaris.*

Habitat in ruderatis, viis frequens.

Floret Junio et Julio.

- 449 MALVA *sylvestris* caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis.

Germ. *Ross-Pappeln.* Nostr. *Haasenpæppel.*

Habitat

Habitat in campestribus, umbrosis, siccis, cultis, sepibus frequens.

Floret Aestate et Autumno.

450 MALVA *Alcea* caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis.

Germ. *Rosenpappeln*.

Habitat in apricis duris, dumetis passim.

[Gryph. auf dem Galgenkamp.] Sund. am Ufer des Devinschen Ortes, an der Seite nach dem Devinschen See, item am Wege nach Dammgarten hinter Pütt.

Floret Augusto.



CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

451 FUMARIA *bulbosa* caule simplici, bracteis longitudine florum.

a) cava radice cava, bracteis integris.

Germ. *Hohlwurz*. Pharm. *Aristolochia fabacea*.

Habitat in umbrosis nemorosis, v. gr. Sund.

Am hohen Graben, bey der hohen Brücke,
copiosissima.

Floret Aprili. Floribus purpureis et albis variat.

b) intermedia radice non cava, bracteis integris.

Habitat in umbrosis rārior. v. gr. [Gryph. ad fossam in sylva Eldenaensi cum Farfara.]

Floret Aprili.

Haec (*b*) a me non lecta.

452 FUMARIA *officinalis* pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso.

Germ. *Erdrauch*. Pharmac. *Fumaria*.

Habitat in cultis, agris frequens.

Floret Junio.

O C T A N D R I A.

453 POLYGALA *vulgaris* floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearī lanceolatis.

Germ. *Kreutzbilume*.

Habitat in pascuis et sylvestribus siccis frequens. Colore coeruleo, purpureo, albo, caulisve procumbentibus et erectis variat. Floret Junio.

D E C A N D R I A.

454 SPARTIUM scoparium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis.

Germ. Nostr. *Haasengeil*.

Habitat in sylvis et campis aridis apricis arenosis sterilibus, ericetis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen*.] Sund. *in der Andershæffschen Koppel*, item *auf der Heide vor Brandshagen* copiose et alibi. In Jas mundia non reperitur.

Floret Junio, Julio.

455 GENISTA tinctoria foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis.

Germ. *Färberpfeifmen*. Nostr. *Glaeser*. Pharm. *Genista*.

Habitat in campis, ericetis passim.

[Gryph. *bey Klein Zastrow*.] Sund. *in der Heide zwischen Zitterhagen und Arndsee &c.*

Floret Julio.

456 ONONIS spinosa floribus racemosis geminis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis.

Germ. *Hauheichel*. Nostr. *Wriefkruut*. Pharm. *Ononis*.

Habitat in agris, campis aridis, litoribus maritimis

timis frequens. v. gr. Sund. *vor dem Knieper Thor am Strande bey der Redoute*, item *auf der Franken Weide* et alibi.

Floret Julio et Augusto. Prima æ^ttate *mitis* est.

457 ANTHYLLIS *Vulneraria* herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato.

Germ. *Wundkraut*.

Habitat in elatis campis, collibus, litoribusque apricis siccis passim.

Pom. *auf der alten Burg vor Barth*. Rup. *auf der Paziger Heide*, item *am Ufer der Granitz zwischen dem Granizzer Ort und Pert an einem so genannten Ort gerade gegen Sellin* über copiolissima. Nos. In Jasmundia copiosissima. v. gr. *an dem Borowschen Bach*, item *am Fusssteige von Blischow nach Wostewitz*, et alibi copiosa. M. Willich. Sundiae non visa. Floret Julio.

458 OROBUS vernus foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici.

Germ. *Fasanenkraut*. Rupp. Jen.

Habitat in Jasmundiae sylva, Stubbenitz, passim frequens. v. gr. *beym Königstuhl*.

Floret Majo. Junio.

Petioli mucrone setaceo terminati, polyphylli;
Foliolis 4 ad 6, ovatis, acutis, exakte oppositis.

459 OROBUS tuberosus foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici.

Germ.

Habitat in pratis sylvaticis, loco humidiusculo.
v. gr.

Pom. Wenn man von Gross-Kordshagen nach dem Arbsbæger Holz geht, nahe vor letztem auf einer Wiese. Floret Junio.

Obs. Caulis simplicissimus, angulis duobus membranaceis actus. Petioli polyphylli, membranacei, terminati mucrone setaceo; Foliolis 4 ad sessilibus, exacte oppositis, ovali-lanceolatis, mucronatis, integerrimis. Stipulae ad basin cujusque petioli communis binae, lanceolatae, semisagittatae, integerrimae. Pedunculi biflori vel quadriflori; Floribus alternis, purpureis.

450 OROBUS niger caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis.

Germ.

Habitat in montosis umbrosis rario.

Rug. in der Prora. Iasim. bey Stubbenkammer. Floret Junio et serius.

Obs. Plantae meae Caulis ramosus; Ramis patentibus. Petioli polyphylli, mucrone setaceo terminati; Foliolis 10 ad 14, ovato-oblongis, mucronatis; plerumque alternis; exterioribus decrescentibus. Stipulae linear-lanceolatae, integerrimae. Pedunculi multiflori; Floribus circiter sex.

461 LATHYRUS pratensis pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. Germ. Wie.

Habitat in pratis, dumetis, sepibus frequens.

Floret aestate.

462 LATHYRUS sylvestris pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. Germ.

Germ.

Habitat in dumetis, sepibus rario. Semel
lectus Sund. am Wege nach Steinhagen un-
ter den Büschen. Floret Julio.

- 463** *LATHYRUS latifolius* pedunculis multiflo-
ris, ciurhis diphyllis : foliolis lanceolatis,
internodiis membranaceis.

Germ.

Habitat in dumetis, litoribus maritimis umbro-
sis præsertim Jasmundiae passim. v. gr. Gry-
phiæ in monticuli Galgenkamp dumetis. Nos.
Pom. zur Linken am Wege von Tribsees
nach Cracau, am Ende der Trift. M. Wil-
lich. Jasm. am Ufer der Stubbenitz copiose.
Rug. am Ufer der Graniz frequens. Nos.
Sund. non visus.

Floret Julio.

- 464** *VICIA dumetorum* pedunculis multifloris,
foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis
subdentatis.

Germ.

Habitat in dumetis elatis rario. Sund. am We-
ge von Gustow nach Prosseniz, zur Rechten
auf dem Hünenberge copiose. Jasm. vor Sa-
gard auf dem Dubberwört copiose, item an
den Ufern der Stubbenitz frequens.

Floret Junio, Julio.

Corolla cæruleo-purpurascentes.

- 465** *VICIA sylvatica* pedunculis multifloris, fo-
liolis ovalibus, stipulis denticulatis.

Germ.

Habitat in Jasmundiae sylva Lenzzer Busch di-

cta, frequens. v. gr. am Wege von Sasseniz
nach Crampas.

Floret Junio, Julio.

466 *VICIA Cracca* pedunculis multifloris, flori-
bus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescen-
tibus, stipulis integris.

Germ.

Habitat in pratis, agris inter segetes ubique.

Floret æstate.

467 *VICIA sativa* leguminibus sessilibus subbi-
natis erectis, foliis retusis, stipulis notatis.

Germ. *Wicken.*

Habitat inter segetes passim.

B) *nigra* foliis angustioribus sublinearibus, le-
guminibus sublitolitariis.

Habitat inter segetes frequentior, nec non in
dumetis. v. gr. Rug. am Wege von Bergen
nach Ralselwyk. Jasm. in der Scoperschen
Heide unter den Bißchen.

Florent Junio.

468 *VICIA sepium* leguminibus pedicellatis sub-
quaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis:
exterioribus decrescentibus.

Germ. *Zaunwicken.*

Habitat in nemoribus & umbrosis frequens.

Floret Junio.

469 *ERVUM tetraspermum* pedunculis subbiflo-
ris, seminibus globosis quaternis. †

Germ.

Habitat in agris & oleraceis cultis.

470 *ERVUM hirsutum* pedunculis multifloris, se-
minibus globosis binis.

Habitat

Habitat in agris inter segetes frequens.

Floret Junio, Julio, Augusto.

- 471 *ORNITHOPUS perpusillus* foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis.

Germ. *Vogelfuss.*

Habitat in campis sterilibus arenosis siccis, ericetis, haud infrequens. v. gr. [Gryph. *bey Helmshagen, am Waldgraben bey Hinrichshagen.*] Sund. zwischen Pütt und Born, disseits des Pütter Teiches, item in der Heide zwischen Wendorf und Zarrendorf, item auf den Sandhügeln und der Heide disseits des Devinschen Mühlenteiches, gegen Teschenhagen.

Floret Majo, Junio.

- 472 *HEDYSARUM Onobrychis* foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato.

Germ. *Hahnenkamm, Hahnenkopf.* Rupp. Jen. Habitat Sundiae in vallo urbis zwischen der Knieper und Johannis Bastion, copiose. Forsan olim allata, nunc per multos annos spontanea planta.

Floret æstate.

- 473 *ASTRAGALUS glycyphyllos* caulescens prostratus, legumiibus subtriquetris arcuatis; foliis ovalibus pedunculo longioribus.

Germ. *wild Süßholz.*

Habitat in collibus nemorosis, montosis, umbrosis, præsertim Jasmundia.

[Gryph. *auf dem höchsten waldigsten Hügel bey klein Zastrow.*] Sund. am Barth'schen Wege

zwischen der Vogelsang'schen Brücke und klein Kordshagen, zur Rechten am Busche, wo eine kleine Erhæbung ist copiose. Nos. Pom. am Wege von Tribsees nach Cracau zur Rechten, beynabe am Ende der Trift. M. Willich. Jasim. an dem Borowschen Bach, item in der Stubbenniz, v. gr. auf dem Borgwall und im Lenzer Busch, frequens. Nos.

Floret Junio, Iulio.

- 474 TRIFOLIUM Melilotus officinalis** leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto.

Germ. *Meliloten*, *Steinklee*. Pharm. *Melilotus*. Habitat in litoribus marinis passim.

Sund. am *Strande auf dem Franken Damm vor dem Retrenement* copiose, item *am Strande des Devinschen oder Nonnensees, nahe beym Devinschen Ort* copiose.

Floret Julio.

- 475 TRIFOLIUM hybridum** capitulis umbellariibus, leguminibus tetraspermis, caule ascendente. †

Germ.

Habitat in cultis & ad vias agrorum passim rarius.

Floret Augusto.

- 476 TRIFOLIUM repens** capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente.

Germ. *weisser Kleewer*. Pharmac. *Trifolium album*.

Habitat in pascuis ubique.

Floret Julio.

477 *TRIFOLIUM pratense* spicis subvillosois, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis.

Germ. *rother Kleewer*, *Wiesenkleee*.

Habitat in graminosis frequens.

Floret æstate.

478 *TRIFOLIUM arvense* spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus.

Germ. *Katzenkleee*, *Haasenpfætgen*. Kupp. Jen.

Habitat in arvis, arenosis frequens.

Floret æstate.

479 *TRIFOLIUM montanum* spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarginatibus, calycibus nudis, caule erecto.

Germ. *Bergkleewer*.

Habitat in pratis & collibus siccis rarius.

[Gryph. *bey klein Zastrow*, *disscits des Bachs.*]

Sund. *an der Landstraße nach Brandshagen zur Linken, jenseits des Weges, der (quer über die Landstraße) von Voigthagen nach Devin geht*. Rug. *bey Trent im Catharinenholz*. Floret Julio.

480 *TRIFOLIUM agrarium* spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto.

Germ. *Hopfenkleee*. Rupp. Jen.

Habitat in pascuis & collibus siccis sterilibus rarius.

Sund. *am Wege nach Kettenhagen und Parow, item am Wege von Gustow nach Prossenitz, zur Rechten auf dem Hünenberge* copiose.

Floret Junio.

481 *TRIFOLIUM procumbens* spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulinibus procumbentibus.

Germ. *gelber Kleewer*.

Habitat ad agrorum margines, inque campis stribus paßim.

Floret Junio, Julio.

482 *LOTUS corniculatus* capitulis depresso, caulinibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus.

Germ. *gelber Schotenklee*.

Habitat in pascuis & pratis, adque vias vulgarissimus.

Varictas major in nemoribus.

483 *MEDICAGO lupulina* spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente.

Germ. *Hopfenklee*.

Habitat in cultis, arvis, pratis, litoribus ubique.

Floret æstate.



CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

484 HYPERICUM *quadrangulum* floribus trigynis, caule quadrato herbaceo.

Germ.

Habitat in pratis, nemoribus, sylvis paßim. v. gr. [Gryph. *an der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *in der Voigthæger Priester-Trift*, item, *auf dem Devinschen Ort*, item *im Lüdershæger Ellerholz*, item *am Wege von Gustow nach Proffeniz auf dem Hünenberge* copiose. Rügen. *an der Landstraße nach Bergen bey klein Kubbekow, im Holze.*

Floret Julio, Augusto.

485 HYPERICUM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis.

Germ. *Johanniskraut.* Pharm. *Hypericum.*

Habitat in collibus, sepibus, dumetis frequens. v. gr. Sund. *beym Wege nach Brandshagen, zur Rechten auf den Hügeln & alibi.*

Floret Julio.

486 HYPERICUM *humifusum* floribus trigynis axillaribus solitariis, caulis ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris.

Germ.

Habitat in pratis humidiisculis, novalibus paßim copiose. Sund.

Sund. auf dem Drigge, in der Wiese beym Holze, an der Seite nach Wampen, item auf den Aeckern beym Lüdershaeger Ellerholz, an der Seite nach Lüdershagen zu, item auf den Elmenhorstischen Aeckern. Poin. an Wege nach Tribsees, in der Koppel gegen dem Kazzenowischen Kruge über copiose.

Floret Junio, Julio.

487 HYPERICUM montanum floribus trigynis, calycibus ferraturis glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis.

Germ.

Habitat in Jasminundensis sylvæ, Stubbeniz, litoribus montosis rarissimum.

Alibi non visum.

Floret Julio.



CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.
SEMIFLOSCULOSI.

488 TRAGOPOGON pratense calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis.

Germ. *Bocksbarth.* Pharm. *Barba Hirci.*

Habitat in pratis apricis rarius, in aggeribus terrenis paßim frequens.

[*Gryph. bey Hohenmühlen.*] Sund. auf dem Wall zwischen dem Schießwall und dem blauen Thurm copiose, item am Franken Retrenchement, item am Ende des Knieper Kirchhofes längst dem schmalen Wege, der auf dem Damm von dem Kettenhæger Wege nach dem Haynholz abgehet & alibi. Flor. Junio.

489 PICRIS Hieracioides perianthii laxis, foliis integris. †

Germ.

Habitat in agris eorumque versutis.

490 SONCHUS arvensis pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis.

Germ. *Ackerdiebstel.*

Habitat in agris argilloſis inter segetes frequ. v. gr. Sund. vor dem Knieper Damm, am Wege nach Kettenhagen.

Floret Junio.

491 SONCHUS *oleraceus* pedunculis tomentosis,
calycibus glabris.

Germ. *Haasenkohl*, *Milchdistel*.

Habitat in cultis, hortis, solo lætiori nimius.

Floret Junio & serius.

492 LACTUCA *virosa* foliis horizontalibus ca-
rina aculeatis dentatis.

Germ.

Habitat in aggeribus, Sundiæ frequens, alibi
rarior.

[Gryph. *Bey der Wallmühle.*] Sund. Auf dem
Walle beyni blauen Thurm. item, an der
Hospitaler Bastion; item, vor dem Tribseer
Thor bey der letzten Zugbrücke hinter dem
Glacis. item, vor dem Franken Thor nach
der letzten Zugbrücke auf der Brustwehr des
Walles, wo die Mauer mit Schießsächer ist,
copiosissima.

Floret Julio.

493 PRENANTHES *muralis* flosculis quinis, fo-
liis runcinatis.

Germ.

Habitat in sylvis nemoribusque umbrosis, &
ad muros, minus frequens. v. gr. [Gryph.
An der Stadtmauer gegen Norden.] Sund.
Im Elmenhorster und Abshæger Holz.

Floret Julio.

494 LEONTODON *Taraxacum* calyce inferne
reflexo, foliis runcinatis denticulatis lævibus.

Germ. *Pfaffenræhrlein*, *Dotterblume*. Nostr.
Butterblume. Pharm. *Taraxacum*.

Habi-

Habitat in vallis urbium frequentissimum, ut
in pascuis, locisque cultis & ruderatis.
Floret Vere & Æstate.

495 **LEONTODON autumnale** caule ramoso, pe-
dunculis squamosis, foliis lanceolatis den-
tatis integerrimis glabris.

Germ.

Habitat in pascuis, pratis frequens.

Floret Julio & serius.

496 **LEONTODON hispidum** calyce toto erecto,
foliis dentatis integerrimis hispidis: pilis
furcatis.

Germ.

Habitat in pratis & pascuis frequens. v. gr.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *In der Andershæffchen Koppel;* item, *auf dem Altfehrschen Glacis gegen Grahl,* & alibi.

Floret Junio, Julio, Augusto.

497 **HIERACIUM Pilosella** foliis integerrimis
ovatis subtus tomentosis, caule repente,
scapo unifloro.

Germ. *Maus-Ohr.* Pharmac. *Auricula muris.*

Habitat in pascuis aridis, ageribus ubique.

Floret Junio, Julio.

498 **HIERACTIUM Dubium** foliis integris ovato-
oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo
multifloro. †

Germ.

Habitat in aggeribus, marginibusque agrorum
rarius. [Gryph. *Bey Hohenmühlern nach Hin-*
richshagen hin.]

Floret cum praecedente.

499 HIERACIUM Auricula foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro stolonibus reptantibus.

Germ.

Habitat in pratis & paludum uliginosarum locis elevatis, siccioribus, passim.

Sund. *Im Voigthaeger Priester Moor cum Drosera.*

500 HIERACIUM murorum caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori.

Germ. *Buchkohl.* Kupp. Jen.

Habitat in sylvis.

Floret Junio, Julio.

501 HIERACIUM paludosum caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis.

Germ.

Habitat in nemoribus paludosis.

Sund. *Im Busche vor Neegass zur Linken cop.*
Floret Junio.

502 HIERACIUM sabaudum caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semi-amplexicaulibus.

Germ. *Habichtskraut.*

Habitat in umbrosis.

[Gryph. *Bey Hohenmühlen und Wampen.*] Sund.
Im Holze vor Brandshagen copiose.

Floret æstate.

503 HIERACIUM umbellatum foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis.

Germ.

Habitat in pascuis, nemoribus siccis rarius, in agris

*a gris elatis præsertim Rugiæ & Jas mundiæ
frequentius v. gr. [Gryph. Bey Klein Za-
strow.] Sund. In dem Holze zur Rechten des
Weges von Arndsee nach Benkenhagen. item,
auf den Aeckern am Wege nach Voigthagen.*

Floret Julio, Augusto.

504 *CREPIS tectorum* foliis lanceolato-runcina-
tis sessilibus lævibus: inferioribus dentatis,
caule glabro.

Germ.

Habitat in apricis, aridis frequens.

Floret æstate.

505 *HYOSERIS minima* caule diviso nudo, pe-
dunculis incrassatis.

Germ.

Habitat in agris, arvis.

[Gryph. copiose bey Klein Zastrow, rarioer in-
ter Ladebow & Wampen.] Sund. Auf den
Aeckern vor Arndsee.

Floret Julio.

506 *HYPOTCHAERIS radicata* foliis runcinatis
obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi,
pedunculis squamosis.

Germ.

Habitat in pascuis, nemorosis.

Sund. Im Holze zur Rechten des Weges von
dem Arndseeschen Krüge nach Benkenhagen
copiose; item, im Eichholze vor Brandshagen.

Floret Julio, Augusto.

Obs. In planta mea: Caulis ramosus nudus, la-
vis, sulcatus, ad exortum singuli pedunculi
squamalanceolata, Pedunculi superne incrass-

sati, squamis raris lanceolatis adspersi. Calyx ovato-oblongus, basi ventricosus, imbricatus, foliolis lanceolatis, acutis, ciliatis. Semina oblonga, desinentia in Stipitem subulatum, cui insidet Pappus simplex. Paleæ ad singula semina lanceolatae, longitudine seminum usque ad pappum. Folia hispida.

Hujus an varietas?

HYPOTCHAERIS caule ramoso, folio unico ad exortum infimi rami, pappo sessili, foliis glabris dentato-sinuatis Nobis. Habitat cum præcedente licet rarissima.

507 **LAPSANA communis** calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus rimosissimis.

Germ. *Reinkohl.*

Habitat in cultis, ruderatis, sepibus frequens.

Floret Junio.

508 **CICHORIUM Intybus** floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis.

Germ. *Wegwart, Hindlauft.* Pharm. *Cichoreum.*

Habitat ad vias, agrorum margines frequens.

v. gr. [Gryph. *Vorm Fleischberthor.*] Sund.

Am Wege nach Voigthagen.

Floret Julio, Augusto.

C A P I T A T I.

509 **ARCTIUM Lappa** foliis cordatis inermibus petiolatis.

Germ. *Klettendistel.* Pharm. *Bardana.*

Habitat in viis, cultis, ruderatis ubique.

Floret Augusto.

§10 SERRATULA *tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, flosculis conformibus.

Germ. *Schartenkraut*.

Habitat in dumetis, pratis subhumidis passim.

[Gryph. *Bey Wampen neben der Trift.*] Pom.

Bey Barth auf der Mastwiese. Rug. *Am Ufer bey Pert.* Sundia non visa.

Floret Junio, Julio, Augusto.

§11 SERRATULA *arvensis* foliis dentatis spinosis.

Germ. *Saudistel.* *Ackerdistel.*

Habitat in cultis, agriis, litoribus marinis arenosis, ubique v. gr. Sund. *Am Strande nach Devin* copiosissima, & alibi.

Floret Julio.

§12 CARDUUS *lanceolatus* foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso.

Germ. *Distel,* *grosser Distel.*

Habitat in cultis, ruderatis.

Floret Julio.

§13 CARDUUS *acanthoides* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis.

Germ. *Distel,* *Wegdistel.*

Habitat in ruderatis, aggeribus, ad pagos & sepes frequens.

Floret Julio.

§14 CARDUUS *crispus* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus inernibus.

Germ. *Distel,* *krauser Distel.*

Habitat in agris, cultis, ruderatis.

Floret Julio.

§15 *CARDUUS palustris* foliis decurrentibus dentatis: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus.

Germ. *Sumpfdistel*.

Habitat in pratis humidis, præpriinis sylvaticis frequens. v. gr. Sund. *Im Busch bey Grünebuse*. Floret Julio.

§16 *CARDUUS acaulis* acaulis, calyce glabro.

Germ. *Herbstdistel*.

Habitat in pascuis apricis frequens. v. gr.

[Gryph. zwischen Hinrichshagen und Derschow.] Sund. *Auf der Franken Weide*.

Floret Augusto.

§17 *CNICUS oleraceus* foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis subcoloratis integris convaris.

Germ. *Kohldistel*.

Habitat in pratis, nemoribusque humidis, fossis umbrosis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey Hohenmühlen*.] Sund. *Am Wege nach Klein Kordshagen zur Linken*. item, zwischen Gustow und Prosseniz. item, *Am Ufer nach Devin*. item, *auf der Wiese vor Niederhoff, bey dem Wege der vor Brandshagen nach Niederhoff abgeht*.

Floret Augusto, Septembri.

§18 *CARLINA vulgaris* caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calycibus radio albis.

Germ. *Sooddistel, gemein Eberwurz*.

Habitat

Habitat in aridis, sabulosis, montosis passim.
v. gr. Sund. Vor Pütt; item, auf den Sandbergen zwischen Devin und Teschenhagen,
disseits des Devinschen Mühlenteiches.

Floret Augusto.

519 *BIDENS tripartita* foliis trifidis, calycibus
subfoliosis, seminibus erectis.

Germ. Zmeyzahn.

Habitat in inundatis, aquosis, fossis, frequens.
v. gr. Sund. Aussenhalb des Franken Re-
trenchements im Graben. &c.

Floret Julio et Augusto.

Obs. Folia inferiora pinnatifida, media trifida,
summa sepe indivisa, omnia serrata, pagina prona hispida, ut Caulis. Involucrum
5 f. 7 phylum, patens; foliolis lanceolato-
ovatis, ciliatis. Semina quadrangula, angulis oppositis 2 obtusissimis, 2 acutissimis, omnibus retrorsum aculeatis; coronata Aristis
2, rectis, retrorsum hispidis.

520 *BIDENS cernua* foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis.

Germ.

Habitat ad fontes & fossas. v. gr. Sund. Zu
Voigthagen zwischen dem Müllerhause und
dem Teiche; item, vor Neegass zur Linken
beym Borgwallischen Teich copiose.

Floret Julio, Augusto.

Cum de differentia inter hanc & *COREOPSIS*
Bidentem incertus semper fuerim, adjun-
gam quæ in individuis a me lectis observa-
re licuit, determinant Botanici peritiores.

Planta (mea) ut plurimum radiata, magnitudine variat, solo lætiori fere tripedalis ramosissima, steriliiori pedalis vix ramosa. Caulis hispidus. Folia serrata glabra. Involucrum plerumque 5 phyllum; foliolis lanceolatis ciliatis. Calyx simplex, foliolis octo, membranaceis, coloratis. Corollæ Radii ligulatae neutrae, ut plurimum 8. Paleæ simillimæ foliolis calycinis. Semina quadrangula, angulis oppositis 2 obtusissimis, 2 acutissimis, omnibus retrorsum aculeatis; coronata Aristis 4, rectis, retrorsum hispidis.

Planta non radiata a Radiata, meo quidem iudicio, non distinguenda, nisi floribus magis cernuis. Forstian quoque Radiata etate non radiata evadit, cum simul crescant, & hancce incipiente florescentia legere nunquam contigerit, sed solummodo cum semina jam perfici inceperint.

521 EUPATORIUM cannabinum foliis digitatis.

Germ. Wasserdsten. Pharmac. Eupatorium.

Habitat ad aquas, inque fossis, nemorosis humidis frequens. v. gr. [Gryph. Bey Hohenmühlen.] Sund. Im Haynholzschen Busch. item, am Ufer nach Devin & alibi.

Floret Junio, Julio.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

522 TANACETUM vulgare foliis bipinnatis incisis ferratis.

Germ. Reinfahren. Pharmac. Tanacetum.

Habitat

Habitat in aggeribus, marginibus agrorum, pratis siccis, adque nemora, frequens. v. gr. Sund. *Gegen dem Käpfenberge über*, item *am hohen Graben*. item, *am Haynholzschen Busch* copiosissime, & alibi.

Floret Augusto, Septembri.

§23 ARTEMISIA *campestris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis.

Germ. *Feld-Wermuth*.

Habitat in campis, apricis, aridis, adque vias. v. gr. [Gryph. *Bey Hanshagen.*] Sund. *am Wege nach Voigthagen*. item, *am Ufer des Devinschen Orts* copiose.

Floret Julio, Augusto.

§24 ARTEMISIA *maritima* foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis. †

Germ. *See-Wermuth*.

Habitat ad litora maris.

§25 ARTEMISIA *Absinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso.

Germ. *Wermuth*. Pharm. *Absinthium vulgare*.

Habitat in ruderatis, aridis, & ad pagos ubique. v. gr. Sund. *Auf dem Voigthæger Kirchhofe &c.*

Floret æstate.

§26 ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis incisis: subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis: radio quinquefloro.

Germ. *Beyfuss, Stabieurz*. Pharm. *Artemisia rubra, alba*.

Habitat in cultis ruderatis ubique.

Floret Julia.

§27 *GNAPHALIUM arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule simplicissimo, corymbo composito.

Germ. *Reinblumen*. Pharmac. *Stoechas citrina*.

Habitat in litoribus, campis, arenosis siccis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Neuenkirchen und Derschow.*] Sund. am *Wege nach Steinhausen*, item *am Wege nach Parow*. Copiosissimum in litore Insulae *Dahnböhm*.

Floret Julio, Augusto.

§28 *GNAPHALIUM diaicum* sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis.

Germ. *Katzenpfötgen*. Pharmac. *Gnaphalium*.

Habitat in apricis, aridis, ericetis frequens.

Floret Majo.

§29 *GNAPHALIUM sylvaticum* caule simplicissimo, floribus sparsis.

Germ.

Habitat in sylvis nemoribusque arenosis.

[Gryph. *Bey Kätenhagen.*] Sund. *im Tannenholz bey Martendorf.* item *auf dem Devinschen Ort.* item *im Eichholze vor Brandshagen* copiose.

Floret Junio, Julio.

§30 *GNAPHALIUM uliginosum* herbaceum, caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus.

Germ. *Wegrubrkraut*.

Habitat ubi aquae hyeme stagnarunt, saepe in
ipsis viis frequens.

Floret aestate.

§31 CONYZA *squarrofa* foliis lanceolatis acutis,
caule annuo corymbofo.

Germ. Dürrlwurz.

Habitat in siccis, apricis rarissima.

Sund. Beym Papenhäger Schütt, ubi unicam
plantam legi Julio 1762, postea frustra
quaesivi.

§32 ERIGERON *acre* pedunculis alternis
unifloris.

Germ.

Habitat in apricis, siccis, arenosis frequens.

Floret Junio, Julio.

§33 TUSSILAGO *Farfara* scapo imbricato uni-
floro, foliis subcordatis angulatis denticulatis.

Germ. Huflattich. Pharmac. *Farfara*, *Tussilago*.

Habitat in argillosis, litoribus, ad fossas, pastum
copiose. v. gr. [Gryph. Bey Eldena.] Sund.

am Str. inde vom Knieper und Franken Thor,
an den leimigten Ufern, it. am hohen Graben.

Floret Martio et initio Aprili.

§34 TUSSILAGO *Petasites* thyrso ovato, floscu-
lis omnibus hermaphroditis.

Germ. Pestilenzwurz. Nostr. Laddick. Pharm.
Petasites.

Habitat in ruderatis, nec non in cultis.

Gryph. *vor dem Fleischcherthor am Stadtgraben.*

Sund. *vor dem Tribseer Thor am Barth'schen*
Wege zur Rechten copiose. item am Fran-

- ken Retrenchement, wo es an den Franken
Teich stæt copiose, et alibi. Floret Aprili.
- 535 *SENECIO vulgaris* corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis
Germ. Kreuzwurz. Nostr. *Schwulstkrunt*.
Habitat in cultis, ruderatis, plateis ubique.
Floret Vere et Aestate.
- 536 *SENECIO Jacobaea* corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule
erecto.
- Germ. *Jacobskraut*.
Habitat in pascuis, et nemorosis, nec non ad
sepes frequens. v. gr. [Gryph. auf dem Wall.]
Sund. *im Haynholzschen Busch* et alibi.
Floret Julio.
- 537 *ASTER Tripolium* foliis lanceolatis integer-
riinis carnosis glabris, ramis inaequatis, flo-
ribus corymbosif.
- Germ. *Wassersternbluhme*.
Habitat in litoribus marinis inundatis, et fossis
salsis frequens. v. gr. [Gryph. auf dem Ro-
senthal, bey der Salzhütte.] Sund. am Gra-
ben beym Franken Retrenchement, item aus-
ser dem Knieper Thor, vor der Salzsiederey,
in den Græben wo ehedem das Retrenchement
gewesen copiose.
- Floret Augusto, Septembri.
- 538 *SOLIDAGO Virgaurea* caule subflexuoso an-
gulato, racemis paniculatis erectis confertis.
Germ. *Goldruthe*. Pharmac. *Virga aurea*.
Habitat in pascuis siccis, ad sepes, muros, ag-
geres passim. v. gr. Sund. *in der Voigtha-
ger*

*ger Priester Koppel auf dem Ufer des Teiches,
item auf dem Ufer zwischen Alte-Fähr und
Grahl, item auf dem Devin'schen Ort.*

Floret Augusto.

539 INULA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis.

Germ. *Aland-Wurzel.* Pharmac. *Enula.*

Habitat in pratis depressis, ad fossas, pagos et templas rarius.

[Gryph. zu Friedrichshagen und Grubenhagen.]

Sund. zu Absagen auf dem Kirchhofe copiosissime. Nos. Jasm. in der Klein Jasmundi-schen oder Schäfereyschen Koppel, hinter der Scheune copiosissime. M. Willich.

Floret Augusto.

540 INULA *Britannica* foliis amplexicaulibus lanceolatis distinctis ferratis subtus villosis, caule ramoso villoso erecto.

Germ.

Habitat in inundatis, et nemorosis paludosis passim. v. gr. [Gryph. auf dem Galgenkamp und bey Wampen.] Sund. im sumpfigten Busche am Ende der Trift die zur Linken des Weges von Hof-Parow nach Bauer-Parow abgehet, item am Strande nach Devin copiose, item vor Neegass, wo der Borgwallische See an den Weg fliesst copiose.

Floret Julio, Augusto.

541 INULA *Pulicaria* foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis.

Germ.

Habitat

Habitat ad vias ubi aquae pluviales stagnarunt
frequens ubique.

Floret Julio.

542 *INULA salicina* foliis sessilibus lanceolatis
recurvis ferrato-scabris, floribus inferioribus
altioribus, rainis subangulatis glabris.

Germ.

Habitat Sundiae im Haynholzschen Busch rarer.

Floret Julio.

543 *CINERARIA palustris* floribus corymbosis,
foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule
villoso.

Germ.

Habitat in aquosis, palustribus frequens. v. gr.

Sund. Beym Knieper Brunnen. item, zur
Rechten des Weges von Devin nach Brands-
hagen im Moor gegen Teschenhagen über,
& alibi.

Floret æstate.

544 *ARNICA montana* foliis ovatis integris, cau-
linis geminis oppositis.

Germ. Wolwerley. Mutterwurz. Pharin. *Arnica*.

Habitat in pratis & paludibus locis elevatis
apricis, nec non in sylvis sterilibus.

[Gryph. Im Holze bey Hanshagen.] Sund zur
Rechten des Weges von Neegass nach Seemüh-
len, im Moor ohngefehr 300 Schritte vom
Wege copiose. Poin. In der Wiese beym
Arbshäger Holz, an der Seite nach Gross-
Kordshagen zu. item, Bey Barth im Satel-
schen Moor copiose.

Floret Junio, Julio.

545 *BELLIS perennis* scapo nudo.

Germ. *Gänseblümchen*, *Marienblümchen*, *Marlbühlchen*. Pharmac. *Bellis minor*.

Habitat in pascuis apricis, aliisque locis graminosis ubique.

Floret toto fere anno.

546 *CHRYSANTHEMUM Levanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis.

Germ. *Iohannis-Blume*. Rupp. jen. Pharmac. *Bellis pratensis*.

Habitat in pratis siccioribus, aggeribus, passim; nec non in agris inter segetes, sed rarius.

Floret Julio

547 *CHRYSANTHEMUM segetum* foliis amplexicaulibus: superne laciniatis; inferne dentato-serratis.

Germ. Nostr. *Wokerblume*.

Habitat inter segetes æstivas, præsertim Hordeum, nimium.

Floret Junio, Julio.

548 *MATRICARIA Parthenium* foliis compositis planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis.

Germ. *Mutterkraut*. Nostr. *Mater*. Pharmac. *Matricaria*.

Habitat in cultis, ruderatis infrequens.

Floret Majo & serius.

549 *MATRICARIA maritima* receptaculis hemisphæricis, foliis bipinnatis subcarnosis: supra convexis, subtus carinatis.

Germ.

Habitat

Habitat in litoribus maris.

Sund. *Am Strand vor dem Knieper Thor* cop.
Floret Septembri.

Nonne eadem planta recensita est nomine CHRYSANTHEMI inodori a Linn. Spec. Plant. Ed. 2.
pag. 1253? *Nam & huic calycis squamæ* in margine membranaceo fusco cinctæ *attribuantur* in Linn. It. Wgth. 148.

550 MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.

Germ. *Chamillen.* Nostr. *Kamellen.* Pharmac. *Chamomilla nostras.*

Habitat in cultis, agris fecalini frequens.

Floret Junio, Julio.

551 ANTHEMIS *arvensis* receptaculis conicis, paleis setaceis, feminibus coronato-marginatis.

Germ. Nostr. *wilde Kamellen.*

Habitat in arvis & agris requietis frequens.

Floret Junio et serius.

552 ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus nudis.

Germ. *Kroten-Till, Hundstill.* Nostr. *Hundeblumen.*

Habitat ad vias, in ruderatis, & agris ubique.

Floret æstate.

553 ANTHEMIS *tinctoria* foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymbofo.

Germ. *Ochsenauge, Rindsauge,* Rupp. Jen.

Habitat in collibus, aggeribus, litoribus argilosis, siccis passim.

Sund. *am Ufer nach Parow,* item *am Altfehr-schen*

schen Wall, an der Süderseite, und an der Redoute nach dem Grabl hin copiose. Poin. auf der alten Burg vor Barth.

Floret Julio, Augusto.

554 ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute serratis.

Germ. wilder Bertram. Pharm. *Ptarmica*.

Habitat in pratis humectis & ad sepes infrequ.

[Gryph. auf dem Galgenkamp, bey Wampen.]
Sund. im Voigthaeger Priester-Moor, item
im Moor zwischen Neegass und Seemühlen
zur Rechten.

Floret Junio, Julio, Augusto.

555 ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis, caulis fulcatis.

Germ. Schaafigarbe. Pharm. *Millefolium*.

Habitat in graminosis, pascuis, pratis frequens
v. gr. Sund. auf dem Knieper Kirchhofe & alibi.

Variat floribus purpureis sed rarius.

Floret Junio.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

556 CENTAUREA *Cyanus* calycibus ferratis : foliis linearibus integerrimis : infimis dentatis.

Germ. Kornblume. Nostr. *Trempsen*. Pharm. *Cyanus*.

Habitat in agris fecaliniis & triticeis copiosa.

Variat interdum floribus albidis, vel saturatissime purpureis.

Floret Julio.

557 **CENTAUREA Scabiosa** calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis.

Germ. *Hartkopf*. Nostr. *Hartkopf*.

Habitat in pratis sterilibus, agris & litoribus præruptis limosis frequens.

Floret Augusto.

558 **CENTAUREA Facea** calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis.

Germ. *Flockenkraut*, *Flockblume*. Rupp. Jen.

Habitat in pratis, campestribus, apricis, duris.

v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund.
auf dem Devinschen Ort & alibi.

Floret Julio, Augusto.

POLYGAMIA NECESSARIA.

559 **FILAGO germanica** panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis acutis.

Germ. *Ruhrkraut*.

Habitat in agris & campis sabulosis siccis & ad vias passim.

Sund. *vor Drewshoff & alibi*.

Floret æstate.

Obs. *In mea flores axillares & terminales.*

560 **FILAGO montana** caule erecto diviso, floribus conicis lateralibus axillaribusque.

Germ. *Berg-Ruhrkraut*.

Habitat in sabulosis, aridis.

[Gryph. *bey Ungnad.*] Sund, *bey Devln.*

Floret Augusto.

§61 *FILAGO arvensis* floribus conicis lateralibus,
caule paniculato.

Germ. *Acker-Ruhrkraut.*

Habitat in agris fabulosis haud infrequens. v.
gr. Sund. gegen Lüßow.

Floret Augusto.

MONOGAMIA

§62 *JASIONE montana.*

Germ.

Habitat in arenosis siccis, campis, collibus, &
agris frequens. v. gr. [Gryph. zwischen Helms-
hagen und Hohenmühlén.] Sund. *in der Hei-
de vor Pütt & alibi.*

Floret Junio, Julio, Augusto.

§63 *VIOLA palustris* acaulis, foliis reniformibus.

Germ. *Sumpf-Violen.*

Habitat in pratis humidis & ad paludes passim
frequens. v. gr. [Gryph. zwischen Hinrichs-
hagen und Subsow.] Sund. *auf der Weide
zwischen dem Franken und Tribseer Thor.
item zwischen dem Lüdershæger Eichholz und
dem Wege von Voigthagen nach Wendorf.*

Floret Majo.

§64 *VIOLA odorata* acaulis, foliis cordatis, sto-
lonibus reptantibus.

Germ. *Merz-Violen.* Pharm. *Viola, Violaria.*

Habitat in graminosis, aggeribus, collibus.

Sund. *am Walle copiose.*

Floret Aprili.

§65 *VIOLA canina* caule adultiore ascendente,
foliis oblongo-cordatis.

Germ. *Hunds-Violen*.

Habitat in sylvis nemoribusque umbrosis ubique. v. gr. Sundæ *in der Andershæffchen Koppel*.

Floret Aprili, Majo.

§66 *VIOLA tricolor* caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis dentatis.

Germ. *Freyfamkraut*, *Stieffmutterchen*.

A) *bicolor* floribus albis & luteis, rarer floribus albis & cœruleis.

Habitat in arvis, aggeribus siccis ubique.

Floret Aprili.

§67 *IMPATIENS noli tangere* pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus.

Germ. *Springkraut*.

Habitat in humidis spongiosis umbrosis, pasim copiose. v. gr. [Gryph. *im Graben*, am Wege wenn man von Eldena nach Kœtenhagen geht.] Sund. *im Lüdershæger Ellerholz*, item *im Ellerholz zu Mittelhagen*.

Floret Julio.



CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

- §68 ORCHIS *bifolia* bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus.

Germ.

Habitat in pascuis asperis, apricis, nec non in sylvis & nemoribus passim. v. gr. Sund. *in der Andershæffschen Koppel*, item *im Moor, disseits Pütt, zur Linken*, item *im Abshæger Holz*.

Floret Junio.

- §69 ORCHIS *Morio* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso, petalis omnibus conniventibus.

Germ. Knabenkraut.

Habitat in pratis subhumidis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen.*] Sund. *auf den Wiesen vor der Vogelsangischen Brücke, zur Rechten, item auf den Wiesen vor Garbodenhagen.*

Floret Junio.

- §70 ORCHIS *mascula* bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

Germ.

Habitat in pratis siccis subnemorosis, præser-

tim Jasmundiæ. v. gr. am Wege nach Hagen, zwischen Nipmerow und Flegen copiose.
Floret Junio, Julio.

571 ORCHIS *ustulata* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis.

Germ.

Habitat in Jasimundia in litoribus sylvæ Stubbeniz dictæ frequens. v. gr. bey Stubbenkammer.

Floret Junio.

572 ORCHIS *latifolia* bulbis subpalinatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.

Germ. breitblättriges Knabenkraut.

Habitat in pratis humidis frequens.

Variatio flore albo rarer. Sund. am Knieper Mühlengraben, nahe vor dem Vogelsangischen Busch, cuin rubra.

Floret Majo, Junio.

573 ORCHIS *maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorsalibus patulis.

Germ. geflecktes Knabenkraut.

Habitat in succulentis, umbrosis, pratis frequ. v. gr. Sund. im Voigthäger Moor, item im Holze, zur Rechten des Weges von Arndsee nach Benkenhagen. Jasm. in litoribus der Stubbeniz locis scaturiginosis ubique.

Floret Junio.

574 ORCHIS *conopsea* bulbis palmatis, nectarii cornu

cornu setaceo germinibus longiore : labio trifido ; petalis duobus patentissimis.

Germ.

Habitat in pratis, nemorosis infrequens.

[Gryph. *bey Hohenmühlen und Hinrichshagen.*] Jasim. *an den Ufern der Stubbeniz, v. gr. bey Stubbenhären.*

Floret Junio et Julio.

575 OPHRYS *Nidus avis* bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido.

Germ. *Vogelnest.*

Habitat in sylvis umbrosissimis.

[Gryph. in sylva Eldenaensi, item, inter *Kettwangen & Friedrichshagen.*] Sundiæ *im Abshäger Holz.* Jasim. *in der Stubbeniz* paſſim copioſe præſertim versus litora, v. gr. *in der Hinrichsgrund* copiosiſſime.

Floret Junio.

576 OPHRYS *ovata* bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido.

Germ. *Zweyblatt.*

Habitat in pratis sylvaticis subhumidis.

[Gryph. *bey Hohenmühlen* copioſe.] Sund. *am Barthſchen Wege, zur Linken, im Busch, gegen Grünehufe über, item im Abshäger Holz im Heller* copioſe.

Floret Junio.

577 OPHRYS *Monorchis* bulbo globoſo, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato.

Germ.

Habitat in pratis uliginosis ratiflma.

Rug. *in der Campwieſe bey Tribberaz.* Jasim.

in einer fumfigten Wiese an dem Sagard-schen Bach.

Floret Julio.

578 SERAPIAS *Helleborine bulbis fibrosis, floribus erectis bractea brevioribus.*

Germ.

Habitat in sylvis, v. gr. [Gryph. in sylva Grubenhagensi.] Sund. *im Drigger Holz*, item *im Absbæger Holz*. Jasm. in litoribus der Stubbeniz. v. gr. prope Stubbenkammer frequens.

Floret Junio, Julio.

Hujus singularis varietas; Floribus dimidio brevioribus, saturate violaceis, copiose nascitur in litoribus cretaceis der Stubbeniz, v. gr. beym Hengst, item bey der Fahrniz.

Floret Julio.

579 SERAPIAS *longifolia bulbis fibrosis, floribus erectis bractea longioribus.*

Germ.

A) palustris.

Habitat in paludibus rarior. Sund. *im Voigtbæger Moor*, item *im Moor, rechter Hand, zwischen Neegass und Seemühlen*.

B) montana.

Habitat in sylvis montofisis. Jasm. in litoribus der Stubbeniz, v. gr. *bey Stubbenkammer, neben dem Fusssteige der beym Königsthuhl herunter geht*. Kug. *in der Graniz*.

Flore purpurascente ♂ candido variat.

Florent Junio, Julio.

580 CYPRIPEDIUM *Calceolus* radicibus fibrosis,
foliis ovato-lanceolatis caulinis.

Germ. Marienschu.

Habitat in Jasimundiæ litoribus cretaceis um-
brosis der Stubbeniz. v. gr. neben dem Fuss-
steige beym Kœnigstuhl, item zwischen Stub-
benkammer und Stubberort, copiose.

Floret Junio.

POLYANDRIA.

581 CALLA *palustris* foliis cordatis, spatha pla-
na, spadice undique hermaphrodito.

Germ.

Habitat in paludibus præsertim nemorosis v.
gr. Sund. vor Neegass, linker Hand, im
Ellerbruche, und zur Rechten neben dem Borg-
wallischen Teich.

Floret Julio, Augusto.





CLASSIS XXI.

MONOECIA.

DIANDRIA.

§82 LEMNA *trisulca* foliis petiolatis lanceolatis.

Germ. Nostr. *Seekresse*.

Habitat sub aquis lente fluentibus, puris, pi-
gris passim v. gr. Sund. im Knieper Mühlen-
graben, und im Graben bey der Papenhæger
Allée.

Floret Julio.

§83 LEMNA *minor* foliis sessilibus utrinque pla-
niusculis, radicibus solitariis.

Germ. *Wasserlinsen*. Nostr. *Entenfrott*.

Habitat in aquis stagnantibus & quietis frequ.
v. gr. Sund. im Graben beym Schießwall &
alibi.

§84 LEMNA *polyrrhiza* foliis sessilibus, radicibus
confertis. †

Germ.

Habitat in paludibus, fossis.

TRIANDRIA.

§85 TYPHA *latifolia* foliis subensiformibus, spi-
ca mascula femineaque approximatis.

Germ. *Teichkolben*. Nostr. *Bullenpæsch*.

Habitat in paludibus, fossis aquosis passim.

Sund. im Graben um der Redoute beym Wege
nach

nach Haynholz, item, in paludosis des Devinschen Orts, v. gr. am Anfange derselben, nabe beym Devinschen See copiole.

Floret Julio, Augusto.

Obs. Folia superne ensiformia, inferne semicylindrica vaginantia.

§86 *TYPHA angustifolia* foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis.

Germ.

Habitat ad ripas piscinarum, paludum, & in fossis aquosis, frequens. v. gr. [Gryph. im Rickflus.] Sund. am Knieper Teich & alibi.

Floret Julio, Augusto.

§87 *SPARGANIUM erectum* foliis erectis triquetris.

Germ.

Habitat in fossis aquosis, & ad piscinas frequ. v. gr. Sund. in einer sumpfigten Wiese dicht vor dem Brandshäger Eichholze & alibi.

Floret æstate.

§88 *CAREX pulicaris* spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis. †

Germ. kleines Riedgras.

Habitat in paludibus limo repletis æstate vix exsiccandis, accessu difficilioribus. [Gryph. im Grubenhäger Torfmoor.]

§89 *CAREX arenaria* spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro.

Germ. Sand-Riedgras.

Habitat in arena præfertim mobili frequens.

v. gr. Sund. am Strande hinter Bauer-Parrow, beym Paroweschen Haken copiose, item auf den Sandbergen disseits des Devinschen Mühlensteiches. Kug. auf den Ralschwykischen Dünen bey Ahlbek, copiosissime, & alibi.

Floret Julio.

590 CAREX uliginosa spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo tereti.

Germ. Sumpf-Riedgras.

Habitat in uliginosis sylvaticis rario.

Jasm. zu Sasseniz auf der Weide zwischen der Wasserm hle und der Kalkbrennerey copiose.

Floret Julio.

591 CAREX leporina spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis.

Germ. Haasen-Riedgras.

Habitat in pratis humidioribus rario.

Sund. beym Barth'schen Wege, ehe man nach der Vogelsang'schen Brücke kœnit, zur Rechten.

Floret Majo.

592 CAREX vulpina spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis: superne masculis.

Germ. Fuchs-Riedgras.

Habitat in vepretis & juxta aquas passim. v. gr.

Sund. zwischen dem Knieper Glacis und der Salpetersiederey, an den Gräben wo vordem das Retrenchement gewesen, item beym Barth'schen Wege zur Linken gegen Grünehuse im Busch am Graben neben dem Fusssteige.

Floret Majo.

593

593 CAREX *axillaris* spiculis ovatis sessilibus remotis androgynis, bracteis culmum aequantibus.

Germ.

Habitat in udis sylvaticis rarissima.

594 CAREX *flava* spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula linearis, capsulis acutis recurvis.

Germ. gelbes Riedgras.

Habitat in paludibus infrequens.

Sund. hinter Bauer-Parow, am Ende der Trift, im Moor.

Floret Majo, Junio.

595 CAREX *filiformis* spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis, inferiore foliolo proprio breviore. †

Germ. dünnes Riedgras.

Habitat in nemoribus. [Gryphiæ bey Hohenmühlén.]

596 CAREX *limosa* spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente.

Germ. Sumpf-Riedgras.

Habitat in paludibus limosis sylvaticis. v. gr.

Sund. am Abschæger Holz beym Heller.

597 CAREX *panicea* spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusifusculis inflatis.

Germ. Hirse-Riedgras.

Habitat in udis turfosis passim.

Sund. hinter Bauer-Parow, am Ende der Trift im Moor. Jasim. in litoribus der Stubbeniz locis humentibus frequens.

Floret Junio.

598 CAREX *Pseudo-Cyperus* spicis pendulis, pedunculis geminatis.

Germ.

Habitat in fossis aquosis.

Sund. zwischen dem Knieper Glacis und der Salpetersiederey, in dem Graben wo ehemalig das Retrenchement gewesen frequens.

Floret Majo, Junio.

599 CAREX *cæspitosa* spicis erectis cylindricis tribus subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro.

Germ. Raasen-Riedgras.

Habitat in paludibus, ubi cæspites virides constituit, frequens. v. gr. Sund. zur Rechten des Weges nach Voigthagen, zwischen dem Stubbenbrook und dem Lüdershaeger Ellerholz, in einem Sumpf copiose & alibi.

Floret Aprili, Majo.

600 CAREX *acuta* spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis.

Germ. spitziges Riedgras.

A) *nigra*, minor.

Habitat in campis sterilibus, pratisque siccis. v. gr. Sund. in der Martensdorfer Heide & alibi.

Floret Aprili.

B) *ruffa*, major.

Habitat in aquosis, fossis, ad ripas rivulorum & piscinarum frequens. v. gr. Sundiae vor der Vogelsang'schen Brücke zur Rechten, zwischen die Anhöhen auf der sumpfigen Stelle im

im Graben, item am Vogelsang'schen Graben & alibi.

Floret Majo & serius.

601 CAREX *vesicaria* spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis.

Germ. *blasigtes Riedgras.*

Habitat in aquosis, ad fossas frequens. v. gr.

Sund. *Am Vogelsang'schen Graben* copiose.

Floret Majo. Junio.

602 CAREX *hirta* spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis.

Germ. *raubes Riedgras.*

Habitat in glareosis, ad aquas passim. v. gr.

Sund. *Vor dem Knieper Thor an dem Graben, wo ehedem das Retrenchement gelassen.*

Floret Majo, et serius.

T E T R A N D R I A.

603 BETULA *alba* foliis ovatis acuminatis ferratis.

Germ. Birke. Pharmac. *Betula.*

Habitat passim in sylvis. v. gr. Sund. *Im Elmenhorster und Abshæger Holz.*

In Isthmi Jasmundiam cum Rugia conjungentis *schmale Heide* dicti, collibus arenosissimis mira hujus speciei arbuscularum provenit multitudo, unde forsan aliquando non mediocris sylva oriunda, si illis ab injuria brutorum, pabulum quærentium, caveatur.

Floret Majo.

604

604 BETULA *Alnus* pedunculis ramosis.

Germ. *Aerle*, *Eller*.

Habitat iu sylvis locis humidis frequens. v. gr.

Sund. *In der Andershæffschen Koppel*, item
im Lüdershæger Ellerholz &c.

Floret Majo.

605 URTICA *urens*. foliis oppositis ovalibus.

Germ. *Eiterneßel*.

Habitat in cultis, ruderatis ubique.

Floret Majo, Junio, Julio.

606 URTICA *dioica* foliis oppositis cordatis, ra-
cemis geminis.

Germ. *Brennneßel*, *Waldneßel*. Pharmac. *Ur-
tica major*.

Habitat in ruderatis, ad sepes ubique.

Floret Junio & serius.

PENTANDRIA.

607 XANTHIUM *strumarium* caule inermi, fo-
liis cordatis trinervatis.

Germ. *Bettlerlæuse*. Pharin. *Xanthium*.

Habitat in ruderatis sterquiliniis. v. gr. Sund.

Am Strande bey der Reiserbahn.

Floret Julio.

POLYANDRIA.

608 MYRIOPHYLLUM *spicatum* floribus ma-
sculis interrupte spicatis.

Germ.

Habi-

Habitat in lacubus, fossis & aquis quietis. v. gr.
Sund. *Im Knieper Teich* copiosissime.

Floret Junio, Julio.

609 SAGITTARIA sagittifolia foliis sagittatis
acutis.

Germ. *Pfeilkraut*.

Habitat ad ripas fluviorum, lacuum, limosas
rerior.

[Gryph. Ad ripas fluvii Ricci.] Poin. Ad viam
publicam, qua itur Sundia ad urbem *Trib-*
sees, proxime ante pagum *Drechow*, a dex-
tra in lacu molendinario. Circa Sundiam
non visa.

610 QUERCUS Robur foliis deciduis oblongis
superne latioribus: sinibus acutioribus:
angulis obtusis.

Germ. *Eiche*. Pharmac. *Quercus*.

Habitat in sylvis.

Floret Majo, Junio.

611 FAGUS sylvatica foliis ovatis obsolete
ferratis.

Germ. *Buche*, *May-Buche*. Pharm. *Fagus*.

Habitat in sylvis, tylvas vastas constituens. v. g.
Sund. *Bey Abshagen*.

Floret Majo.

612 CARPINUS Betulus squamis strobilorum
planis.

Germ. *Hagebüche*.

Habitat in fagetis aliisque sylvis, nemoribus-
que locis depresso humidis.

Floret Majo.

- 613** *CORYLUS Avellana* stipulis ovatis obtusis.
 Germ. *Haselstaude*. Pharmac. *Corylus*.
 Habitat in sylvis & sepibus.
 Floret Januario, Februario, Martio.

M O N A D E L P H I A.

- 614** *PINUS sylvestris* foliis geminis: primis
 dialibus solitariis glabris.
 Germ. *Fichte*. Pharmac. *Pinus*.
 Habitat in sylvis passim locis elevatis siccis.
 Sylvas ipsa constituit in campis sterilissimis
 glareosis. v. gr. Gryph. Zu Hanshagen. Sund,
 zwischen Seemühl und Moysahl. item, bey
 Engelswacht &c.
 Floret Julio.
- 615** *PINUS Abies* foliis solitariis subulatis mu-
 cronatis lævibus bifarium versis.
 Germ. *Tanne*. Pharmac. *Abies*.
 Habitat cum præcedente infrequens.

S Y N G E N E S I A.

- 616** *BRYONIA alba* foliis palmatis utrinque cal-
 loso-scabris.
 Germ. *Zaun-Rübe, Gicht-Rübe*. Pharmac.
Bryonia.
 Habitat ad sepes suburbiorum, & pagos passim.
 Floret Julio.



D I O E C I A.

D I A N D R I A.

617 *SALIX triandra* foliis ferratis glabris, floribus triandris.

Germ. *Elbweide.*

Habitat ad pagos rarissima. Copiose plantata Sundiæ hinter die Hecken zwischen dem Küter und Tribser Thor, allata prædio Engelswacht, num ibi spontanea?

Floret Vere.

618 *SALIX pentandra* foliis ferratis glabris, flosculis pentandris.

Germ.

Habitat in humidiusculis, paludosis passim.

Sund. *Im Moor zwischen Neegass und Seemühlen zur Rechten frequens, & vor dem Tannenholz zwischen Seemühlen und Moysahl.*

Floret Julio.

Staminibus 4 ad 6 variat.

619 *SALIX vitellina* foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. †

Germ. *Zehweiden.*

Habitat ad pagos & domos, forte allata.

620 *SALIX amygdalina* foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus.

Germ. *Elbweiden.*

Habitat in nemoribus solo humidiusculo in-
frequens.

Sund. Im Vogelsangschén Busch.

621 *SALIX fragilis* foliis serratis glabris ovato-
lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis.

Germ. Sprokweide.

Habitat in sylvis rarior, ad pagos & domos
passim. Floret Majo.

622 *SALIX purpurea* foliis serratis glabris lan-
ceolatis: inferioribus oppositis. †

Germ. rothe Sprokweide.

Habitat ad pagos & fossas plantata.

623 *SALIX arenaria* foliis integris ovatis acutis:
supra subvillosois, subtus tomentosis.

Germ.

Habitat in paludosis frequens, & ad ripas
lacuum.

Sund. Am Voigthäger Teich an der Seite nach
Zitterhagen. item, zur Rechten des Weges
nach Voigthagen, zwischen dem Stubbenbrook
und dem Lüdershäger Ellerholz.

Floret Aprili.

624 *SALIX incubacea* foliis integerrimis lanceo-
latis: subtus villosois nitidis, stipulis ovatis
acutis.

Germ. Bruchweiden.

Habitat in uliginosis & ad fossas passim. v. gr.

Sund. Am Franken Retrenchements Graben.

Floret Majo,

625 *SALIX rosmarinifolia* foliis integerrimis
lanceolato-linearibus strictis sessilibus subtus
tomentosis.

Germ.

Habi-

Habitat in fossis aquosis paludum turfosarum
passim frequens.

Sund. *Im Voigthäger Priester Moor* copiose.
item, *beym Wege der vor Brandshagen zur Linken nach Niederhoff abgeht, nahe vor letzterem, zur Rechten, auf der sumpfigten Wiese.*

Floret Majo.

626 SALIX caprea foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, undatis superne denticulatis.

Germ. *Palmweide.*

Habitat in sylvis, nemoribus, siccis infrequens:

Sund. *Im Abshäger Holz.*

Floret Aprili.

627 SALIX viminalis foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis.

Germ. *Korbweiden, Aehmtsweiden.*

Habitat ad pagos, forte allata.

Floret Aprili.

628 SALIX cinerea foliis subferratis oblongo-ovatis: subtus subvillosis, stipulis dipodiato-cordatis.

Germ.

Habitat in paludosis subhumidis & ad piscinas.

v. gr. Sund. *An einem kleinen Teich in der Voigthäger Priester Koppel.*

629 SALIX alba foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis.

Germ. *Weiße Weiden, Silberweiden, Zehweiden.*

Habitat ad pagos & domos.

Floret Aprili, Majo.

Addo Salicem quæ me quidem judico

630 *SALIX polyandra* foliis serratis glabris, florulis polyandris, dicenda.

Germ.

Habitat in paludosis, turfosis.

Gryph. *Auf dem Galgenkamp*, ubi primum reperta a Rev. Dno. Past. Wilke. vid. Ej.

Floram Gryficam post Num. 520. Sund.

Im Voigthäger Moor im Haasen Winkel cop.

Floret Junio.

Obs. *Frutex humilis vix 6 pedum altitudinem excedens; Ramis purpurascens, tenacibus. Geimma univalvis, squama decidua, obovata, margine pilosa, subcolorata. Folia petiolata, alterna, ovato-lanceolata, acuminate, acute serrata, serraturis glandulosis succum luteum exsudantibus; Petiolis saepius dentato-glandulosis. Stipulae nullæ, sed earum loco glandula puncti instar prominens. Amen- ta foliacea, pedunculis calycibusque pubescen- tibus. Flores polyandri (Staminibus 8 ad 10) hinc juli flavissimi, densissimi.*

Affinis *S. pentandræ*, vix distinguenda, nisi numero staminum, gemmæ squama univalvi, petiolis saepius dentato-glandulosis.

▲ *S. fragili* differt foliis magis ovatis, serraturis glandulosis, approximatis, ramis purpurascens, tenacibus, numero staminum, & toto habitu.

T E T R A N D R I A.

631 VISCUM *album* foliis lanceolatis obtusis,
caule dichotomo, spicis axillaribus. †

Germ. *Mistel*. Pharmac. *Viscum*.

Habitat in sylvis parasitica in truncis arborum
rarius. [Gryph. In sylva Eldenaensi.]

632 HIPPOPHAE *Rhamnoides* foliis lanceolatis.

Germ. Nostr. Jasim. *Seedorn*.

Habitat in Jasmundensis sylvæ, Stubbeniz, lito-
ribus copiosissime. v. gr. zwischen Sasseniz
und dem Hengst. item, bey Stubbenkammer;
zwischen Stubben-Kammer und Stubber-Ort.
item, auf dem Ufer bey Lohm. Rug. An den
Ufern der Granitz.

Floret Majo.

P E N T A N D R I A.

633 CANNABIS *sativa*.

Germ. *Hanf*. Pharmac. *Cannabis*.

Habitat in ruderatis suburbiorum, & ad pagos,
Floret Junio.

634 HUMULUS *Lupulus*.

Germ. *Wilder Hopfen*. Pharm. *Lupulus*.

Habitat in nemoribus & sepibus passim. v. gr.
Sund. Im Haynholzschen Busch. item, bey
Wege nach Andershoff in der Helle.

Floret Augusto.

O C T A N D R I A.

635 *POPULUS alba* foliis subrotundis dentato-
angulatis subtus tomentosis.

Germ. *Weisse Pappeln.* Nostr. *Abelen.*
Habitat in sylvis & ad domus passim.
Floret Aprili

636 *POPULUS tremula* foliis subrotundis dentato-
angulatis utrinque glabris.

Germ. *Espen.* Nostr. *Faul-Eschen.*
Habitat in sylvis passim, v. gr. *In der Voigtha-
ger Priester Koppel.*

Floret Aprili.

637 *POPULUS nigra* foliis deltoidibus acuminati
ferratis.

Germ. *Schwarze Pappeln.* Pharm. *Populus.*
Habitat ad pagos, in sylvis rario. v. gr. *Sund-
In der Voigthaer Priester Koppel.*

E N N E A N D R I A.

638 *MERCURIALIS perennis* caule simplicissi-
mo, foliis scabris.

Germ.
Habitat in nemoribus, ad margines sylvarum,
locis subumbrosis, passim copiose.

[Gryph. *Bey Eldena.*] Sund. *An der Voigtha-
ger Priester Trift zur Rechten frequens.
item, zu Kortsmühl unter den Büschen am
Mühlengraben, und im Holze beym Mühlen-
Teich copiosissima.*

Floret Majo,

639 MERCURIALIS annua caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis.

Germ. *Bingelkraut*. Pharmac. *Mercurialis*.

Habitat in cultis, ruderatis, infrequens; rarissima in sylvestribus.

Floret Augusto.

640 HYDROCHARIS Morus Ranae.

Germ. *Fräsch-Biss*.

Habitat fossis limosis aquosis, & lacubus versus ripas, ubique. v. gr. Sund. *Im Graben an der Allee nach Papenbagen & alibi*.

Floret Julio, Augusto.

MONADELPHIA.

641 JUNIPERUS communis foliis ternis patentibus macronatis bacca longioribus.

Germ. *Wachholderstrauch*. Nostr. *Knirk, Ehmkenstruuk*. Pharm. *Juniperus*.

Habitat in campis & sylvis sterilibus ericotosis ubique.

Floret Aprili, Majo.

642 TAXUS baccata foliis approximatis.

Germ. *Taxbaum, Eibenzholz*. Nostr. *Ibenholt*.

Habitat in Jas mundensis sylvæ, Stubbeniz, Titoribus passum frequens. v. gr. *Beym Steige vom Königstuhl herunter*, item, *beym Männchen Steige*. Nos. Pom. *Auf dem Dars copiose, ex relatione aliorum*.



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

643 *HOLCUS lanatus* glumis bifloris villosois: hermaphrodito inutico, masculo arista recurva.

Germ. *Wollichtes Darr-Grass*. Schreb.

Habitat in pascuis et nemorosis, solo utplurimum arenoso. v. gr. Sund. *im Haynholz-schen Busch* et alibi.

644 *VALANTIA Cruciatæ* floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. †

Germ. *Gülden-Waldmeister*, *Creutzkraut*, *gelb Creutzkraut*, *rauch Meyerkraut*.

Habitat in dumetis rario. [Gryph. *bey klein Zastrow*.]

645 *PARIETARIA officinalis* foliis lanceolato-ovatis alternis.

Germ. *Glass-Kraut*, Pharmac. *Parietaria*.

Habitat in ruderatis ad muros.

[Gryph. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden copiose.*] Sund, *an der Stadtmauer bey der Catharinen Bastion*; item *am Knieper hohen Wall*, *an der Mauer*, wenn man über dem *Tbor geht, wo die Pforte ist.*

Floret Julio, Augusto.

646 *ATRIPLEX laciniata* caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis subtus argenteis.

Germ.

Germ.

Habitat in litoribus maritimis.

Sund. Auf dem Ufer beym Kruge zur Alten-Fehr copiosissima.

Floret Augusto.

647 ATRIPLEX hastata caule herbaceo: valvulis feminineis magnis deltoidibus sinuatis.

Germ.

Habitat passim in cultis ruderatis.

648 ATRIPLEX patula caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis.

Germ. wilde Melte.

Habitat in ruderatis, cultis, frequens, v. gr.

Sund. hinter die Hekken zwischen dem Küter und Tribseer Thor copiose.

Floret Julio.

649 ATRIPLEX litoralis caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis.

Germ.

Habitat in litoribus marinis. v. gr. [Gryph. bey Wampen.] Sund. vor dem Knieper Thor, item vor dem Franken Thor wo der Graben vom Andershaeffchen See in den Strand leuft. copiosissime.

Floret Julio.

650 ACER Pseudo-Platanus foliis inaequaliter serratis, floribus racemosis.

Germ.

Habitat in sylvis rarius, ad pagos passim.

Sund. in der Voigthager Priester Koppel.

Floret Junio.

651 ACER *Platanoides* foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymbosis,

Germ. Nostr. Læhn.

Habitat in sylvis passim; frequentius in litoribus sylvae Jasenundensis, Stubbenitz, v. gr. bey Stubbenkammer.

Floret Majo.

652 ACER *campestris* foliis lobatis obtusis emarginatis.

Germ. Ahorn.

Habitat in dumetis infrequens.

Sund. am Voigthäger See an der Seite nach Zitterhagen, wo das Ufer am höchsten ist.

Flores nondum vidi.

D I O E C I A.

653 FRAXINUS *excelsior* foliolis serratis, floribus apetalis.

Germ. Esche. Pharmac. *Fraxinus*.

Habitat in sylvis et ad pagos et domus. v. gr.

Sund, in der Voigthäger Priester Koppel, et alibi.

Floret Majo.



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

F I L I C E S.

654 EQUISETUM *sylvaticum* caule spicato, frondibus compositis.

Germ. *Dulwek.*

Habitat in sylvaticis, agris. v. gr. Sund. *beyn Barthischen Wege zur Rechten im Vogelfangischen Busch, und auf den benachbarteren Aekkern.*

655 EQUISETUM *arvense* scapo fructificante nudo, sterili frondosa.

Germ.

Habitat in pratis, arvis, agris, frequens.

656 EQUISETUM *palustre* caule angulato, frondibus simplicibus.

Germ.

Habitat locis paludosis, fossis aquosis et limosis.

(B) *polystachion frondibus simplicissimis longissimis, caulem altitudine superantibus, spiciferis.* Semel lectum ante aliquot annos Sund. circa *Griinehufe.*

657 EQUISETUM *fluviale* caule striato, frondibus subsimplicibus.

Germ.

Habitat ad ripas rivulorum, lacuum, v. gr. Sund. *vor dem Knieper Thor bey dem Brunnen copiose.*

- 658 *EQUISETUM limosum* caule subnudo laevi.
 Germ. Habitat in profundis aquofisis paludosis v g. Sund.
*am Knieper Teich an der Insul vor der ersten
 Knieper Bleiche.*
- 659 *EQUISETUM hyemale* caule nudo scabro,
 basi subramoso.
 Germ. *Schafrüss, Schafthalm, Schaftheu.*
 Habitat in uliginosis, sylvaticis passim.
- 660 *OPHIOGLOSSUM vulgatum* fronde ovata.
 Germ. *Schlangen-Zunge, Nattern-Zunge.*
 Habitat in subumbrosis rarius.
 Sund. *im Vogelsang schen Busch an der Seite ge-
 gen Jungfernhoff zu locis minus umbrosis
 copiose.* Junio.
- 661 *OSMUNDA Lunaria* scapo caulino solitario,
 fronde pinnata solitaria.
 Germ. *Mondkraut, Mondraute.*
 Habitat in montosis, collibus, apricis siccis,
 præsertim Jasmundiæ.
 [Gryph. am Wege nach klein Zastrow, nahe vor
 selbigem, gleich wenn man über den Bach
 geht,] zur Linken. Sund. am Barth'schen
 Wege, nahe vor der Vogelsang'schen Brücke,
 zur Reckten auf einer von den kleinen Anhæ-
 ben copiosissime, item im Haynholz'schen
 Busch locis apricis. Pom. unten am Ufer
 der See, zwischen Zarrentin und Barhæft.
 Jasm. in litoribus montosis der Stubbeniz.
 v. gr. auf Tripp-Ort copiose, item auf der
 äussersten Ecke des Königstuhls frequens.
 Viget Junio, rarius Julio.

662 OSMUNDA regalis frondibus bipinnatis apice racemiferis.

Germ. Nostr. *Johannis-Fahr.*

Habitat in paludosis, montosis rario.

[*Gryph. in Hanshagen*] Sund. *diseits des Devinschen Orts, am Anfange desselben, nahe beym Devinschen See, an einem kleinen Sumpf copiose.* Rug. *am Wege von Tribberaz nach Ahlbek im Tannenholze copiosissima.*

Floret Julio, Augusto.

663 ACROSTICHUM septentrionale frondibus nudis linearibus laciniatis. †

Germ.

Habitat in rimis murorum locis ruderatis umbrosis rarissimum.

664 PTERIS aquilina frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; superioribus minoribus.

Germ. Nostr. *Fahr.*

Habitat in sylvis siccis, frequens. v. gr. Sund. *im Holze vor Brandshagen, item auf dem Devinschen Ort & alibi.*

665 ASPLENIUM Trichomanes frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis.

Gerin. *Wieder-Tod, guldener Wiedertbon.*
Rupp. Jen.

Habitat in rimis murorum locis subumbrosis rarissimum. Copiose Sundiae, *an der Stadtmauer um dem Elmenhorster Kirchhof, an der Nordwestlichen Seite.*

666 ASPLENIUM Ruta muraria frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Gelin.

Germ. *Mauer-Raute*. Pharm. *Ruta muraria*.
 Habitat in rimis murorum antiquorum infre-
 quens. Sund. *an der Stadtmauer*.

667 POLYPODIUM vulgare frondibus pinnatifi-
 dis: pinnis oblongis subferratis obtusis, ra-
 dice squamata.

Germ. *Engelsüß*, *wild Süßholz*. Pharm. *Po-*
lypodium.

Habitat ad lapides, locis subumbrosis haud in-
 frequens.

[Gryph. *bey Hanshagen*.] Sund. inter saxa quæ
 constituunt murum, coemeterium *Elmen-*
horstense cingentem, adeo ut nusquam ali-
 bi copiose, item *am Strandе nach Devin,*
unter den Büschchen.

Maximum, pinnis interdum apice bifidis. Sun-
 diae *in der Heide zwischen Seemühl, Moy-*
sahl und Steinhagen, unter den Büschchen.

668 POLYPODIUM Phegopteris frondibus subbi-
 pinnatis: foliolis infinitis reflexis: paribus
 pinnula quadrangulari coadunatis. †

Germ.

Habitat in Fagetis paßim.

669 POLYPODIUM Felix mas frondibus bipinna-
 tis: pinnis obtusis crenulatis, stipite pa-
 leaceo.

Germ. *Farrenkraut*. Pharm. *Felix*.

Habitat in sylvis frequens. v. gr. Sund. *in der*
Andershæffchen und Voigthæger Priester-
Koppel.

670 POLYPODIUM Felix femina frondibus bi-
 pinnatis:

pinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis.

Germ.

Habitat cum præcedente, sed rarius.

671 POLYPODIUM *fragile* frondibus bipinnatis: foliolis remotis: pinnis subrotundis incisis.

Habitat in aridis lapidosis passim. v. gr. Sund,
an der Steinmauer am Wege von Hof-Parow
nach Bauer-Parow, zur Rechten, item an
der Elmenhorster Kirchhofs-Mauer copiose.

672 POLYPODIUM *Dryopteris* frondibus supra-decompositis: foliis ternis bipinnatis.

Habitat in nemorosis & sylvaticis rarius. Jasim,
in der Stubbeniz rechter Hand vor dem Nip-
merow'schen Baum.

673 ISOETES *lacustris*.

Habitat Sundiae am Fusssteige von Voigthagen
nach Zarrendorf, hinter der Brücke, zur
Rechten, in glareosis nudis, hyberno tem-
pore inundatis, copiosissime.

M U S C I.

674 LYCOPODIUM *clavatum* foliis sparsis fila-
mentolis, spicis teretibus pedunculatis ge-
minis.

Germ. Bärlap, Wolfsklauen, Gürtelkraut, &c.
Rupp. Jen. Pharm. *Muscus clavatus*, *Lyco-
podium*.

Habitat in ericetis, nec non in sylvis. v. gr.
Sund. auf der Heide zwischen Seemühlen,
Moysahl und dem Steinhäger Holz frequens.
item

item auf der Heide zwischen Voigthagen und Zarrendorf. Rug. auf den Bergen zwischen Tribberaz und Ahlbek. Nös. item auf der Paziger Heide, an der Seite nach Bergen copiosissime. M. Willich.

Spicis sapius ternis, an der Graniz gegen Selien copiose.

Floret Julio.

675 *Lycopodium Selago* foliis sparsis octifariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis.

Germ. Pharn. *Muscus erectus.*

Habitat in saxis muscosis sylvæ Jasmundensis, Stubbeniz, locis umbrosissimis rarissime.

Floret Julio.

676 *Lycopodium annotinum* foliis sparsis quinquefariis subserratis, surculis annotino-articulatis; spicis terminalibus glabris erectis.

Habitat in sylvis, locis subumbrosis rarius.

Sund. zur Rechten des Weges vom Arndseeschen Krüge nach Benkenhagen, im Holze, nahe bey den Fichten. Jasm. in der Stubbeniz; v. gr. wenn man von Sasseniz nach Ranzow geht, neben dem Wege von Werder nach Hagen, gegen letzterem, item zur Rechten vor dem Nipmerowschen Baum.

Floret Junio, Julio.

677 *Sphagnum palustre* raimis deflexis.

Habitat in paludibus frequens. v. gr. Sund. im Voigthäger Priester-Moor & alibi.

678 *Splachnum ampullaceum* umbraculo ampullaceo obconico.

Habitat

Habitat in paludibus cæspitosis, stercore con-spurcatis. Sund. im Moor, zur Rechten des Weges zwischen Neegass und Seemühlen, neben die Aecker gegen Seemühlen zu.

679 POLYTRICHUM commune caule simplici.

A) *majus*.

Habitat in uliginosis. Sund. im Lüdersbæger Ellerholz; item zwischen dem Wege von Voigthagen nach Devin und dem Voigthæger Priester-Moor, im Kaalholz.

B) *medium*. Pharm. *Adiantum aureum*.

Habitat in pascuis & campis sterilibus frequens.

Sund. in der Heide zwischen Seemühlen, Moy-sahl und dem Steinhæger Holze copiose, item auf der Franken Weide, item zwischen dem Haynholzschen Busch und der Vogelstange, & alibi.

C) *minus* f. *pilosum*. †

Habitat in arenosis, siccis sterilissimis. Hos (C) a me non lectum.

680 MNIUM pellucidum caule simplici, foliis ovatis.

Habitat in succulentis umbrosis. [Gryph. am Stadtgraben unter den Weiden.] Sund. im Absbæger Holz & alibi.

Obs. *Pedunculus* Antleram ferens, ex tuberculo, in distincta planta; *Calyptra* subæqualis. *Pedunculus* cum Capitulo pulverulento, in alio individuo. *Stella* denique feminea, centro purpurea, etiam in individuo distincto. Num ideo fructificatio triplex?

681 *MNIUM hygrometricum* acaule, anthera nuntante, calyptora reflexa tetragona. †

Habitat in apricis, umbrosis, sterilibus, vel paulo fertilioribus. [Gryph. hinter der Stadtmauer beym Rickfluss.]

682 *MNIUM serpyllifolium* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis.

A) *proliferum* foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. †

Habitat in muscosis.

B) *undulatum* foliis oblongis undulatis.

Habitat in pratis humidis, aliisque locis muscosis ubique. v. gr. Sund. *in der Andershaef-schen Koppel & alibi.*

683 *MNIUM Jungermannia* foliis distichis, pinnis subtus auriculatis. †

Habitat in subhumidis. [Gryph am Rick.]

684 *BRYUM apocarpum* antheris sessilibus terminalibus, calyptora minima.

Habitat in arboribus ubique, nec non in faxis.

685 *BRYUM striatum* antheris subsessilibus sparsis, calyptris striatis sursumve pilosis.

A) *majus.* Habitat in arboribus, truncis. †

B) *minus.* Habitat in faxis & arboribus freq.

C) *pilosum* f. *crispum.* Habitat in sylvis, in truncis arborum. v. gr. Sund. *im Absbäger Holz.*

686 *BRYUM pomiforme* antheris erectis sphæricis. †

Habitat ad aggeres sylvarum truncosve locis succulentis. [Gryph. im Eldenaer Holz.]

687 *BRYUM pyriforme* antheris erectis obovatis, calyptora

calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis.

Habitat in pratis, & ad fossarum aggeres, in humids, nemorosis. v. gr. Sund. *an dem Graben vor dem Lüdershager Ellerholz, wenn man von Voigthagen dahin geht,* copiose.

688 *BRYUM extinctorium* anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus.

Habitat in arenosis, rarius. Sund. *am Franken Reitrenchement zwischen der Wache und dem Strand.*

689 *BRYUM rurale* antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis.

Habitat in muris, tectis stramineis, frequens.

690 *BRYUM murale* antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus cæspitosis.

Habitat in saxis, muris, tectis tegulis, aggeribus ubique. v. gr. Sund. *an den Stadtwällen.*
Floret cum præcedentibus Vere.

691 *BRYUM scoparium* antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato.

Habitat in ericetis, & sylvis ad arborum putredarum truncos v. gr. Sund. *im Abshager Kronholz* copiose. Rug. *in der Heide zwischen Bergen und der Jasmundischen Fehr.*

Floret Majo, Junio.

Pedunculus ex tuberculo, sed involucratus.

692 *BRYUM undulatum* antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus serratis.

Habitat in sylvis v. gr. Sund. *in der Andershæfchen Koppel beym Scheide-Graben, zwischen dieser und der Voigthæger Priester-Koppel.*

Floret Autumno.

693 *BRYUM truncatum* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato.

Habitat ad agrorum fossas & sepes rarius.

Floret æstate exeunte.

694 *BRYUM viridulum* antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis.

Habitat ad latera fossarum, inque aggeribus v. gr. Sund. *am Graben der am Ende der Andershæfchen Koppel die erhabene Gegend, wo das Lusthaus gewesen, einschließt copiose.*

Floret Augusto, Septembri.

695 *BRYUM Hypnoides* antheris erectis, caule erectiuscule, ramis lateralibus brevibus fernalibus. †

Habitat in sylvis, saxis, fabulosis rarius. [Gryphiæ bey Hanshagen im Kirchenholz.]

696 *BRYUM pulvinatum* antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis.

Habitat in saxis frequens.

Floret Vere.

697 *BRYUM cæspiticium* antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis.

Habitat in glareosis, muris, tectis, frequens.

698 *BRYUM capillare* antheris pendulis, foliis ovatis

ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis.

Habitat in glareosis, siccis, & cum præcedente. v. gr. Sund. am Fusssteige von Voigthagen nach Zarrendorf, vor der Brücke zur Rechten; nec non ad paludes sylvaticas. v. gr. Sund. beym Anfange des Lüdershæger Holzes.

Floret æstate cum præcedente.

699 HYPNUM *taxifolium* fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera.

Habitat in umbrosis rarius. Sund. zur Rechten des Weges nach Voigthagen in nemore Stubbenbrook dicto.

Floret primo Vere.

700 HYPNUM *complanatum* fronde pinnata ramosa: foliolis imbricatis acutis complicatis compressis.

Habitat ad radices arborum infrequens. [Gryphiac hinter der Stadtmauer gegen Norden.] Jasen. am Wege von Crampaz nach Sasseniz, nahe vor der Wassermühle. Sundæ nondum visum.

701 HYPNUM *triquetrum* ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis.

Habitat in sylvis rariis. Rug. im Holze bey klein Kubbekow.

702 HYPNUM *rutabulum* ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. †

Habitat in sepibus, umbrosis, ad arborum truncos antiquos.

703 HYPNUM *filicinum* surculis pennatis: ramulis

mulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis.

Habitat in humidiusculis, præfertim in litoribus argillofis ad fonticulos, haud infrequ.

704 *HYPNUM proliferum* surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis, sylvis. [Gryph. bey Hinrichshagen am Waldgraben.] Sund. in der Andershæffchen Koppel v. gr. am Scheidegraben zwischen dieser und der Voigthæger Priester-Koppel, item im Abshæger Kronholz locis umbrosissimis copiosissimum.

705 *HYPNUM parietinum* surculis plano-pinna-tis continuatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis & sylvis siccis frequens.

706 *HYPNUM cypresiforme* surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. †

Habitat ad truncos & radices arborum locis succulentis. [Gryph. hinter der Mauer.]

707 *HYPNUM squarrosum* ramis vagis, foliis ovatis apice subulatis, undique reflexis. †

Habitat in umbrosis, subhumidis. [Gryph. hinter der Mauer.]

708 *HYPNUM curtipedulum* surculis vagis tere-tibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. †

Habitat ad truncos & radices arborum locis succulentis. [Gryph. hinter der Mauer.]

709 *HYPNUM purum* surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus.

Habitat in pascuis, sylvis. [Gryph. inter hor-

tos ad sepes.] Sund. in der Andershaeffchen Koppel.

710 *HYPNUM illecebrum* surculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis.

Habitat in pascuis, nec non in saxis, locisque subumbrosis.

711 *HYPNUM cuspidatum* surculis vagis : apice foliis convolutis acuminatis.

Habitat in paludibus muscosis frequens. Sund. *beym Fusssteige von Voigthagen nach Zarrendorf, zur Rechten bey der Brücke, item wenn man zu Devin, an der Seite da die Sandberge sind, längst dem Mühlenteich geht, am Anfange desselben, an sumpfigten Stellen copiose.*

712 *HYPNUM sericeum* surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis.

Habitat ad truncos arborum, inque campis ubique.

713 *HYPNUM serpens* surculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis.

Habitat ad caudices, ligna, saxa, & in terra.

A L G A E.

714 *JUNGERMANNIA asplenoides* frondibus simpliciter pinnatis : foliolis ovatis subciliatis. †

Habitat ad radices salicium locis umbrosis.

715 *JUNGERMANNIA complanata* surculis repentibus : foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus.

Habitat in umbrosis ad truncos arborum rarior; semel copiose lecta in Jasmundia am Wege von Crampaz nach Sasseniz, nahe vor der Wassermühle, zur Rechten.

716 *JUNGERMANNIA dilatata* turculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus.

Habitat in truncis arborum copiosa.

717 *JUNGERMANNIA tamarisci* foliis imbricatis serie dupli: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus,

Habitat in corticibus arborum, præprimis lae- vioribus. v. gr. Fagi & Pruni *avium* freq.

Jungermanniæ florent hieme.

718 *MARCHANTIA polymorpha* calyce communi decemfido.

Habitat ad ripas rivulorum umbrosas & fontes, nec non juxta aquas in paludosis frequens. v. gr. Gryph. an dem Bach zu Hans-hagen. Sund. beym Fusssteige von Voigthagen nach Zarrendorf, zur Linken von der Brücke copiose. Jasm. an der Trift vor Sagard nach der Obermühle, nabe vor Sagard zur Rechten am Graben copiose, item in der Sagardschen Priester-Koppel, am Bach beym Eller-Moor & alibi.

Floret Junio, Julio.

719 *MARCHANTIA hemisphaerica* calyce comuni quinquefido hemisphaerico, perichaetio nullo. †

Habitat in pascuis humidis rario, [Gryph. bey Keten]

Kætenhagen haud procul a scaturigine, item
im Torfmoor beym Pottkruge. Mense Julio.]

- 720 *RICCIA minima* frondibus glabris biparti-
tis acutis. †

Habitat in pascuis arenosis, ubi per hiemem
aque stagnarunt,

- 721 *LICHEN scriptus* leprosus albicans, lineolis
nigris ramosis characteriformibus,

Habitat in corticibus arborum lævioribus, præ-
fertim in Fagis, passim.

- 722 *LICHEN geographicus* leprosus flavesiens,
lineolis nigris mappam referens.

Habitat rarius in saxis majoribus quarzosis. v.
gr. Sund. auf dem Devinschen Ort, & am
Wege nach Neegass, zur Rechten, nahe vor
der Stelle wo der Teich an den Weg stæßt.

- 723 *LICHEN rugosus* leprosus albicans, lineolis
simplicibus punctisque nigris confertis.

Habitat in corticibus arborum.

- 724 *LICHEN sanguinarius* leprosus cinereo-vi-
rescens, tuberculis atris.

Habitat in arboribus frequens.

B) *cinereo-virescens*, lineis nigris anastomo-
santibus distinctus, tuberculis atris.

Habitat in corticibus lævioribus arborum, præ-
primis ramorum Betulæ *Alni*.

Hujus num varietas?

LICHEN leprosus dilute fuscus, tuberculis a-
tris gibbis majusculis carne nigris. *Nobis.*

Habitat in sylvis in Fagis rario.

- 725 *LICHEN fusco-ater* leprosus fuscus, tubercu-
lis atris. †

Habitat in muris, lapidibus petris.

Num hoc pertinet?

LICHEN leprosus rufo-fuscus, tuberculis atris minimis confertis carne nigris. *Nobis.*

Habitat in Fagis passim.

726 LICHEN *Fagineus* leprosus albus, tuberculis albis farinaceis.

Habitat in Fagis frequens, nec non in aliis arboribus.

727 LICHEN *Carpineus* leprosus candidus, tuberculis albidis rugosis.

Habitat in truncis Carpini, nec non in Fagis.

728 LICHEN *ericetorum* leprosus cinereus, tuberculis incarnatis.

Habitat in ericetis, sterilissimis, glareosis, in terra nuda, nec non in sylvis paludosis Sphagno palustri innascens v. gr. [Gryph. im Grubenbäger Moor.] Sund. *in der Heide zwischen Voigthagen und Zarrendorf* frequentissimus.

Tubercula subglobosa, brevi pedunculo insidentia.

729 LICHEN *candelarius* crustaceus flavus, scutellis luteis.

Habitat in parietibus, muris antiquis frequens; & in aggeribus terrenis in terra nuda. v. gr. Sund. *am Franken Retrenchement.*

730 LICHEN *pallens* crustaceus albicans, scutellis pallidis.

Habitat in corticibus arborum.

731 LICHEN *subfuscus* crustaceus albicans, scutellis subfuscis: margine cinereo subcrenato.

Habitat in arboribus frequens, nec non in muris.

- 732 LICHEN *centrifugus* imbricatus, foliolis multifidis obsolete lœvibus albido centrifugis, scutellis rufo fuscis.
 Habitat in saxis majoribus passim frequens.
- 733 LICHEN *saxatilis* imbricatus, foliolis sinuatatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus.
 Habitat in saxis passim. v. gr. Sund. Auf dem Devinschen Ort, & am Kirchhofe zu Gustow. item in der Heide zwischen Seemühlen und Moysahl frequens & alibi.
- 734 LICHEN *olivaceus* imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis:
 Habitat in arboribus frequens, nec non in lapidibus.
- 735 LICHEN *parietinus* imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis.
 Habitat in parietibus, lignis, arboribus, ubique.
- 736 LICHEN *physodes* imbricatus: laciniis obtusis subinflatis.
 Habitat in arboribus frequens.
Apices foliorum primo vere subtus virides fastigatae, dein inflati subtus fuscæ.
- 737 LICHEN *stellaris* imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis.
 Habitat in ramis arborum ubique.
Scutella nigra, farina alba primum adpersa, ut primo intuitu albida videantur, margine cinereo.
- 738 LICHEN *ciliaris* foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis.

Habi-

Habitat in arboribus ubique.

739 LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunosus; subtus tomentosus.

Germ. Baum-Lungenkraut. Nostr. Lunggraff.
Pharm. *Pulmonaria arborea*.

Habitat in sylvis umbrosis, super arbores antiquas, præfertim in Fagis & Quercubus. v.gr. [Gryph. *Im Eldenaer Holz.*] Sund. *Im Steinbäger Holz.* item, *im Absbäger Holz.*

740 LICHEN *furfuraceus* foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis: subtus lacunosis atris.

Habitat rarius in corticibus arborum præfertim Pini *sylvestris*.

741 LICHEN *farinaceus* foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus: lateribus verrucosis.

Habitat in arboribus antiquis, præprimis Quercubus.

742 LICHEN *calicaris* foliaceus erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus.

Habitat in arboribus antiquis foliosis.

743 LICHEN *fraxineus* foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis.

Habitat in arboribus, in primis Quercubus & Fraxinis.

744 LICHEN *prunastri* foliaceus erectiusculus lacunosus: subtus tomentosus albus.

Habitat in arboribus, copiosissimus in *Pruno spinosa*.

745 LICHEN *juniperinus* foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis.

Habitat in Juniperis, aliisque arboribus.

746 LICHEN *glaucus* foliaceus depresso lobatus glaber, margine crispo farinaceo.

Habitat in arboribus fere ubique, nec non in axis.

747 LICHEN *aphtosus* foliaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. †

Pharmac. *Muscus cumatilis*.

Habitat in sylvis sterilibus muscosis sub juniperis.

748 LICHEN *caninus* foliaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente.

Pharmac. *Muscus caninus*.

Habitat in sylvis ad radices arborum, & juxta lapides in terra frequens, & in ericetis. v. g. Sund. In der Heide zwischen Seemühlen und Moysahl.

749 LICHEN *cocciferus* scyphifer simplex integrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

Pharmac. *Muscus pyxidatus*.

Habitat in ericetis, sylvis sterilibus frequens. Copiosissimus in Rugia auf dem Ralsewykischen Dünens bey Ahlbek.

750 LICHEN *pyxidatus* scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis.

Habitat in sterilibus, arenosis, frequens in terra nuda, nec non in truncis putridis arborum;

rum; interdum quoque legi Polytricho ~~com-~~
muni innatum.

- 751 LICHEN *fimbriatus* scyphifer simplex den-
ticulatus, stipite cylindrico.

Habitat in sylvis sterilibus, arenosis, ericetis,
frequens. v. gr. Sund. *In der Heide zwischen
Seemühlen und Moysahl* copiose.

- 752 LICHEN *gracilis* scyphifer ramosus denti-
culatus filiformis. †

Habitat in sterilibus, petrosis, muris antiquis.

- 753 LICHEN *cornutus* scyphifer simpliciusculus
subventricosus, calycibus integris.

Habitat in ericetis & in lignis, truncisque ar-
borum putridis paßim.

- 754 LICHEN *deformis* scyphifer simpliciusculus
subventricosus, calycibus dentatis. †

Habitat in sylvis, muris antiquis umbrosis.

- 755 LICHEN *rangiferinus* fruticulosus perfora-
tus ramolissimus, ramulis nutantibus. B)
sylvaticus.

Habitat in sterilibus, ericetis ubique. v. gr.
Sund. *Auf dem Devinischen Ort* copiose.

- 756 LICHEN *subulatus* fruticulosus subdichoto-
mus, ramis simplicibus subulatis. †

Habitat in sylvis.

- 757 LICHEN *plicatus* filamentosus pendulus, ra-
mis implexis, scutellis radiatis. †

Pharmac. *Muscus arboreus*.

Habitat in densis sylvis.

- 758 LICHEN *barbatus* filamentosus pendulus
subarticulatus, ramis patentibus. †

Habi-

Habitat in Fagis, aliisque arboribus acerosis antiquis.

- 759 LICHEN *jubatus* filamentosus pendulus: axillis compressis.

Habitat in arboribus acerosis. v. gr. Sund. *An den Fichten im Holze zur Rechten des Weges von Arndsee nach Benkenhagen.*

Rami implexi, non articulati; Tubercula farinacea lateralia.

- 760 LICHEN *chalybeiformis* filamentosus subramosus decumbens implicato-flexuosus.

Habitat supra truncos arborum & sepimenta rario.

- 761 LICHEN *hirtus* filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis.

Habitat ubique in arboribus frequentissimus.

- 762 CHARA *vulgaris* caulis lœvibus, frondibus interne dentatis.

Habitat in aquis pigris. v. gr. [Gryph. *Vor dem Feten Thor auf der Weide.*] Sund. *In den alten Torfgruben im Voigthæger Priester Moor.*

- 763 CHARA *bispida* aculeis caulinis capillaribus confertis.

Habitat in Mari versus litora arenosa, frequens. v. gr. Sund. *Im Strande vor dem Knieper Thor* copiose & alibi.

- 764 TREMELLA *juniperina* sessilis membranacea auriformis fulva.

Habitat in juniperis primo Vere.

- 765 TREMELLA *Nostoc plicata undulata*. †

Habitat in pratis rarius.

- 766 *TREMELLA Auricula* sessilis membranacea
auriformis cinerea.
Germ. *Fliederschwamm*. Pharm. *Fungus sam-*
bucinus. Auricula Iude.
Habitat ad arbores putridas, & in sepibus pu-
tridis. Vere.
Colore rubro variat, licet rarius.
- 767 *TREMELLA hemisphærica* hemisphærica
sparfa.
Habitat in lapidibus submarinis versus litora
copiosa. v. gr. Sund. *Auf den Steinen im*
Strande vor dem Knieper Thor.
- 768 *TREMELLA purpurca* subglobosa sessilis for-
litaria glabra.
Habitat in arborum ramis moribundis, & se-
pibus lignisque putridis, tempore pluvioso,
præsertim Vere.
- 769 *FUCUS serratus* fronde plana dichotoma
serrata ad apices tuberculata. †
Habitat in Mari Balthico. In litoribus maris
passim rejecta reperitur.
- 770 *FUCUS vesiculosus* fronde dichotoma integra,
caule medium folium transcurrente, vesicu-
lis verrucosis terminalibus.
- Habitat in lapidibus submarinis Maris Balthici,
versus litora frequentissimus.
- 771 *FUCUS fastigiatus* dichotomus ramosissimus
teres uniformis fastigiatus.
Habitat in Mari Balthico. Ad litora passim
rejectur.
- 772 *FUCUS Filum* filiformis simplex subfragilis
opacus.

Habi-

Habitat cum præcedente.

773 *ULVA intestinalis* tubulosa simplex.

Habitat in lapillis submarinis Maris Balthici frequens.

774 *ULVA compressa* tubulosa ramosa compressa. †
Habitat in Mari Balthico.

775 *ULVA latissima* oblonga plana undulata membranacea viridis.

Habitat in Mari Balthico, ad litora passim rejecta occurrit.

776 *ULVA Linza* fronde oblonga bullata.

Habitat in Mari Balthico versus litora ad lapides haud infrequens.

777 *ULVA granulata* sphærica aggregata. †

Habitat ad ripas paludum.

778 *CONFerva bulbosa* filamentis æqualibus ramosis, bullas aëreas includens.

Habitat in aquis pigris & stagnantibus frequens.

779 *CONFerva litoralis* filamentis æqualibus ramosissimis elongatis scabriusculis.

Habitat in Mari Balthico versus litora arenosa, & in lapidibus submarinis frequens.

Colore fusco & viridi variat.

780 *CONFerva gelatinosa* filis ramosis moniliformibus: articulis globosis gelatinosis.

Habitat in fontibus limpidissimis, & rivulis.

Sund. Am Wege von Voigthagen nach Wendorf zur Rechten bey der Brücke, im Graben der aus dem Lüdershaer Ellerholz in den Voigthaer Teich geht copiose.

781 *Byssus Flos aquæ* filamentis plumosis natantibus.

Habitat in aquis prima æstate.

782 BYSSUS *phosphorea* lanuginosa violacea lignis adnascens.

Habitat in lignis vetustis & putridis.

783 BYSSUS *velutina* filamentosa viridis.

Habitat in terra subumbrosa subhumida.

784 BYSSUS *saxatilis* pulverulenta cinerea rupes operiens. †

Habitat in faxis.

785 BYSSUS *candalaris* pulverulenta flava lignis adnascens.

Habitat in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis, nec non in faxis & muris.

786 BYSSUS *botryoides* pulverulenta viridis.

Habitat in terra diutius humida, ad radices murorum umbrosas, humidas, v. gr. in cellis concameratis & alibi frequens.

Initio late virescit, dein saturate viridis evadit. Tandem atate hic color mutatur in atrum.

787 BYSSUS *lactea* pulverulento-crustacea albissima.

Habitat in corticibus arborum, præsertim Salicis albae.

F U N G I.

788 AGARICUS *Cantharellus* stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus.

Habitat in sylvis & pratis sylvaticis. v. gr. [Gryph. Zu Hansehagen.] Sund. Im Holze vor Brandshagen & alibi. Occurrit Julia Angusto.

789 *AGARICUS integer* stipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus.

Habitat in sylvis, fccis rario. Sund. *Im Tannenholz zwischen Seemühl und Moyfahl.* Augusto.

Pileus *sanguineus.* Lamellæ *niveæ.*

790 *AGARICUS muscarius* stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato: apice dilatato, basi ovato.

Habitat in pratis & sylvis rario. Sund. *Im Tannenholz zwischen Seemühl und Moyfahl.* Septembri, Octobri.

Pileus *sanguineus,* verrucis albis maculatus. Lamellæ *albae.*

791 *AGARICUS dentatus* stipitatus, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis.

Habitat in sylvis passim. v. gr. Sund. cum præcedente, & *im Holze vor Brandshagen.* Exeunte Æstate & Autumno.

792 *AGARICUS deliciosus* stipitatus, pileo testaceo: succo lutescente.

Germ. *Reischen.*

Habitat in sterilibus, montosis, arenosis, frequens. [Gryph. Hanshagæ & zu Klein Zastrow.] Sund. *Auf dem Devinschen Ort cop. item, auf dem Käpfenberge & alibi.* Reperitur Augusto & serius.

793 *AGARICUS piperatus* stipitatus, pileo planiusculo lactescente: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. †

Germ. *Pifferling.*

- Habitat in sylvis. [Gryph. Inter *Eldena & Dicdrichshagen.*]
- 794 AGARICUS campestris** stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis ruffis.
Germ. *Champignon.*
Habitat in pratis, campis, pascuis, passim frequens. [Gryph. *Auf der Straße in Neuenkirchen.*] Sund. *Auf dem Devinschen Ort* copiose & alibi. Augusto.
- 795 AGARICUS violaceus** stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite cæruleofuscante lana ferruginea.
Habitat ad margines sylvarum rario. Sund.
Im Tannenholz zwischen Seemühl und Moyfahl. Autumno.
- 796 AGARICUS cinnamomeus** stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo-ruffis.
Habitat in sylvis rario. Sund. *Am Ende der Trift die von dem Wege, von Hoff-Parow nach Bauer-Parow zur linken abgeht, bey Moor, bey den hohen Ellern. item, im Holze vor Brandshagen.* Juhu, Augusto, Septembri.
- 797 AGARICUS equestris** stipitatus, pileo pallido: disco stellatim luteo, lamellis sulphureis.
Habitat in pascuis, sylvis passim. Sund. *Im Holze vor Brandshagen.* Septembri.
- 798 AGARICUS campanulatus** stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo.
Habitat in pratis, sylvis. v. gr. Sund. cum præcedente, nec non ad ambulacra, & ligna putrida, præprimis Autumno.

799 AGARICUS *Quercinus* acaulis, lamellis labyrinthiformibus.

Germ. *Eichenschwamm*.

Habitat in sylvis, in truncis quercinis frequens.
v. gr. Sund. *Im Elmenhorster Holze*.

800 AGARICUS *Betulinus* acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus.

Germ. *Baumschwamm*.

Habitat in Betulis aliisque arboribus passim.
v. gr. Sund. *Im Absbæger Holz, & in der Andershæffchen Koppel*.

801 BOLETUS *suberosus* acaulis pulvinatus albus lœvis, poris acutis difformibus.

Habitat in sylvis in truncis arborum præferentim Betulæ rarior. Sund. *Im Absbæger Holz beym Heller*

802 BOLETUS *fomentarius* acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis.

Germ. *Feuerschwamm*.

Habitat in Betulis aliisque arboribus frequens.

803 BOLETUS *versicolor* acaulis: fasciis dicoloribus, poris albis.

Habitat ad truncos arborum antiquarum frequens. v. gr. Sund. *In der Voigthæger Priester Koppel*, copiose, nec non in ligneis parietibus & afferibus prope terram.

804 BOLETUS *svaveolens* acaulis, superne lœvis, salicinus.

Germ. *Weidenschwamm*.

Habitat passim in Salice alba.

805 BOLETUS *luteus* stipitatus pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis flavissimis, stipe albido.

Habitat in sylvis. Sund. im Tannenholz zwischen Seemühl und Moysahl, item auf dem Devinschen Ort. Augusto.

806 BOLETUS *bovinus* stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus. †

Habitat in pratis & sylvis mense Augusto.

807 BOLETUS *subtomentosus* stipitatus, pileo flavo subtomentoso, poris subangulatis difformibus fulvis planis, stipite flavo.

Habitat in sylvis, præsertim Pinetis rarer. Sund. im Tannenholz zwischen Seemühl und Moysahl, item im Holze, zur Rechten des Weges von Arndsee nach Benkenbagen, um die Fichten. Augusto.

808 BOLETUS *subsquamosus* stipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuosis niveis.

Habitat in sylvis stipitatus, & ad truncos arborum subfessilis subdimidiatus stipite brevissimo. Sund. zwischen Elmenhorst und Absbagen, zur Rechten im Mittelbusch, item in der Voigthaeger Priester-Koppel, neben der Scheide zwischen dieser und der Andershaef-schen Koppel. Semel quoque lectus vor Garbodenhagen.

Primo initio est substantia gelatinosa, instar Tremelle.

Hujus forsan varietas est fungus cuius sequitur descriptio. Fungus

Fungus acaulis, suborbicularis (diametro feret ulnam aequante) supra sessilis, subcoriaceus, subsquamulosus, albidus, margine obtuso niveo: subtus porosus fulvus. Pori maxime inaequales, oblongo-flexuosi; in centro fungì altiores, angustiores & soluti: versus marginem fungi evanescentes, latiores & connexi. Stipes nullus cum pilei superior pars ejus vires sustineat. Odor B. swaveolentis.

Habitat in cellarum concameratarum, aëris liberiore accessu privataram, cameris rarissimi.

809 *PHALLUS esculentus* pileo ovato celluloso nudo rugolo. †

Germ. *Murchel.*

Habitat in sylvis antiquis. [Gryph. zu Grubenbagen]

810 *HELVELLA Mitra* pileo deflexo adnato lobato disformi. †

Germ. *Steinmurchel.*

Habitat in truneis putridis, locisque succulentis umbrosis sylvarum.

811 *PEZIZA lentifera* campanulata lentifera. †
Habitat in sepibus & areis hoitorum.

812 *PEZIZA punctata* turbinata truncata, disco punctato. †

Habitat supra equorum stercorea. Vere tantum reperitur.

813 *PEZIZA scutellata* plana: margine convexo piloso.

Habitat in parietibus ligneis putridis, & salicibus vetustate excavatis putridis. v. g. [Gryph. ver den Thären zwischen die Gärten.], Sund.

*in alten Weiden auf dem Wall rario. Vere
& Autumno post tempestates pluviosas.*

814 PEZIZA cochleata turbinata cochleata.

Habitat in subumbrosis passim frequens major,
in apricis arenosis rario & minor. Lecta
Sund. am hohen Graben bey der hohen Brücke,
zur Linken, jenseits des Grabens copiose,
item im Scheidegraben zwischen der Andershæfchen und Voigthaeger Priester-Koppe.
April. Item bey Devin auf den Sandbergen,
disseits des Mühlenteiches. Septemb.
In iisdem locis eam postea frustra quæsivi.

815 ?CLAVARIA digitata ramosa lignea nigra.

? Agaricus digitatus, niger, humilior, & instar
corii canis carchariæ tuberculis exasperatus,
quæ singula totidein ovata indicant nigerri-
mi pulveris receptacula. Rupp. jen. Edit.
Francof. p. m. 306. Haller jen. p. 384.

? Lichenagaricus terrestris, digitatus, niger, api-
cibus albo-ruffis, seminibus griseis undique
conspersis, radice membranacea longissima,
varie divaricata, & implexa. Michel. vide
Haller. jen. l. cit.

Habitat rario ad ligna putrida prope terram
Autumno.

Radix atra, compressa, ramosa; singulo ramo
infidet Fungus subclavatus obtusus, vel o-
vatus acutus, teres vel subcompressus, circi-
ter unciam longitudine, quartam ejusdem
vel dimidiam partem crassitie aquans: Su-
perficie inaequali, scabra, nigra; in qua ap-
parent puncta minima, aterrima, nitida,
qua,

que, si cultro Botanico subjiciantur, sunt globuli pulvere nigro vel liquore nigro pleni, fere magnitudine seminis sinapis, ultra dimidiam partem intra superficiem Fungi absconditi. Fungus hic, si longitudinaliter dissecetur, constat ex fibris, primum quasi ad axem longitudinalem adscendentibus purpurascientibus, dein arcu ad superficiem flexis albis.

816 CLAVARIA *Hypoxylon ramoso-cornuta* compressa.

Habitat ad ligna putrida & ad radices salicium rario. Autumno & Hyeme.

Fungus basi subramosus pilis atris quasi velutinus, media parte cinereus, versus apicem integer vel ramoso-cornutus, apicibus glabris ex luteo albis obtusiusculis, extus pulverulentis.

817 ?CLAVARIA fastigiata ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis.

Habitat in arboribus putridis rarissima. Semel lecta in Rugia prope klein Kubbelkow in Salice putrida cum Peziza scutellata, initio Autunni.

Basis coriacea subtilis glabra, supra obsita: Tubulis teretibus, confertis, dichotomo-ramosis, obtusis, fastigiatis, ex membrana tenuissima pellucida constantibus, pulvere subtilissimo fusco repletis, qui, si vel minima vi comprimentur, apice aperiuntur, pulveremque emitunt: Sub primo initio sunt substantia gelatinosa, lutea, ut alii Fungi.

Fungi hi (815, 816, 817.) sunt perpendiculares, superficie unica, quapropter Clavariis Linneanis sunt associandi. Sed quia Primus

(815) solidas, in superficie globulos (qui mihi fructificationes esse videntur) fert; Secundus (816) plerumque solidus, fructificationes conspicuas vix ostendit, nisi pulverem subtilissim. apices tegentem fructificationem dicas; Tertius (817) tubulosus, pulvere repletus est; me quidem judice sub eodem genere militare non possunt, & propterea sunt separandi. Cum vero leviuscula mea cognitio, & parva librorum suppellex, mihi non sufficient, qui justa certaque iis imponam nomina, ea, que reperire potui, nomina, iis quodammodo competentia, recensere, & que in speciminibus letis observare licuit, adjungere visum est. Determinent Botanici peritiores.

818 LYCOPERDON Bovista subrotundum: lacerato-dehiscens.

Germ. *Bofst.* Pharm. *Crepitus Lupi.*

Habitat in campis sterilibus ubique. v. gr. Sündix auf dem Devinschen Ort copiose.

819 LYCOPERDON stellatum volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. †

Habitat in collibus. [Gryphiæ in monticulo Fuchsberg dicto.]

820 LYCOPERDON epidendrum cortice farinaceo-purpurea.

Habitat in hortorum asseribus & parietibus antiquis, nec non arboribus.

821 LYCOPERDON epiphyllum aggregatum parasiticum: ore multifido lacero: pulvere fulvo.

Habitat in dorso foliorum *Tusilaginis Farfa-* *rg.*

v. gr. [Gryph. im Eldenaer Holz.] Sund.
am Ufer des Devinschen Sees & alibi.

- 822 LYCOPERDON *sepium* sessile subglobosum,
cortice dupli, farina atra compacta. Nobis.
?Lichenoides tuberculosum compressum ni-
grum, lignis putridis adnascens. Dill. musc.
Tab. 18. Fig. 7.

?Lichenagaricus disciformis punctatus nigricans.
Haller. Jen. p. 385.

Habitat in sepibus putrescentibus passim freq.
Obs. *Fungus subglobosus* f. *lenticularis*, *parvus*,
vix ultra pisi magnitudinem excedens, *sessi-*
lis, *nascitur vernali tempore*. Cortex exte-
rior *fulvus*, *tener*, *subfriabilis*, *brevi tem-*
pore debiscit in partes irregulares. Cortex
interior *craffior*, *durior*, *substantia quasi*
cornea, *superficie inaequali rugosa* f. *tuber-*
losa, *fusco-nigricans*, *persistit per aliquot*
menses, *interdum ad annum tempus*, *&*
alius speciei fungum mentitur, *similem Fi-*
guræ Dillenii citatae. Farina atra, *a cen-*
tro versus peripheriam compactior.

- 823 MUCOR *Mucedo* stipitatus, capsula globosa.
Germ. Schimmel.

Habitat in putridis.

- 824 MUCOR *Erysiphe* albus, capitulis fuscis ses-
silibus.

Germ. Honigthaut.

Habitat in plantis variis v. gr. Asperagine, Li-
thospermo, cet.

- 825 MUCOR *septicus* unctuosus flavus.

Habitat in terra prægnante & ad parietes li-
gneos.

APPEN-

APPENDIX.

OMISSA.

826 *GALIUM sylvaticum* foliis octonis lævibus
subtus scabris: floralibus binis, pedunculis
capillaribus, caule lævi.

Germ.

Habitat in sylvos, collium & litorum vepre-
tis passim. v. gr. Sund. *auf dem Ufer zwi-*
schen Alte-Fehr und Grabl.

Floret Junio.

827 *ANETHUM graveolens* fructibus compressis.

Germ. *Dill, Till.* Pharm. *Anethum.*

Habitat in cultis, ruderatis passim.

Floret Junio, Julio.

828 *SCHEUCHZERIA palustris.*

Germ.

Habitat in paludosis rario. Sund. *im Moor,*
zur Rechten des Weges von Neegass nach
Seemühlen ubi eam cum fructu legi Junio.

829 *VACCINIUM Vitis idæa* racemis terminali-
bus nutantibus, foliis obovatis revolutis in-
tegerrimis subtus punctatis.

Germ. *Preusselbeeren.* Rupp. Jen. Svecis Lin-
gon. Pharm. *Vitis idæa.*

Habitat in sylvis. Pom. *auf dem Dars.* v. gr.
zwischen Born und Ahrenshoff copiosissime,
item im Sülzer Moor.

830 RUBUS *Chamæorus* foliis simpliciter loba-tis, caule inermi unifloro.

Germ. Svecis *Hiortron*. Pharmac. *Cha-mæorus*.

Habitat in nemoribus paludosis. Poin. *auf dem Dars* ubique.

Hanc plantam & *præcedentem legit*, *earumque loca natalia* benevolus *communicavit* Illustriss. & Excellentiss. Dn. Comes von LIEWEN, S: Maj: Reg. & Regni Svec. Senator, & per Pm. atque Rug. Gubernat. General. &c. &c.

831 ERVUM *Lens* pedunculis subbifloris, semi-ninibus compressis convexis.

Germ. *Linsen*. Pharm. *Lens*.

Habitat nonnunquam inter segetes, præfertim Jasmündiæ. Floret Junio.

832 ZOSTERA *marina*.

Germ. Nostr. *Dank*.

Habitat in fundo mari Balthici versus litora ubique, copiosa ad litora rejicitur.

833 HYPNUM *velutinum* surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus.

Habitat ad radices arborum umbrosas.

834 ?JUNGERMANNIA *bidentata* frondibus si-n-pliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bi-dentatis.

Habitat in subumbrosis. Jasim. am Graben der um die Priester-Koppel zu Sagard gezogen ist frequens. M. Willich.

Frondes ramosæ, simpliciter pinnatae. Foliola pellucida subovata, apice bidentata, dentibus acuminatis patentibus. Flores non vidi. 835

835. *HYDNUM parasiticum acaule arcuato-rugosum tomentosum.*

Germ.

Habitat rarius in arboribus, Autumno & Hyeme.

Fungus acaulis, initio gelatinosus: deinde subcoriaceus, arcubus elevatis rugosis flexuosisque inaequalis; supra tomentosus, violaceus marginibus pallidis: subtus fibris brevibus rectis rigidiusculis primum albis dein subfuscis obsitus.

ADDENDA.

JUNCUS articulatus No. 229.

B) viviparus fasciculis foliorum, loco florum, prodeuntibus.

Gramen junceum, folio articulato, cum utriculis. Scheuchz. gram. 333.

Occurrit Autumno ad ripas lacuum, fossarum, & in ericetis locis depresso huimentibus.





I. INDEX.

GENERUM

A

	No.		No.
		Alpine	207
Acer	650	Alyssum	418
Achillea	554	Anagallis	134
Aconitum	345	Anchusa	119
Acorus	225	Andromeda	265
Acrostichum	663	Anemone	348
Actaea	336	Anethum	827
Adoxa	261	Angelica	189
Aegopodium	203	Anthemis	551
Aethusa	195	Anthoxanthum	25
Agaricus	788	Anthyllis	457
Agrimonia	303	Antirrhinum	405
Agrostemma	291	Apium	202
Agrostis	46	Aquilegia	346
Aira	51	Arabis	430
Ajuga	370	Arbutus	266
Alchemilla	106	Arctium	509
Alisma	243	Arenaria	284
Allium	215	Arnica	544
Alopecurus	42	Artemisia	523
		Arundo	

I. INDEX.

	No.		No.
Arundo	78	Butomus	262
Asclepias	162	Byssus	781
Asparagus	220		
Asperugo	123		C.
Asperula	93	Calla	581
Asplenium	665	Callitriches	3
Aster	537	Caltha	369
Astragalus	473	Campanula	137
Athamanta	186	Cannabis	633
Atriplex	646	Cardamine	420
Avena	76	Carduus	512
		Carex	588
	B	Carlina	518
Ballota	386	Carpinus	612
Bellis	545	Carum	200
Berberis	234	Centaurea	556
Betonica	383	Cerastium	295
Betula	603	Chaerophyllum	197
Bidens	519	Chara	762
Boletus	801	Chelidonium	337
Brassica	433	Chenopodium	164
Briza	64	Chrysanthemum	546
Bromus	72	Chrysosplenium	269
Bryonia	616	Cichorium	508
Bryum	684	Cicuta	194
Bunias	437	Cineraria	

I. INDEX.

	No.		No.
Cineraria	543	Daucus	183
Circaeа	6	Delphinium	344
Clavaria	815	Dentaria	419
Clinopodium	389	Dianthus	275
Cnicus	517	Draba	410
Cochlearia	415	Drosera	212
Comarum	335		E.
Confervा	778		
Conium	184	Echium	125
Convallaria	221	Elymus	84
Convolvulus	135	Epilobium	246
Conyza	531	Equisetum	654
Cornus	105	Erica	253
Corylus	613	Erigeron	532
Crambe	438	Eriophorum	35
Crataegus	312	Ervum	469, 831
Crepis	504	Eryngium	179
Cucubalus	279	Erysimum	426
Cuscuta	107	Evonymus	154
Cynosurus	66	Eupatorium	521
Cynoglossum	120	Euphorbia	305
Cypripedium	580	Euphrasia	396
	D.		F.
Dactylis.	65	Fagus	611
Datura	148	Festuca	67
	P		Filago

I. INDEX.

	No.		No.
Filago	559	Hippophaë	632
Fragaria	327	Hippuris	2
Fraxinus	653	Holcus	643
Fucus	769	Holosteum	87
Fumaria	451	Hordeum	85
G.		Hottonia	129
		Humulus	634
Galeopsis	380	Hydnnum	835
Galium	94, 826	Hydrocharis	640
Genista	455	Hydrocotyle	180
Gentiana	176	Hyoscyamus	149
Geranium	439	Hyoseris	505
Geum	333	Hypericum	484
Glaux	161	Hypnum	699, 833
Glecoma	376	Hypochaeris	506
Gnaphalium	527	I.	
Gratiola	19	Iasione	562
H.		Iberis	417
Hedera	160	Ilex	108
Hedysarum	472	Impatiens	567
Helvella	810	Inula	539
Heracleum	188	Iris	29
Herniaria	163	Hoëtes	673
Hesperis	429	Iuncus	226
Hieracium	497	Iungerman.	714. 834
		Juniperus	

I. INDEX.

	No.		No.
L.		M.	
<i>Iuniperus</i>	641	<i>Lythrum</i>	302
<i>Lactuca</i>	492		
<i>Lamium</i>	377	<i>Malva</i>	448
<i>Lapsana</i>	507	<i>Marchantia</i>	718
<i>Laserpitium</i>	187	<i>Marrubium</i>	387
<i>Lathraea</i>	402	<i>Matricaria</i>	548
<i>Lathyrus</i>	461	<i>Medicago</i>	483
<i>Ledum</i>	264	<i>Melampyrum</i>	398
<i>Lemna</i>	582	<i>Melica</i>	57
<i>Leontodon</i>	494	<i>Mentha</i>	374
<i>Leonurus</i>	388	<i>Menyanthes</i>	128
<i>Lepidium</i>	411	<i>Mercurialis</i>	638
<i>Lichen</i>	721	<i>Mespilus</i>	315
<i>Ligustrum</i>	5	<i>Milium</i>	45
<i>Linum</i>	210	<i>Mnium</i>	680
<i>Lithospermum</i>	117	<i>Monotropa</i>	263
<i>Lolium</i>	82	<i>Mucor</i>	823
<i>Lonicera</i>	144	<i>Myagrum</i>	408
<i>Lotus</i>	482	<i>Myosotis</i>	116
<i>Lychnis</i>	292	<i>Myosurus</i>	214
<i>Lycoperdon</i>	818	<i>Myriophyllum</i>	658
<i>Lycopodium</i>	674		N.
<i>Lycopsis</i>	124		
<i>Lycopus</i>	24	<i>Nardus</i>	
<i>Lysimachia</i>	130	P 2	37
			<i>Nepeta</i>

L INDEX.

	No.		No.
<i>Nepeta</i>	373	<i>Phallus</i>	809
<i>Nymphaea</i>	341	<i>Phellandrium</i>	193
O.		<i>Phleum</i>	41
<i>Oenanthe</i>	192	<i>Phyteuma</i>	143
<i>Ononis</i>	456	<i>Picris</i>	489
<i>Ophioglossum</i>	660	<i>Pimpinella</i>	201
<i>Ophrys</i>	575	<i>Pinguicula</i>	20
<i>Orchis</i>	568	<i>Pinus</i>	614
<i>Origanum</i>	390	<i>Plantago</i>	99
<i>Ornithogalum</i>	218	<i>Poa</i>	58
<i>Ornithopus</i>	471	<i>Polygala</i>	453
<i>Orobus</i>	458	<i>Polygonum</i>	255
<i>Osmunda</i>	661	<i>Polypodium</i>	667
<i>Oxalis</i>	290	<i>Polytrichum</i>	679
P.		<i>Populus</i>	635
<i>Panicum</i>	40	<i>Potamogeton</i>	109
<i>Papaver</i>	338	<i>Potentilla</i>	328
<i>Parietaria</i>	645	<i>Prenanthes</i>	493
<i>Paris</i>	260	<i>Primula</i>	126
<i>Parnassia</i>	208	<i>Prunella</i>	394
<i>Pastinaca</i>	199	<i>Prunus</i>	308
<i>Pedicularis</i>	403	<i>Pteris</i>	664
<i>Peziza</i>	811	<i>Pulmonaria</i>	121
<i>Phalaris</i>	38	<i>Pyrola</i>	267
		<i>Pyrus</i>	316
Q.			

I. INDEX.

	No.	No.
Q.		
Quercus	610	Scabiosa 88 Scandix 196 Scheuchzeria 828
R.		Scirpus 30 Ranunculus 354 Raphanus 436 Reseda 304 Rhamnus 152 Rhinanthus 395 Ribes 155 Riccia 720 Rosa 320 Rubus 323, 830 Rumex 235
S.		Scleranthus 272 Scrophularia 407 Scutellaria 393 Sedum 288 Selinum 185 Sempervivum 307 Senecio 535 Serapias 578 Serratula 510 Sherardia 92 Silene 280 Sinapis 434 Sagina 115 Sagittaria 609 Salicornia 1 Salix 617 Salsola 174 Sambucus 205 Sanguisorba 104 Sanicula 181 Saponaria 274 Saxifraga 270
	P 3	Spiraea

I. INDEX.

	No.		No.
Spiraea	318	Tussilago	533
Splachnum	678	Typha	585
Stachys	384		U.
Statice	209		
Stellaria	281	Ulmus	175
Stratiotes	347	Ulva	773
Symphytum	122	Urtica	695
		Utricularia	21
	T.		V.
Tanacetum	522		
Taxus	642	Vaccinium	250, 829
Teucrium	372	Va <small>n</small> tania	644
Thalictrum	352	Valeriana	26
Thlaspi	412	Verbascum	146
Thymus	391	Verbena	23
Tilia	343	Veronica	7
Tordylium	182	Viburnum	204
Tormentilla	332	Vicia	464
Tragopogon	488	Viola	563
Tremella	764	Viscum	631
Trientalis	245		X.
Trifolium	474		
Triglochin	241	Xanthium	607
Triticum	86		Z.
Trollius	68		
Turritis	431	Zostera	832

II. INDEX.

NOMINUM GERMANICORUM.

A.

<i>Abelen</i>	635	<i>Alandwurzel</i>	539
<i>Abbiss</i>	88	<i>Alfranken</i>	144
-- <i>Teufels</i>	88	<i>Aloe-Wasser</i>	347
<i>Adbars Nibben</i>	344	<i>Andorn, schwar-</i>	
<i>Aehmts Weiden</i>	627	<i>zer</i>	386
<i>Aeppel-Höltik</i>	317	-- <i>Wasser</i>	24
<i>Aerle</i>	604	-- <i>weisser</i>	387
<i>Aeschen, faul</i>	136	<i>Angelik</i>	189
<i>Aggermennig</i>	303	-- <i>wilde</i>	190
<i>Ahorn</i>	652	<i>Apfelbaum, wil-</i>	
<i>Akkeley</i>	345	<i>der</i>	317
<i>Akker, Distel</i>	490, 511	-- <i>Dorn</i>	148
<i>Mohn</i>	338	-- <i>Stech</i>	148
<i>Münze</i>	375	<i>Apostemkraut</i>	89
<i>Ruhrkraut</i>	561	<i>Attich</i>	205
<i>Senf</i>	434	<i>Augentrost</i>	396
<i>Stein Saamen</i>	118	-- <i>brauner</i>	317
<i>Straußgrass</i>	46	<i>Auge-Ochsen</i>	553
<i>Tresp</i>	73	-- <i>Rinds</i>	553
<i>Winde</i>	135		
<i>Zwiebel</i>	218	<i>B.</i>	
-- <i>kleine</i>	217	<i>Baarendreck</i>	325
		<i>Bachbungen</i>	9

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Distel, Milch</i>	491	<i>Egelkraut</i>	133
-- <i>Sau</i>	511	<i>Ehmkenstruuck</i>	641
-- <i>Sood</i>	518	<i>Ehrenpreis</i>	7
-- <i>Sumpf</i>	515	<i>Eibenthalz</i>	642
-- <i>Weg</i>	513	<i>Eiche</i>	610
<i>Doofradel</i>	395	<i>Eichen Schwamm</i>	799
<i>Dollkraut</i>	149	<i>Einblat</i>	224
<i>Dorn Apfel</i>	148	<i>Beer</i>	260
-- <i>Hage</i>	313	<i>Eisenhart</i>	23
-- <i>Schleen</i>	311	<i>Hütlein</i>	345
-- <i>See</i>	632	<i>Kraut</i>	23
-- <i>Wege</i>	152	<i>Eiternesel</i>	605
<i>Dosten</i>	390	<i>Elbweiden</i>	617, 20
-- <i>Wirbel</i>	389	<i>Eller</i>	604
-- <i>Wasser</i>	521	<i>Elzbeer</i>	312
<i>Dotterblume</i>	369, 494	<i>Engelsfüs</i>	667
<i>Drat Schmielen</i>	54	<i>Entenflott</i>	583
<i>Drespel</i>	72	<i>Enzian, Feld</i>	178
<i>Dreyblat</i>	128	-- <i>Herbst</i>	176
-- <i>Wasser</i>	128	<i>Epheu</i>	160
<i>Dulbillerkraut</i>	149	<i>Eppich, Wasser</i>	202
<i>Dungras, Sumpf</i>	35	<i>Erdbeerbraut</i>	327
-- <i>Wiesen</i>	36	<i>ErdGalle</i>	19
<i>Dürwurz</i>	531	<i>Rauch</i>	452
<i>Duwok</i>	654	<i>Espen</i>	636
<i>Dwelk</i>	82		<i>F.</i>
	<i>E.</i>		
<i>Eberwurz gemein</i>	18	<i>Fahr</i>	664
		-- <i>Iohannis</i>	662
		<i>Fahren, Rein</i>	522
		<i>Fackel-</i>	

II. INDEX.

No.		No.
<i>Fackelkraut</i>	146	<i>Frosch Læffel-</i>
<i>Færber Pfriemen</i>	455	<i>kraut</i>
<i>Farrenkraut</i>	669	<i>Biss</i>
<i>Fasamenkraut</i>	458	<i>Frühjahrs Stern-</i>
<i>Faul Aeschen</i>	636	<i>blume</i>
<i>Baum</i>	153, 303	
<i>Feder Nelken</i>	278	<i>Fuchs Riedgras</i>
<i>Feigwarzen-</i>		<i>Schwanz</i>
<i>kraut</i>	357	<i>-- Knoten</i>
<i>Feld Enzian</i>	178	
<i>Kümmel</i>	391	-- <i>Wiesen</i>
<i>Wermuth</i>	523	
<i>Fette Henne</i>	283	<i>Fus, Hænen</i>
<i>Fett Kraut</i>	20	
<i>- Gras</i>	241	-- <i>Kräben</i>
<i>Feuer Schwamm</i>	802	-- <i>Læwen</i>
<i>Fichte</i>	614	-- <i>seiden Hab-</i>
<i>Fladdergras,</i>		<i>nen</i>
<i>Strausfigtes</i>	45	
<i>Flachs Seide</i>	107	-- <i>Vogel</i>
<i>Fleeder, Goos</i>	204	
<i>Fliederbaum</i>	206	-- <i>weisser Hab-</i>
<i>Schwamm</i>	766	<i>nen</i>
<i>Flæhkraut</i>	257	
<i>Flokblumen</i>	558	-- <i>Ziegen</i>
<i>Flockenkraut</i>	558	
<i>Flugsandgras</i>	84	<i>Fünffingerkraut</i>
<i>Fœnich, Wiesen</i>	41	
<i>Frauen Haar</i>	107	-- <i>klein</i>
<i>Freyksamkraut</i>	566	-- <i>weis</i>
		<i>G.</i>
		<i>Gænse Blümchen</i>
		-- <i>Pappeln</i>
		-- <i>rich</i>
		<i>Garaffel</i>
		<i>Gauch-</i>

II. INDIX.

	No.	No.
Gauchheil	134	<i>Gras, hangendes</i>
-- Waffer	10	<i>Schæn</i>
Geisbart	319	-- <i>haariges</i>
Gelkkraut	419	<i>Kræten</i>
Gerste, Mause	85	-- <i>Kræt</i>
Gichtbeer	157	-- <i>Knopfkræten</i>
<i>Baum</i>	157	226
<i>Rübe</i>	616	-- <i>kriechendes</i>
Glanz, Fænichartiger	38	<i>Kræten</i>
-- Rohrartiger	39	-- <i>Queck</i>
Glaskraut	645	-- <i>Wiesenkræten</i>
Gliederkroeten-gras	224	-- <i>Zitter</i>
Glæcklein	137	-- <i>wollichtes</i>
Glocken-Blumen	139	<i>Darr</i>
-- Zaun	136	-- <i>Wege</i>
Glæsen	455	Grindwurz
Goldblumen	359	-- <i>krause</i>
<i>Nessel</i>	382	-- <i>Strand</i>
<i>Ruthe</i>	538	-- <i>Wasser</i>
Goos Fleeder	204	Grundheil
Gottes Gnaden-kraut	19	<i>Gukgusblumen</i>
Gras, Buschkraeten	227	<i>Kohl</i>
-- <i>Fett</i>	241	Gulden Günsel
-- <i>Flugsand</i>	84	<i>kriechender</i>
-- <i>gefiedertes</i>		<i>Milzkraut</i>
<i>Kamm</i>	66	Wagmeister
-- <i>Glicderkræten</i>	229	633
		<i>Gundelreben</i>
		<i>Gundermann</i>
		<i>Gürtelkraut</i>
		<i>Guter Heinrich</i>
		<i>H.</i>

U. INDEX.

<i>H.</i>	No.	No.
<i>Haar-Frauen</i>	107	<i>Hederich</i> 436
<i>Kraut</i>	367	<i>Heidelbeeren</i> 250
<i>Strausgras</i>	50	<i>Heidenkraut</i> 253, 254
<i>Haasengeil</i>	454	<i>Korn, wild</i> 259
<i>Kohl</i>	290, 491	<i>Nelken</i> 277
<i>Pfötgen</i>	478	<i>Heinrich, guter</i> 164
<i>Pæppeln</i>	449	<i>— stolzer</i> 164
<i>Poten</i>	209	<i>Hecken Nessel,</i>
<i>Riedgrass</i>	591	<i>taube</i> 384
<i>Habichtskraut</i>	502	<i>Helmkraut</i> 393
<i>Hafer-Wiesen</i>	77	<i>Henne, fette</i> 288
<i>-- wilder</i>	76	<i>Herbstdistel</i> 516
<i>Hagebuche</i>	612	<i>Enzian</i> 176
<i>Dorn</i>	313	<i>Sternblume</i> 4
<i>Hahnenfuss</i>	362	<i>Herzgespann</i> 388
<i>-- seiden</i>	365	<i>Hexenkraut</i> 6
<i>-- Wasser</i>	360	<i>Hindbeeren</i> 323
<i>-- weisser</i>	367	<i>läufte</i> 508
<i>Hahnenkam</i>	395, 472	<i>Hindschkraut</i> 150
<i>Kopf</i>	472	<i>Hiortron</i> 830
<i>Hanbutten-</i>		<i>Hirschholder</i> 204
<i>stræuche</i>	321	<i>Hirse Grass, gra-</i>
<i>Händleininkraut</i>	17	<i>nichtes</i> 40
<i>Hanf</i>	633	<i>Meer</i> 117
<i>Harnkraut</i>	163, 406	<i>Riedgrass</i> 597
<i>Hartkopf</i>	557	<i>-- Stein</i> 117
<i>Riegel</i>	5	<i>Hirzwurz, weisse</i> 187
<i>Haselstaude</i>	613	<i>Hohlbeeren</i> 323
<i>Hauhechel</i>	456	<i>wurz</i> 451
<i>Hauslauch</i>	307	<i>Hollunder</i> 206
		<i>Holrik Aeppel</i> 317
		<i>Hölnik</i>

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Höltik Beeren</i>	316	-- <i>wilde</i>	551
<i>Honigthau</i>	824	<i>Kamngräss</i>	
<i>Hopfen Klee</i> 480, 483	483	-- <i>gefiedertes</i>	66
-- <i>wilder</i>	634	<i>Kattenkees</i>	448
<i>Huder</i>	376	<i>Katzenmünze</i>	373
<i>Huflättich</i>	533	<i>Pfætgen</i>	528
<i>Hülßen Busch</i>	108	<i>Klee</i>	478
<i>Hundsblume</i>	552	<i>Kerze, Koenigs</i>	146
<i>Petersilie</i>	195	-- <i>Weg</i>	147
<i>Till</i>	552	<i>Kirschen</i>	309
<i>Violen</i>	565	-- <i>Vægel</i>	308, 310
<i>Zunge</i>	120	<i>Klapperrosen</i>	340
<i>Hühnerbiss</i>	207	<i>Klebkraut</i>	98
<i>Darm</i>	207	<i>Klebrich</i>	98
<i>Hungerblümchen</i> 410		<i>Klee, Bieber</i>	128
		-- <i>gelber Scho-</i>	
		ten	482
		-- <i>Hopfen</i>	480, 483
<i>Jacobskraut</i>	536	-- <i>Katzen</i>	478
<i>Ibenholt</i>	642	-- <i>Sauer</i>	290
<i>Je länger je lieber</i>	150	-- <i>Stein</i>	474
<i>Johannisbeer</i>	155	-- <i>Sumpf</i>	128
-- <i>Blume</i>	546	-- <i>Wiesen</i>	477
<i>Fahr</i>	662	<i>Klewer, Berg</i>	479
<i>Kraut</i> 273, 485		-- <i>gelber</i>	484
		-- <i>rother</i>	477
		-- <i>weisser</i>	476
		<i>Kletten Distel</i>	509
<i>Kalmuss</i>	225	<i>Knabenkräut</i>	569
<i>Kalwerkrop</i>	197	-- <i>breitblät-</i>	
-- <i>kleiner</i>	198	<i>rigtes</i>	572
<i>Kamellen</i>	550	<i>Knaben-</i>	

II. INDEX.

No.		No.	
Knabenkraut		Kraut, Bingel	639
-- geflecktes	573	-- Blut	104
Knaulgrass	65	-- Bocks	171
Knirk	641	-- Brück	163
Knoblauchskraut	428	-- Creuz	644
Knæterich	300	-- Doll	149
Knopfkræten- <i>grass</i>	226	-- Dulbiller	149
Knoten Fuchs		-- Edel-Leber	348
<i>Schwanz</i>	43	-- Egel	133
Knütgen	409	-- Eisen	23
Kohl-Buch	500	-- Erdbeer	327
<i>Distel</i>	517	-- Fackel	146
-- Gukguks	290	-- Farren	669
-- Haasen	290, 491	-- Fasanen	458
-- Rein	507	-- Feigwarzen	357
-- See	438	-- Fett	20
-- Strand	438	-- fleckiges	
		<i>Lungen.</i> A. 121	
Königskerze	146	-- fliessend	
Kornblume	556	<i>Saam</i>	109
Kærwel, wilder	200	-- Flæb	257
Korbweiden	627	-- Flocken	558
Kräbenfuss	362	-- Freysam	566
Kramsbeeren	252	-- Froeschlæffel	243
Kraut, Acker- <i>ruhr</i>	561	-- fünf Finger	331
-- Apostem	89	-- gelb Creuz	644
-- Baumlungen	739	-- Gelk	419
-- Benedicthen	333	-- Glas	645
-- Berggruhr	560	-- glatt Thurm	431
-- Biljen	149	-- Gottes Gna-	
		<i>den</i>	19
		Kraut	

II. INDEX.

Kraut	No.	Kraut	No.
-- <i>gülden Milz</i>	269	-- <i>rauch</i>	
-- <i>Gürtel</i>	674	Meyer	644
-- <i>Haar</i>	367	Thurm	432
-- <i>Habichts</i>	502	-- <i>Ruhr</i>	559
-- <i>Hændlein</i>	17	-- <i>Ruprechts</i>	442
-- <i>Harn</i>	163, 406	-- <i>Saam</i>	109
-- <i>Heiden</i>	253, 254	-- <i>Salz</i>	174
-- <i>Helm</i>	293	-- <i>Sau</i>	151
-- <i>Hexen</i>	6	-- <i>Scharten</i>	510
-- <i>Hindsch</i>	150	-- <i>Schell</i>	337
-- <i>Jacobs</i>	536	-- <i>Schlag</i>	126
-- <i>Iohannis</i>	273, 485	-- <i>Schwulst</i>	535
-- <i>klar Saam</i>	111	-- <i>See Saam</i>	113
-- <i>Kleb</i>	98	-- <i>Seifen</i>	274
-- <i>kleinfünf Finger</i>	330	-- <i>siebenFinger</i>	335
-- <i>klein Saam</i>	114	-- <i>Sophien</i>	424
-- <i>Knaben</i>	569	-- <i>Spring</i>	567
-- <i>Knoblauchs</i>	428	-- <i>St. Barben</i>	427
-- <i>krauss Saam</i>	112	-- <i>Sternleber</i>	93
-- <i>Lab</i>	96	-- <i>St. Roberts</i>	442
-- <i>Laus</i>	403, 404	-- <i>Tæschel</i>	414
-- <i>Lein</i>	406	-- <i>Tauben</i>	23
-- <i>Læffel</i>	415	-- <i>Tausendgül-</i>	
-- <i>Lungen B.</i>	121	<i>den</i>	177
-- <i>Meyen</i>	96	-- <i>Thurm</i>	431
-- <i>Milch</i>	161, 306	-- <i>Wegrubr</i>	530
-- <i>Mond</i>	661	-- <i>weiss fünf</i>	
-- <i>Mutter</i>	548	<i>Finger</i>	324
-- <i>Pfeil</i>	609	-- <i>weiss Meyen</i>	97
-- <i>Pfennig</i>	133	-- <i>Woll</i>	146
-- <i>Pfersing</i>	257	-- <i>Wuhl</i>	171
		Kraut	

II. INDEX.

Kraut	No.	No.
-- Wund	457	<i>Lauch, Haus</i> 307
Kratzbeeren	325	-- <i>Sand</i> 216
Kresse, Born	421	<i>Laus Kraut</i> 403, 404
-- Brunnen	421	<i>Leberkraut, Stern</i> 93
-- See	587	-- <i>Edel</i> 348
-- Stink	411	<i>Blumen, weisse</i> 208
-- Wiesen	420	<i>Leindotter</i> 408, 409
-- Winter	427	<i>Kraut</i> 406
Kroetengrass,		<i>Leopardenwurz</i> 358
-- Busch	227	<i>Lingon</i> 829
-- Glieder	229	<i>Lilien Convallien</i> 221
-- haariges	232	<i>Linde</i> 343
-- Knopf	226	<i>Linsen</i> 831
-- kriechendes	231	-- <i>Wasser</i> 583
-- Wiesen	233	<i>Loddik</i> 534
Kroeten Till	552	<i>Læffelkraut</i> 415
Kruut, Wrief	456	-- <i>Frosch</i> 243
Küchenschellen	349	<i>Løhn</i> 651
Küdik 433, 434, 435		<i>Læwenfuss</i> 106
Kuhblume	369	<i>Lülch, perenniren-</i>
Kümmel, Feld	391	<i>der</i> 82
-- Wiesen	200	-- <i>Taumel</i> 83
L.		
Labkraut	96	Lungenkraut B. 121
Læmmer Feld-		-- <i>Baum</i> 739
-- lattig	28	-- <i>fleckigtes</i>
Lattich, Huf	533	A. 121
Lattig, Læm-		<i>Lunggraf</i> 739
mer Feld	28	<i>Lünich</i> 9
		<i>Luusbeeren</i> 322
Q.		
M.		

II. INDEX.

<i>M.</i>	No.	<i>No.</i>
<i>Mangold, Wald</i>	267	<i>Milch Distel</i> 491
<i>Manna</i>	71	<i>Kraut</i> 161, 306
<i>Schwingel</i>	71	-- <i>Wolfs</i> 305, 306
<i>Mannes Treu</i>	179	<i>Milzkraut, gül-</i>
<i>-- gemein</i>	179	den 269
<i>MarienBlümchen</i>	945	<i>Mistel</i> 631
<i>Schu</i>	580	<i>Mohn, Acker</i> 338
<i>Marlblümchen</i>	545	-- <i>wilder</i> 339
<i>Mater</i>	548	<i>Mond, Kraut</i> 661
<i>Mauer Pfeffer</i>	289	-- <i>Raute</i> 661
<i>Raute</i>	666	<i>Moosbeeren</i> 252
<i>Mause Gerste</i>	85	<i>Mümmelken,</i>
<i>Ohr</i>	497	-- <i>geele</i> 341
<i>Schwanz</i>	214	-- <i>witte</i> 342
<i>May Blumen</i>	221	<i>Mundholz</i> 5
<i>Büche</i>	611	<i>Münze, Acker</i> 375
<i>Meer Hirse</i>	117	-- <i>Katzen</i> 372
<i>Rettich</i>	416	-- <i>Wasser</i> 374
<i>Meliloten</i>	474	<i>Murchel</i> 809
<i>Melthe, gelbe</i>	170	-- <i>Stein</i> 810
<i>-- grüne</i>	169	<i>Mutterkraut</i> 548
<i>-- rothe</i>	166	<i>Wurz</i> 544
<i>-- stinkende</i>	171	<i>Mütz un Huiwe</i> 345
<i>-- weisse</i>	168	
<i>-- wilde</i>	648	<i>N.</i>
<i>Merzviolen</i>	564	<i>Nacht Schatten</i> 151
<i>Meyenkraut</i>	96	<i>Nægenknee</i> 300
<i>-- rauch</i>	644	<i>Nattern Zunge</i> 660
<i>-- weiss</i>	97	<i>Nelken, Feder</i> 278
<i>Mibre</i>	207	-- <i>Heide</i> 277
		<i>Nelken</i>

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Nelken, Pech</i>	293	<i>Palmweiden</i>	626
<i>Nessel, blaue</i>		<i>Pappeln, Gænse</i>	418
<i>taube</i>	380	-- <i>Rosen</i>	450
-- <i>brenn</i>	606	-- <i>Koss</i>	449
-- <i>bunten taube</i>	381	-- <i>schwarze</i>	637
-- <i>Eiter</i>	605	-- <i>weisse</i>	635
-- <i>gelben taube</i>	382	<i>Parnassgras</i>	208
-- <i>Gold</i>	352	<i>Pastinak, Wasser</i>	191
-- <i>rothen taube</i>	378	-- <i>wilde</i>	199
-- <i>taube He-</i>		<i>Pech Nelken</i>	293
<i>cken</i>	384	<i>Pestilenzwurz</i>	534
-- <i>weissen taube</i>	377	<i>Peterlein, Bocks</i>	201
-- <i>Wald</i>	606	<i>Petersilie, Hunds</i>	195
<i>Nest, Vogel</i>	183, 575	-- <i>wilde</i>	195
<i>Nüssgen Sallat</i>	28	<i>Pfaffenröhrlein</i>	494
<i>O.</i>			
<i>Ochsen Auge</i>	553	<i>Pfeilkraut</i>	609
<i>Zunge</i>	119	<i>Pfennigkraut</i>	133
-- <i>blaue</i>	125	<i>Pfersingkraut</i>	257
-- <i>rothe</i>	119	<i>Pfifferling</i>	793
-- <i>wilde</i>	125	<i>Pinnholz</i>	153
<i>Odermenning</i>	303	<i>Pœppeln, Haasen</i>	449
<i>Oegschen, blaage</i>	348	<i>Pors</i>	264
-- <i>geele</i>	351	<i>Post</i>	264
-- <i>witte</i>	350	<i>Preusselbeeren</i>	829
<i>Orant, kleiner</i>	405	<i>Puttegnaden</i>	251
<i>Organ</i>	390		
<i>P.</i>			
<i>Palmen, Stech</i>	108	<i>Q.</i>	
		<i>Quækgrass</i>	86
		<i>Quæcken</i>	86
		<i>Quæck-</i>	
		<i>Quæcken</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
<u>Quæckweizen</u>	86	Riedgrass, Hirse	597
<u>Quendel</u>	391	-- kleines	588
<u>Quitschenbaum</u>	314	-- Raasen	599
		-- rauhes	602
		-- Sänd	589
		-- spitziges	600
		-- Sumpf	590, 596
		Rinds Auge	553
<u>Raasen Binsen</u>	31	Rittersporen	344
Riedgrass	599	Rohr Schilf	78
Schmielen	53	Rocken Tresp	72
<u>Radel</u>	291	Rosen, Klapper	340
-- Doof	395	Pappeln	450
-- schwarzer		-- Wasser	342
taub	398	-- wilde	320, 321
<u>Rapùnzel</u>	28	Ræsslein, Wei-	
<u>Rauhbeer</u>	158	derich	246
<u>Raute, Mauer</u>	666	Ross Pappeln	449
-- Mond	651	Rübe, Gicht	616
-- Wiesen	353	-- Zaun	616
<u>Rein Blumen</u>	527	Ruchgrass	25
Fahren	522	Ruhrkraut	559
Holz	5	-- Acker	561
Kohl	507	-- Berg	560
<u>Reischen</u>	792	-- Weg	530
<u>Rettich, Meer</u>	416	Ruprechtskraut	442
<u>Rhabarber, wilde</u>	237	Rüster	175
<u>Riedgrass, bla-</u>			
sigtes	601		
-- dünnnes	595		
-- Fuchs	592		
-- gelbes	594		
-- Haasen	591		
			S.
		Saame, Acker	
		Stein	118
		Saame,	

II. INDEX.

	No.	<i>Schierling,</i>	No.
<i>Saame, Stein</i>	117	-- ächter	194
<i>Saamkraut</i>	109	-- unächter	193
-- durchge-		-- Wasser	194
wachsenes	110	<i>Schilf, Berg</i>	79
-- fliessend	109	-- Rohr	78
-- klar	111	-- Sand	81
-- klein	114	<i>Schimmel</i>	823
-- krauss	112	<i>Schlagkraut</i>	126
-- See	113	<i>Schlangenzunge</i>	660
<i>Sallat, Nüssgen</i>	28	<i>Schleendorn</i>	311
<i>Salzkraut</i>	174	<i>Schlüsselblume</i>	125
<i>Sand Blume</i>	287	<i>Schmargeln</i>	156
<i>Lauch</i>	216	<i>Schmarten</i>	156
<i>Riedgräss</i>	589	<i>Schmielen, Berg</i>	55
<i>Schilf</i>	81	-- blaue	51
<i>Sannikey</i>	181	-- Drat	54
<i>Sau Distel</i>	511	-- graue	56
-- Kraut	151	-- Raasen	53
<i>Sauerampfer,</i>		-- Wasser	52
-- kleiner	240	<i>Schninkwurz</i>	124
-- wilder	239	<i>Schmirgel</i>	164
<i>Klee</i>	290	-- kleiner	170
<i>Scabiosen</i>	89	<i>Schœngrass,</i>	
<i>Schaafgarbe</i>	555	-- hangendes	57
<i>Schwingel</i>	67	<i>Schotenklee,</i>	
<i>Schaffruss</i>	659	-- gelber	482
<i>Schafthalm</i>	659	<i>Schuppenwurz</i>	419
<i>Heu</i>	659	<i>Schwalbenwurz</i>	162
<i>Schartenkraut</i>	510	<i>Schwamm, Baum</i>	800
<i>Schellkraut</i>	337	-- Eichen	799
<i>Schierling</i>	184	-- Feuer	802

II. I N D E X.

Schwamm,	No.	Senf,	No.
-- <i>Flieder</i>	766	-- <i>wilder</i>	435
-- <i>Weiden</i>	804	<i>Sieben Finger-</i>	
Schwarzwurz		<i>kraut</i>	335
	122, 336	<i>Silberweiden</i>	629
Schwertel	29	<i>Sinai</i>	106
-- <i>gelber</i>	29	<i>Sommer Viehgräss</i>	61
Schwingel, krie-		<i>Sonnen Thau</i>	212, 213
chender	69	<i>Sooddistel</i>	518
-- <i>Manna</i>	71	<i>Sophien Kräut</i>	424
-- <i>rother</i>	68	<i>Spargel, wilder</i>	220
-- <i>Schaaf</i>	67	<i>Speerberbaum</i>	314
-- <i>Wiesen</i>	70		-- <i>wilder</i>
Schwulstkraut	535	<i>Spillbaum</i>	154
Scordien	372	<i>Spindelbaum</i>	154
See Binsen	33	<i>Spricker</i>	153
Blumen	341	<i>Springkraut</i>	567
-- <i>weisse</i>	342	<i>Sprokweiden</i>	621
Dorn	632		-- <i>rothe</i>
Kohl	438	<i>Stabwurz</i>	526
Kresse	582	<i>Stachel</i>	366
Saamkraut	113	<i>Beeren</i>	159
Wegerich	102	<i>Stauderich</i>	172
Wermuth	524	<i>St. Barben Kraut</i>	427
Seide, Flachs	107	<i>Stech Apfel</i>	148
Seiden Hahnen-		<i>Palmen</i>	108
fuss	365	<i>Steinbrech, rother</i>	318
Seifenkraut	274	-- <i>Wasser</i>	192
Sellerie, wilder	202	-- <i>weisser</i>	210
Senf, Acker	434	<i>Stein Hirse</i>	117
-- <i>Bauren</i>	412, 413	<i>Klee</i>	474
-- <i>Wege</i>	426	<i>Murckel</i>	810
		<i>Stein</i>	

II. INDEX.

<i>Stein</i>	No.	<i>Sumpf</i>	No.
<i>Saamen</i>	117	<i>Distel</i>	515
-- <i>Acker</i>	118	<i>Dungrass</i>	35
<i>Sternblume</i>	283	<i>Klee</i>	128
-- <i>Frühjars</i>	3	<i>Riedgrass</i>	590, 596
-- <i>Herbst</i>	4	<i>Violen</i>	563
-- <i>Wald</i>	281	<i>Süssholz,</i>	
-- <i>Wasser</i>	537	-- <i>wild</i>	473, 667
<i>Sternleberkraut</i>	93		
<i>Stickelbeeren</i>	159		T.
<i>Stiefmütterchen</i>	566	<i>Tag und Nacht</i>	399
<i>Stinkkresse</i>	411	<i>Tanne</i>	615
<i>Stolzer Heinrich</i>	164	<i>Tæschelkraut</i>	414
<i>Storcheschnabel,</i>		<i>Taubenkraut</i>	23
-- <i>gemeiner</i>	439	<i>Taub Radel,</i>	
-- <i>rounder</i>	446	-- <i>schwarzer</i>	398
-- <i>Wald</i>	440	<i>Tausendgülden-</i>	
-- <i>weicher</i>	443	<i>kraut</i>	177
-- <i>Wiesen</i>	441	<i>Taxbaum</i>	642
<i>Strand Grind-</i>		<i>Teich Binsen</i>	32
<i>wurz</i>	236	<i>Kolben</i>	585
<i>Kohl</i>	438	<i>Teufels Abiss</i>	88
<i>Straußgrass,</i>		<i>Teutsch Bären-</i>	
-- <i>Acker</i>	46	<i>klau</i>	188
-- <i>braunes</i>	49	<i>Thurmkraut</i>	431
-- <i>Haar</i>	50	-- <i>glatt</i>	431
-- <i>Robrartiges</i>	47	-- <i>rauch</i>	432
-- <i>rothes</i>	48	<i>Till</i>	827
<i>St. Robertskraut</i>	442	-- <i>Hunds</i>	552
<i>Stroh, Wald</i>	95	-- <i>Kræten</i>	552
<i>Sumpf Beeren</i>	252	<i>T tormentillwur-</i>	
<i>Binsen</i>	30	<i>zel</i>	332
		<i>Traube,</i>	

II. INDEX.

	No.		W.		No.
Traube, Bären	266				
Trempsen	556	Wacholder-			
Tresp	72		<i>strauch</i>	641	
-- Acker	73		Wald Binsen	34	
-- hober	75		Mangoldt	267	
-- Rocken	72		Meister	93	
			-- <i>gûlden</i>	644	
U.			Nessel	606	
Ulinbaum	175		Sternblume	281	
Unser Frauen			Storchenschna-		
Bettstroh	96		bel	440	
			Stroh	96	
V.			Viehgrass	62	
Vergiss mein			Weiderich	132	
nicht	116		Winde	144	
Viehgras, Berg	62		Wallwurz	122	
-- dreyblütiges	59		Warzenkraut,		
-- fünfblütiges	60		-- <i>Feig</i>	357	
-- Sommer	61		Wasser Aloe	347	
-- Wald	63		Ändorn	24	
-- Wasser	58		Dosten	521	
Violen, Hunds	565		Dreyblatt	128	
-- Merz	564		Eppich	202	
-- Sumpf	563		Gauchheil	10	
-- Wasser	129, 247		Grindwurz	238	
Vogel Beeren	314		Hahnenfuß	360	
Füß	471		Linsen	583	
Kirschen	308, 310		Münze	374	
Nest	183, 575		Pastinak	191	
Zunge	259		Pfeffer	256	
			Rosén	342	
			Wasser		

II. INDEX.

<i>Waffer</i>	No.	<i>Weiden,</i>	No.
<i>Schierling</i>	194	-- <i>Silber</i>	629
<i>Schmielen</i>	52	-- <i>Sprok</i>	621
<i>Strinbrech</i>	192	-- <i>weisse</i>	629
<i>Steinblumen</i>	537	-- <i>Zeh</i>	619, 629
<i>Viehgrass</i>	58	<i>Weiderich,</i>	
<i>Viole</i>	129, 247	-- <i>brauner</i>	302
<i>Wegerich</i>	243	-- <i>gelber</i>	130
<i>Weiderich</i>	131	<i>Rößlein</i>	246
<i>Wau</i>	304	-- <i>Wald</i>	132
<i>Weedwinde</i>	135	-- <i>Waffer</i>	131
<i>Wege Blatt</i>	99	<i>Weitzen, Quæk</i>	86
<i>Distel</i>	513	<i>Wermuth</i>	525
<i>Dörn</i>	152	-- <i>Feld</i>	523
<i>Grass</i>	258	-- <i>See</i>	524
<i>Kerze</i>	147	<i>Weyer Blätter</i>	109
<i>Wegerich</i>	99	<i>Wie</i>	461
-- <i>kleiner</i>	100	<i>Wiede</i>	304
-- <i>schmaler</i>	101	<i>Wicderthon,</i>	
-- <i>See</i>	102	-- <i>guldener</i>	665
-- <i>Waffer</i>	243	<i>Tod</i>	665
<i>Wege Ruhrkraut</i>	530	<i>Wiesen Blume</i>	369
<i>Senf</i>	426	<i>Dunnggrass</i>	36
<i>Tritt</i>	258	<i>Fœnich</i>	41
<i>wart</i>	508	<i>Fuchs Schwanz</i>	42
<i>Weiden, Aemts</i>	627	<i>Hafer</i>	77
-- <i>Bruch</i>	624	<i>Klee</i>	477
-- <i>Elb</i>	617, 620	<i>Knæpfe</i>	104
<i>Korb</i>	627	<i>Kresse</i>	420
-- <i>Palm</i>	626	<i>Kräetengrass</i>	233
-- <i>rothe Sprok</i>	622	<i>Kümmel</i>	200
<i>Schwamm</i>	804	<i>Raute</i>	353

II. INDEX.

Wiesen,	No.	Z.	No.
Schwingel	70	Zahnwurz	402, 419
Storchen Schnabel	441	Zæbweiden	619, 629
Zittergräss	64	Zaun Glocken	136
Wirbeldost	389	Reiss	98, 123
Wikken	467	Rübe	616
-- Zaun	468	Wicken	468
Winde, Acker	135	Winde	136
-- kleine	135	Zeefsenbraan	374
-- Wald	144	Ziegenfuss	203
-- Weed	135	Zittergräss,	
-- Zaun	136	-- Wiesen	64
Wintergrün	160	Zunge, blaue	
Kresse	427	Ochsen	125
Woker Blume	547	-- Hunds	120
Wolfs Beer	260	-- Nattern	660
Klauen	674	-- Ochsen	119
Milch	305, 306	-- rothe Ochsen	119
Wurz	358	-- Schlangen	660
Wolgemuth	390	-- Vogel	259
Woll Grass	36	-- wilde	
Kraut	146	Ochsen	125
Wollverley	544	Zwey Blatt	576
Wrief kruut	456	Zahn	519
Wuhlkraut	171	Zwiebel, Acker	218
Wundkraut	457	-- klein Acker	219





III. INDEX.

NOMINUM PHARMACEUTICORUM

	No.		No.
A.			
Abies	615	Apium	202
Absinthium vul-		Aquilegia	346
gare	525	Aristolochia faba-	
Acacia nostras	311	cea	451
Acetosa nostras	239	Armoracia	416
Acetosella	290	Arnica	544
Acorus palustris	29	Artemisia rubra,	
Adianthum au-		alba	526
reum	679	Asparagus	220
Agrimonia	303	Atriplex sylve-	
Alchemilla	106	stris	166
Alliaria	428	Auricula Iudæ	766
Anethum	827	muris	497
Angelica sativa	189		
sylvestris	190	B.	
Anserina	328	Barba Hirci	488
		Bardana	509
		Becca-	

III. INDEX.

	No.		No.
Beccabunga	9	stra s	550
Bellis minor	545	Chelidonium ma-	
<i>pratensis</i>	546	<i>jus</i>	337
Berberis	234	<i>minus</i>	357
Betonica	383	Cichoreum	508
Betula	603	Cicuta	184, 194
Bonus Henricus	164	Cicutaria	197
Bryonia	616	Cochlearia	415
Buglossa	119	Consolida major	122
Bursa pastoris	414	<i>media</i>	370
		<i>regalis</i>	344
C.		Corylus	613
Calamus vulga-		Crepitus lupi	818
<i>ris</i>	225	Cuscuta	107
Cannabis	633	Cyanus	556
Cardiaca	388	Cynoglossa	120
Caryophyllata	333		
Carvi	200	D.	
Centaurium mi-		Daucus sylve-	
<i>nus</i>	177	<i>stris</i>	183
Centumnodia	258	Dulcamara	150
Cerasa rubra	309		
<i>nigra</i>	310	E.	
Chamæmorus	830	Ebulus	205
Chamomilla no-		Enula	

III. INDEX.

	No.		No.
Enula	539	Gramen	86
Epithymum	107	Gratiola	19
Erysimum	426		
Eupatorium	521		
Euphrasia	396		
		H.	
		Hedera arborea	160
		terrestris	376
		Hepatica alba	208
Fagus	611	nobilis	348
Farfara	533	Herniaria	163
Filix	669	Hirundinaria	162
Fragaria	327	Hyoscyamus	149
Frangula	153	Hypericum	485
Fraxinus	653		
Fumaria	452		
Fungus sambuci-			
nus	766	Iuniperus	641
		I.	
		G.	
Galium luteum	96	Lamium album	377
Genista	455	Lapathum acu-	
Gentiana alba	187	tum	237
Geranium rober-		Lens	831
tianum	442	Lilium convale-	
Gnaphalium	528	rium	221
		L.	
		Linaria	

III. INDEX.

	No.		No.
<i>Linaria</i>	406	N.	
<i>Linum catharticum</i>	210	<i>Nasturtium aquatica</i>	
<i>Lithospermum</i>	117	<i>ticum</i>	421
<i>Lupulus</i>	634	<i>Nepeta</i>	373
<i>Lycopodium</i>	674	<i>Nummularia</i>	133
		<i>Nymphaea alba</i>	342
		O.	
M.			
<i>Malva vulgaris</i>	448	<i>Ononis</i>	456
<i>Marrubium al- bum</i>	387	<i>Origanum vul-</i>	
<i>Matricaria</i>	548	<i>gare</i>	390
<i>Matrisylvia</i>	93		
<i>Melilotus</i>	474	P.	
<i>Mercurialis</i>	639		
<i>Millefolium</i>	555	<i>Parietaria</i>	645
<i>Morus Diaboli</i>	88	<i>Pastinaca</i>	199
<i>Muscus arbo- reus</i>	757	<i>Pedicularis aqua-</i>	
<i>caninus</i>	748	<i>tica</i>	403
<i>cumatilis</i>	747	<i>Pentaphyllum</i>	331
<i>clavatus</i>	674	<i>Perficaria</i>	256
<i>erectus</i>	675	<i>Petasites</i>	534
<i>pyxidatus</i>	749	<i>Pimpinella no-</i>	
<i>Myrtillus</i>	250	<i>stras</i>	201
		<i>Italica</i>	104
		<i>Pinus</i>	

I. INDEX.

	No.		No.
<i>Pinus</i>	614	<i>Ros folis</i>	212
<i>Plantago latifolia</i>	99	<i>Rubus idæus</i>	323
<i>Polypodium</i>	667	<i>Ruta muraria</i>	666
<i>Populus</i>	637		
<i>Primula veris</i>	126		S.
<i>Prunella</i>	394		
<i>Ptarmica</i>	554	<i>Sal Alcali</i>	1
<i>Pulmonaria maculosa</i>	121	<i>Sambucus</i>	206
<i>arborea</i>	739	<i>Sanicula</i>	181
<i>Pulsatilla</i>	349	<i>Saponaria</i>	274
<i>Pyrola</i>	267	<i>Saxifraga alba</i>	270
		<i>rubra</i>	318
		<i>Scabiosa</i>	89
Q.		<i>Scrophularia</i>	407
		<i>Scordium</i>	372
<i>Quercus</i>	610	<i>Sedum minus</i>	289
		<i>Sempervivum</i>	
		<i>majus</i>	307
R.		<i>Serpyllum</i>	391
<i>Ranunculus albus</i>	350	<i>Sigillum Salomonis</i>	
<i>Rhocas</i>	349		222
<i>Ribia</i>	155	<i>Sinapi</i>	435
<i>nigra</i>	157	<i>Solanum</i>	151
<i>Rosa sylvestris</i>	321	<i>Sophia</i>	424
<i>Rosmarinus sylvestris</i>	264	<i>Sorbus aucuparia</i>	
			314
		<i>Soda</i>	

III. INDEX.

	No.		No.
Soda	1	Urtica major	666
Spina Cervina	152	Uva Ursi	266
Stoechas citrina	527		
		V.	
		Valeriana	27
Tanacetum	522	Verbascum	
Taraxacum	494	(Folia)	146
Telephium	288	(Radix, Flores)	147
Thlaspi	412	Verbena	23
Tilia	343	Veronica	7
Tormentilla	332	Viola	564
Trifolium al-		Violaria	564
bum	476	Virga aurea	538
aquaticum	128	Viiscum	631
Tussilago	533	Vitis idaea	829
		Vulvaria	171

U.

Ulmaria	319
Ulmus	175

X.

Xanthium	607
----------	-----

SAMVELIS GVSTAVI
WILCKE

PHIL. DOCT. S. S. THEOL. BACCAL.

V. D. M. HORTI GRYPH. FRAEF. PAST.

ALTENKIRCH. VOCAT.

FLORA *1777...*
GRYPHICA.



EXHIBENS

PLANTAS

CIRCA GRYPHIAM INTRA MILLIARE
SPONTE NASCENTES

VNA CVM

NOMINIBVS ET LOCIS NATALIBVS.



GRYPHIAE

IMPENSIS ACADEMICIS LITTERIS RÖSIANIS.

A. MDCC LXV.

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

190 1142

PRO - RECTORI
MAGNIFICO

ET


SENATVI ACADEMICO

S A C R V M.

Л. А. ТОЛСОТЯ

СИБИРЬЮ

ОБЩЕСТВО АУГАЙД



PRAEFATIO.

Quum ante biennium **GRYPHIAM** venirem, et **BOTANICAM** abieclam iacere perspicereim, et hortum botanicum desiderari viderem, et cultores rei herbariae deesse intelligerem, et regionem plantis rarioribus scatere, et neminem unquam plantas circa **GRYPHIAM** sponte nascentes collegisse et descripsisse comperirem, tanto statim maiori studio in **BOTANICAM** incumbere decreui, quanto largiorem haec omnia messem promittebant. Itaque primum in regiones propinquas solus excurrere, omnia transpicere, et, quae obuia veniebant, legere; mox adscitis sociis, collectisque auditoribus, prata, sylvas, et litora perquirere et plantas demonstrare; tan-

dem collecta omnia in ordinem redigere,
suisque nominibus consignare coepi.

Initium hoc huius libelli erat; aliud vero tunc propositum in eius compositione et editione. Nondum enim properandum censebam, persuasus, vno alteroue anno hac in re nihil perfecti a me praestari posse, variis negotiis admodum distracto. Neque enim omnia loca adire et perscrutari, aut quae visitaueram, sat studiose perlustrare, aut, quas reperieram, plantas, ex voto obseruare mihi licuerat. At mutauit sententiam mei status mutatio. Praestabat nunc aliquid, quam nihil, actum relinquere, praestabat incompletam GRYPHIAE FLORAM edere, quam, quae expiscatus eram, tacere, et quae detexeram, obliuioni dare, quoniam nihil hac in re antea erat scriptum. Omne autem principium graue, nec graue solum, sed etiam imperfectum est. Quare hoc TENTAMENTUM imperfectum licet, facile approbationem inueniet.

Namque

Namque defectus, quos habet, tanti non sunt; quin sperare liceat, fore ut ciuibus accepta sit, quam in eo conscribendo operam posui. Deficiunt synonyma; sed quid opus est synonymis; quando definitiones satis clarae et certae adfunt? Sunt autem, quas adtuli, Linneanae, reliquis omnibus longe praestantiores. Et qui vel SPECIES PLANTARVM, vel FLORAM saltem SVECICAM EQVITIS DE LINNE' euoluit, reperta ibi definitio-
ne, aut NOMINE TRIVIALI, synonyma ci-
tationesque sufficientes deprehendit. Defi-
ciunt etiam descriptiones; verum neque has multum desiderabit, BIBLIOTHECA BOTANICA ornatus. Adeat LINNEVM, adeat HALLERVM, aliosue systematicos, qui descrip-
tione plantam certo cognoscere cupit. Defunt usus, tam arctis enim limitibus ni-
hil perfecti narrari, et tam angusto tempore vix aliquid noui obseruari potest. Evidem
quarundam plantarum usum oeconomum, ru-
sticum, medicumque addere valuisse, si adferre licuisset, quae subinde ab agricolis,

rusticis et aliis audiui, quibus si vel fidem habuisssem, tamen copiose describere eorum narrationes instituti ratio prohibebat. De sunt variae plantae, quae G R Y P H I A E sponte proueniunt: at incertae hae, nec certis adeo miscendae.

Quandoquidem igitur hi defectus, huius enumerationis stirpium gryphicarum usum non tollunt, prospere ei accidet, si BOTANICIS eodem pretio habeatur, quo aliae toties laudatae FLORAE. Fateor parum in ea noui contineri; at non perspicio, qui hoc eius utilitati officere possit. Quanti enim sit, loci cuiusuis plantas scire, vel ex eo patet, quod sumini viri patriam suam maximo semper studio perquisuerint, eorumque opera magnis laudibus celebrata, et a magnatibus proceribusque excitata et remunerata sit. Atque hoc fuit initium perficienda et absolvenda rei herbariae. Nam iis regionibus haec scientia optime viget, quibus cuiusvis vrbis regni vegetabilis ciues cognoscuntur

et

et studio descripti leguntur; id quod SVE-
CIAE exemplo probari potest.

Ad diuulgandam cognitionem plantarum
utilissimam multum procul dubio confert lo-
ci determinati FLORA. Sunt enim, qui eam
negligunt, propterea quod innumeram
plantarum copiam ubique reperiri credunt.
Et quis est, qui artem tam difficultem et lon-
gam discere velit? Hoc praeiudicium opti-
me obigit FLORA, GRYPHIAE GRYPHICA.

Eandem ob caussam NOMINA GERMANICA
adscripsi, quotquot certa et bona conquire-
re potui. Facilius enim a plerisque memo-
riae mandantur, quae germano idiomate,
quam quae romano traduntur. Quo ipso
tamen vagae verborum significationi, cui
studui, omnino mederi non potui, errorum
magnae scaturigini. MEDICINAE autem
STUDIOSIS gratum futurum esse putavi, NO-
MINA PHARMACEVTICA vna cum illis legere,
quo de nominum systematicorum praef-
stantia melius persuadeantur, magisque

posthac MATERIAM MEDICAM principiis san-
nis addiscere allaborent.

LOCA NATALIA, quantum fieri potuit,
certissima indicaui, quoniam ingens com-
modum inde pronascitur. Iis enim cogni-
tis plantae variae facilius inueniri, quin
cognosci possunt, et ante portas quasi colli-
gi, quae nunc ab exteris regionibus haud
paruo pretio adscisci debent.

Reputata autem apud me plantarum gry-
phicarum copia, hanc conclusionem facio,
operae premium esse, GRYPHIAE BOTANI-
CAE operam nauare. Namque hic praeci-
puae tanta soli variatio est, quanta vix alio
loco. En vero miram naturae invitationem
ad hanc scientiam, tam utilem, quam iu-
cundam: prata, arua, campi, loca depresso
et inundata, stagna, paludes, riuuli, ma-
ria, littora, ericeta, deserta, sepes, arbu-
sta, syluae, luci, colles, reliqua. Quis
varietate ista non excitetur ad perquirenda
haec loca, innumeris, ut videtur, planta-
rum generibus adeo conferta, ut sedulo na-

turae scrutatori semper aliquid noui sperandum sit? Igitur spero aliquando, exstituros esse, qui FLORAE GRYPHICAE exaugendae et perficiendae studeant, et quos defectus ego admittere coactus fui, suppleant, quaeque GRYPHIAE seruatur rerum naturalium vberitas in sui atque ACADEMIAE GRYPHICAE, a me exoptatam, laudem atque honorem describant, et cum orbe eruditorum communicent. Id ut breui fiat opto et vroueo. Dabam Gryphiae e Musaeo botanico. Die XX. Decembris MDCCCLXIV.

ORDO GENERVM.		
CLASSIS I.		Gramina.
MONANDRIA.		13 Scirpus 24
1. <i>Monogynia.</i>		14 Eriophorum 29
1 Hippuris	1	
2. <i>Digynia.</i>		
2 Callitricha	2	15 Phalaris 31
		16 Panicum 32
		17 Phleum 33
		18 Alopecurus 34
		19 Milium 37
		20 Agrostis 38
		21 Aira 42
		22 Melica 45
3 Ligustrum	4	23 Poa 46
4 Circaeа	5	24 Briza 52
5 Veronica	6	25 Dactylis 53
6 Pinguicula	15	26 Cynosurus 54
7 Vtricularia	16	27 Festuca 55
8 Verbena	17	28 Bromus 60
9 Lycopus	18	29 Avena 63
2. <i>Digynia.</i>		30 Arundo 65
10 Anthoxanthum	19	31 Lolium 67
		32 Elymus 69
		33 Hordeum 70
		34 Triticum 71
		<i>Trigynia.</i>
11 Valeriana	20	35 Holosteum 72
12 Iris	23	

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

1. Monogynia.

36 Scabiosa	73	55 Echium	105
37 Sherardia	76	56 Primula	106
38 Asperula	77	57 Menyanthes	107
39 Galium	78	58 Hottonia	108
40 Plantago	83	59 Lysimachia	109
41 Sanguisorba	87	60 Anagallis	112
42 Cornus	88	61 Convolvulus	113
43 Alchemilla	89	62 Campanula	115

2. Digynia.

44 Cuscuta	90
------------	----

3. Tetragynia.

45 Ilex	91
46 Potamogeton	92
47 Sagina	96

2. Digynia.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

1. Monogynia.

48 Myosotis	97
49 Lithospermum	98
50 Anchusa	100
51 Cynoglossum	101
52 Pulmonaria	102
53 Symphytum	103
54 Lycopus	104

Vmbellatae.

73 Asclepias	132
74 Herniaria	133
75 Chenopodium	134
76 Salsola	141
77 Vlimus	142
78 Gentiana	143

79 Eryngium	146
80 Hydrocotyle	147
81 Sanicula	148

82	Tordylium	149
83	Daucus	150
84	Conium	151
85	Selinum	152
86	Laserpitium	153
87	Heracleum	154
88	Angelica	155
89	Sium	156
90	Oenanthe	157
91	Phellandrium	158
92	Cicuta	159
93	Aethusa	160
94	Chaerophyllum	161
95	Pastinaca	163
96	Carum	164
97	Pimpinella	165
98	Aegopodium	166

3. *Trigynia.*

99	Viburnum	167
100	Sambucus	168
101	Alfine	170

4. *Tetragynia.*

102	Parnassia	171
-----	-----------	-----

5. *Pentagynia.*

103	Statice	172
104	Linum	173
105	Drosera	174

6. *Polygynia.*

106	Myosurus	176
-----	----------	-----

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

1. *Monogynia.*

107	Allium	177
108	Ornithogalum	178
109	Asparagus	180
110	Conuallaria	181
111	Acorus	185
112	Iuncus	186
113	Rumex	193
114	Triglochin	189
115	Alisma	200

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

116	Trientalis	202
-----	------------	-----

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Monogynia.

117	Epilobium	203
118	Vaccinium	205
119	Erica	208

Trigynia.

<i>Trigynia.</i>	135	Arenaria	234
120 Polygonum	1210	136 Sedum	238
<i>Tetragynia.</i>		137 Oxalis	240
121 Paris	215	138 Agrostema	241
122 Adoxa	216	139 Lychnis	242
		140 Cerastium	244
		141 Spergula	247

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Hexagynia.

123 Butoinus	217
--------------	-----

CLASSIS X.

DECANDRIA.

Monogynia.

124 Monotropa	218
125 Ledum	219
126 Andromeda	220
127 Arbutus	221
128 Pyrola	222

Digynia.

129 Chrysosplenium	
	224
130 Saxifraga	225
131 Scleranthus	227
132 Dianthus	229

Trigynia.

133 Cucubalus	231
134 Stellaria	232

135 Arenaria	234
136 Sedum	238
137 Oxalis	240
138 Agrostema	241
139 Lychnis	242
140 Cerastium	244
141 Spergula	247

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Monogynia.

142 Lythrum	249
-------------	-----

Digynia.

143 Agrimonia	250
---------------	-----

Trigynia.

144 Euphorbia	251
---------------	-----

Dodecagynia.

145 Semperiuuum	253
-----------------	-----

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

Monogynia.

146 Prunus	254
------------	-----

Digynia.

147 Crataegus	258
---------------	-----

Trigynia.

148 Sorbus	259
------------	-----

Pen.

	<i>Pentagynia.</i>
149	<i>Mespilus</i> 260
150	<i>Pyrus</i> 261
151	<i>Spiraea</i> 263

Polygynia.

152	<i>Rosa</i> 264
153	<i>Rubus</i> 266
154	<i>Fragaria</i> 270
155	<i>Potentilla</i> 271
156	<i>Tomentilla</i> 275
157	<i>Geum</i> 276
158	<i>Comarum</i> 278

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

Monogynia.

159	<i>Chelidonium</i> 279
160	<i>Papauer</i> 280
161	<i>Nymphaea</i> 283
162	<i>Tilia</i> 285

Trigynia.

163	<i>Delphinium</i> 286
164	<i>Aconitum</i> 287

Hexagynia.

165	<i>Stratiotes</i> 288
-----	-----------------------

Polygynia.

166	<i>Anemone</i> 289
167	<i>Thalictrum</i> 292
168	<i>Ranunculus</i> 293
169	<i>Caltha</i> 297

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

170	<i>Aiuga</i> 308
171	<i>Nepeta</i> 310
172	<i>Betonica</i> 311
173	<i>Mentha</i> 312
174	<i>Glechoma</i> 314
175	<i>Lamium</i> 315
176	<i>Galeopsis</i> 318
177	<i>Stachys</i> 321
178	<i>Ballota</i> 323
179	<i>Marrubium</i> 324
180	<i>Leonurus</i> 325
181	<i>Clinopodium</i> 326
182	<i>Origanum</i> 327
183	<i>Thymus</i> 328
184	<i>Scutellaria</i> 330
185	<i>Prunella</i> 331

Angiospermia.

186	<i>Rhinanthus</i> 332
187	<i>Euphrasia</i> 333
188	<i>Melampyrum</i> 335
189	<i>Lathraea</i> 338
190	<i>Pedicularis</i> 339
191	<i>Antirrhinum</i> 341
192	<i>Scrophularia</i> 342

CLASSIS

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.
Siliculosa.

193 Myagrum	343
194 Draba	344
195 Lepidium	345
196 Thlaspi	346
197 Iberis	348
198 Alyssum <i>Siliquosa.</i>	349
199 Cardamine	350
200 Sisymbrium	351
201 Erysimum	355
202 Hesperis	358
203 Arabis	359
204 Turritis	360
205 Brassica	362
206 Sinapis	363
207 Raphanus	365
208 Bunias	366

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Decandria.

209 Geranium	367
	<i>Polyandria.</i>
210 Malva	373

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Hexandria.

211 Fumaria	376
	<i>Flora.</i>

Ottandria.

212 Polygala 378

Decandria.

213 Spartium	379
214 Genista	380
215 Ononis	381
216 Anthyllis	382
217 Lathyrus	383
218 Vicia	386
219 Eruuum	389
220 Ornithopus	392
221 Astragalus	393
222 Trifolium	394
223 Lotus	400
224 Medicago	401

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Polyandria.

225 Hypericum 402

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Polygamia aequalis
semiflosculosa.

226 Tragopogon 404

227 Picris 405

228 Sonchus 406

229 Lactuca 408

B 230

230	Prenanthes	409	256	Matricaria	459
231	Leontodon	410	257	Anthemis	461
232	Hieracium	413	258	Achillea	463
233	Crepis	419		<i>Polygamia frustanea.</i>	
234	Hyoseris	420			
235	Lapsana	421	259	Centaurea	465
236	Cichorium	422		<i>Polygamia Necessaria.</i>	

Capitati.

237	Arctium	423		<i>Monogamia.</i>	
238	Serratula	424			
239	Carduus	426	261	Iasione	471
240	Cnicus	431	262	Viola	472
241	Carlina	432	263	Impatiens	476
242	Bidens	433			
243	Eupatorium	435			

Polygamia superflua.

244	Tanacetum	436			
245	Artemisia	437	264	Orchis	477
246	Gnaphalium	441	265	Ophrys	481
247	Erigeron	445	266	Serapias	483
248	Tussilago	446			
249	Senecio	448			
250	Aster	450			
251	Solidago	451			
252	Inula	452			
253	Arnica	455			
254	Bellis	456	268	Typha	487
255	Chrysanthemum	457	269	Sparganium	488
			270	Carex	489
				<i>Te.</i>	

Tetrandria.

- 271 Betula 497
272 Vrtica 499

Pentandria.

- 273 Xanthium 501

Polyandria.

- 274 Myriophyllum 502
275 Sagittaria 503
276 Quercus 504
277 Fagus 505
278 Carpinus 506
279 Corylus 507

Monadelphia.

- 280 Pinus 508

Syngenesia.

- 281 Bryonia 510

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

Diandria.

- 282 Salix 511

Tetrandria.

- 283 Viscum 521

Pentandria.

- 284 Cannabis 532

- 285 Humulus 523

Ottandria.

- 286 Populus 524

Enneandria.

- 287 Mercurialis 527

- 288 Hydrocharis 529

Monadelphia.

- 289 Juniperus 530

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monoecia.

- 290 Holcus 531

- 291 Valantia 532

- 292 Parietaria 533

- 293 Atriplex 534

- 294 Acer 538

Dioecia.

- 295 Fraxinus 539

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Filices.

- 296 Equisetum 540

- 297 Osmunda 545

- 298 Acrostichum 547

- 299 Asplenium 548

- 300 Pteris 550

- 301 Polypodium 551

- B 2 Musci.

<i>Musci.</i>				
302 Lycopodium	555	313 Tremella	613	
303 Sphagnum	556	314 Fucus	617	
304 Polytrichum	557	315 Vlua	621	
305 Mnium	558	316 Conferua	624	
306 Bryum	562	317 Byffus	626	
307 Hypnum	570			<i>Fungi.</i>
		318 Agaricus	632	
		319 Boletus	638	
<i>Algae.</i>		320 Phallus	642	
308 Jungermannia	582	321 Eluela	643	
309 Marchantia	583	322 Pezica	644	
310 Riccia	585	323 Lycoperdon	647	
311 Lichen	586	324 Mucor	651	
312 Chara	612			



CLASSIS I. MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 *HIPPURIS vulgaris.*

Habitat passim in fontibus, fluuiis, solo profundo, limoso, fluente, vbi gelu radices non attingit.

DIGYNIA.

2 *CALLITRICE verna* foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis.

German. *Frühjahrs Sternbluhme.*

Habitat Gryphiae in fossis aquosis, v. g. prope *Hohenmühl.*

3 *CALLITRICE autumnalis* foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis.

German. *Herbst-Sternbluhme.*

Habitat passim in fossis aquosis.

CLASSIS II.
DIANDRIA.

MONOGYNIA.

4 *LIGVSTRVM vulgare.*

Germ. *Reinholz, Mundholz.*

Habitat in Pomerania. Sponte natum allatum
vidi, ipse non reperiui.

5 *CIRCAEA lutetiana* caulo erecto, raceinis plu-
ribus.

Habitat Gryphiae in umbrosis depressis, v. g. in
fossa prope viam qua per syluam itur nach
Grubenhagen, inter *Eldena* et *Koethen*
et alibi.

6 *VERONICA officinalis* spicis lateralibus pedun-
culatis, foliis oppositis, caule procumbente.

Germ. *Ehrenpreis.* Pharm. *Veronica.*

Habitat in sylvestribus sterilibus; Gryphiae
auf dem Galgenkamp et supra *Hohenmühlen*
copiose. Floret Iunio.

7 *VERONICA serpyllifolia* racemo terminali sub-
spicato, foliis ouatis glabris crenatis.

Habitat Gryphiae ad vias, agros, inque pascuis.
v. g. *neben dem Richtsteig nach Elmshagen.*

8 *VERONICA Beccabunga* raceinis lateralibus, fo-
liis ouatis planis, caule repente.

German. *Bachbungen.* Pharm. *Beccabunga.*

Habitat ad scaturigines vix congelandas, in fos-
sis altis Gryphiae. Floret aestate.

9 *VERONICA Anagallis aquatica* raceinis lateralisi-
bus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto.

Germ.

Germ. *Wassergauchheil.*

Habitat Gryphiae ad fossas et in inundatis. v. g.

In fossa wenn man nach dem Galgenkamp geht et alibi sat frequens.

10 VERONICA *scutellata* racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis.

German.

Habitat in inundatis passim, Gryphiae in fossa syluatica, quæ circumducitur sylua Hinrichshagensis versus *Hohenmühlen*. Floret Iunio et Iulio.

11 VERONICA *Chamaedrys* racemis lateralibus, foliis ouatis sessilibus rugosis dentatis, caule debili.

Germ. *Gundermann.*

Habitat in pratis, siccis, apricis. Gryphiae copiose in vallo vrbis.

12 VERONICA *aruensis* floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus.

German.

Habitat Gryphiae in aruis, *auf den Brachfeldern* et prope viam *nach Elmshagen*; in vallo vrbis versus meridiem. Floret Maio.

13 VERONICA *hederifolia* floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.

German.

Habitat vbique in cultis, ruderatis, primo vere floret in vallo meridiem versus; denique tota aestate.

14 VERONICA *verna* floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus.

Germ. *Händleinkraut.*

Habitat in apricis, iuxta agros, floret cum praecedente, sed vere tantum.

15 *PINGVICULA vulgaris* nectario cylindraceo longitudine petali.

Germ. *Fettkraut.*

Habitat in viginosis Pomeraniae. Circa Gryphiam-rarius. In hortum illata periit.

16 *UTRICULARIA vulgaris* nectario conico, scapo paucifloro.

Germ.

Habitat in paludibus syluae Grubenhagenfis.

17 *VERBENA officinalis* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciiniatis, caule solitario.

Germ. *Eisenkraut, Eisenhart, Taubenkraut.*

Pharmac. *Verbena.*

Habitat in ruderatis; Gryphiae ad viam publicam prope *Eldena*, copiofissima ad vias pagi *Hanshagen*.

18 *LYCOPVS europaeus* foliis sinuato-serratis.

Germ. *Waffer-Andorn.*

Habitat ad ripas, locisque umbrosis vdis; Gryphiae im wumpener Busch bey der Trift. Folliis variat. Floret Augusto.

DIGYNIA.

19 *ANTHOXANTHVM odoratum* spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis aristata longioribus.

German. *Ruchgrass.* Schreb.

Habitat ubique in pratis duriusculis. Floret Iun.

CLASSIS

CLASSIS III.
TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

20 VALERIANA *dioica* floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis.

Germ. *Kleinbaldrian.*

Habitat Gryphiae in vliginosis auf dem Galgenkamp hinten am Rick et alibi haud frequens. Floret Iunio.

21 VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.

Germ. *Baldrian*, *Gemein-Baldrian*. Pharm. *Valeriana minor*.

Hab. Gryphiae in nemoribus paludosis copiose. Variationes foliorum pro solo.

22 VALERIANA *Locusta* floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus.

Germ. *Rapiñzel*, *Lämmer-Feld-Lattig*, *Nüßgen-Salat*.

Habitat in hortis, aruis, ripis maritimis elatis.

Gryphiae gegen Elmshagen um das Mittagszeichen, am hohen Ufer zu Ludwigsburg hinter die Reduten. Floret Iunio. Variationes certo conjectatas obseruare nondum licuit.

23 IRIS *Pseudacorus* corollis imberibus petalis interioribus stigmata minoribus, foliis ensiformibus.

Germ. *Schwertel*, *gelber Schwertel*. Pharmac. *Acorus palustris*.

Habitat ad ripas paludum, fossarum vbiue.
Floret Iunio.

GRAMINA.

24 *SCIRPVIS palustris* culmo tereti nudo, spica subouata terminali.

Germ. *Sumpfbinsen*. Schr.

Hab. Gryphiae in fossis et inundatis frequens.
Floret Iunio.

25 *SCIRPVIS caespitosus* culmo striato nudo, spica biualui terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis.

Germ. *Raasenbinsen*.

Habitat in paludibus caespitosis syluaticis.

26 *SCIRPVIS lacustris* culmo teretinudo, spicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus.

Germ. *Teichbinsen*. S.

Habitat in Ricco et stagnis passim profundioribus.

27 *SCIRPVIS maritimus* culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata.

Germ. *Seebinsen*. S.

Hab. ad littora maris v. g. in fossis *hinter den Gradierhüfern*.

28 *SCIRPVIS syluaticus* culmo triquetro folioso, vimbella foliacea, pedunculis nudis suprade-compositis, spicis confertis.

Germ. *Waldbinsen*. S.

Habitat in sylvis humentibus, v. g. zu *Hohenmühl* et *Ungnad*.

29 *ERIOPHORVM vaginatum* culmis vaginatis teretibus, spica scariosa.

Germ. *Sumpfdungrass*. S.

Habitat in sterilibus subudis et turfosis. Floret Maio et Iunio.

30 *ERIOPHORVM polystachion* culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis.

Germ. *Wollgrass, Wiesendungrass*. S.

Habitat cum praecedente, floretque.

DIGYNIA.

31 *PHALARIS phleoides* panicula cylindrica spiciformi.

Germ. *Foenichartiger Glanz*. Schreb.

Hab. in versuris rarior.

32 *PANICVM crus galli* spicis alternis, coniugatisque, spiculis subdiuisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari.

Germ. *Grannichtes Hirsegrass*.

Habitat in hortis, cultis.

33 *PHLEVUM pratense* spica cylindrica longissima culmo recto.

Germ. *Wiesen-Fönich*. S.

Habitat in versuris et pratis siccis.

34 *ALOPECVRVS pratensis* culmo spicato erecto glumis villosis.

Germ. *Fuchsschwanz, Wiesen-Fuchsenschwanz*. S.

Habitat in pratis et in vallo vrbis haud vbique.

35 *ALOPECVRVS geniculatus* culmo spicato infraecto.

Germ. *Knoten-Fuchsenschwanz*, S.

Habitat

Habitat in vliginosis, am Stadtgraben et fossis
aestate exsiccandis ubique. Floret Iunio.

- 36 ALOPECVRVS *paniceus* panicula subspicata,
glumis villosis, corollis aristatis.
Germ.

Habitat in hortis, cultis infrequens.

- 37 MILLVM *effusum* floribus paniculatis dispersis
imuticis.

Germ. *Straußliches Fladdegrass*. S.

Hab. in nemoribus umbrosis v. g. in luco Hor-
henmühlenſi.

- 38 AGROSTIS *Spica venti* petalo exteriori exfe-
rente aristam rectam strictam longissimam.

Germ. *Acker-Straußgrass*. S.

Habitat inter segetes copiosissima.

- 39 AGROSTIS *rubra* calycibus coloratis, petalo-
rum arista dorsali recurva, culmis prostratis
subramosis.

Germ. *Rothes Straußgrass*. S.

Habitat locis humidiſculis. v. g. aufm *Gal-
genkamp*.

- 40 AGROSTIS *canina* paniculae ramulis diuari-
atis imuticis, culmo ramoso repente, calycibus
aequalibus.

Germ. *Braunes Straußgrass*. S.

Habitat in campis, in apricis aufm *Galgen-
kamp*.

- 41 AGROSTIS *capillaris* panicula capillari paten-
te, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis
coloratis, flosculis imuticis.

Germ.

Germ. *Haarstraußgras*. S.

Habitat in vmbrosis solo fertili, zu *Hohenmühlen*.

42 *AIRA caerulea* foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis, conuoluto-subulatis.

Germ. *Blaue Schmielen*.

Habitat in pascuis aquosis, et vmbrosis.

43 *AIRA caespitosa*, foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta breui.

Germ. *Raasen-Schmielen*.

Habitat in pratis cultis et fertilibus haud frequens.

44 *AIRA canescens* foliis setaceis: summo spathaceo paniculam inferne obvoluente.

Germ. *Graue Schmielen*. S.

Habitat zu *Hanshagen* in duris arenosis, siccis bey dem Kirchenholz.

45 *MELICA nutans* petalis imberibus, panicula nutante simplici.

Germ. *Hangendes Schoengrass*. S.

Habitat in collibus apricis, v. g. auf dem *Galgenkamp*, circa *Hinrichshagen*, rarius. Floret Iunio.

46 *POA aquatica* panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus.

Germ. *Wasser-Viehgras*. S.

Habitat in fossis, v. g. im äußern *Stadtgraben* beym *Fettenthor*, am Steg worüber man nach den *Galgenkamp* geht.

- 47 *Poa trivialis* panicula subdiffusa, spicis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti.
 Germ. *Dreyblüthiges Viehgras.* S.
 Habitat in pascuis frequens, et iuxta vias.
- 48 *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.
 Germ. *Fünfblüthiges Viehgras.* S.
 Habitat in pratis, v. g. *bey Eldena.*
- 49 *Poa annua* panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso.
 Germ. *Sommer-Viehgras.*
 Habitat ubique in cultis, hortis, ad vias.
- 50 *Poa compressa* panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso.
 Germ. *Berg-Viehgras.* S.
 Habitat in siccis, muris, tectis, v. g. *auf und an der Stadtmauer.*
- 51 *Poa nemoralis* panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.
 Germ. *Wald-Viehgras.* S.
 Habitat in sylvis densissimis, v. g. *vorne im Eldenaer Holz neben dem Wege nach Koeten-hagen.*
- 52 *BRIZA media* spiculis ovatis, calyce flosculis breuiore.
 Germ. *Wiesen-Zittergras.* S.
 Habitat in campis siccis, locisque elatis, v. g. *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio et Julio.
- 53 *DACTYLIS glomerata* panicula secunda glomerata.
 Germ. *Knaulgras.* S.

Habitat

Habitat vbique in cultis ruderatis, ad vias ante
vrbem inter hortos passim copiosa.

- 54 *CYNOSVRVS cristatus* bracteis pinnatifidis.
Germ. *Gefiedertes Kammgräss.* S.

Habitat in pratis et iuxta vias.

- 55 *FESTVCA ouina* panicula secunda coarctata
aristata, culmo tetragono nudiusculo foliis se-
taceis.

Germ. *Schaaf-Schwingel.* S.

Habitat collibus apricis, pratis elatis, v. g. *auf
dem Fuchsberg; zu Ludwigsburg* et alibi
rarius.

- 56 *FESTVCA rubra* panicula secunda scabra, spi-
culis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico,
culmo semitereti.

Germ. *Rother Schwingel.* S.

Habitat in *Galgenkamp.*

- 57 *FESTVCA decumbens* panicula erecta, spiculis
subouatis muticis, calyce flosculis maiore, cul-
mo decumbente.

Germ. *Kriechender Schwingel.*

Habitat in pascuis passim, ad vias publicas ra-
rior, v. g. *an der Landstraße nach Hinrichs-
hagen.*

- 58 *FESTVCA elatior* panicula secunda erecta, spi-
culis subaristatis exterioribus teretibus.

Germ. *Wiesen-Schwingel.* S.

Habitat in pratis fertilibus vbique.

- 59 *FESTVCA fluitans* panicula ramosa erecta, spi-
culis subsessilibus teretibus muticis.

Germ.

- Germ. *Manna*, *Mannaschwingel*. S. *Schwadengräütze*.
 Habitat in fossis et paludibus subinde copiosissima.
- 60 *BROMVS fecalinus* panicula patente, spiculis ouatis, aristis rectis.
 Germ. *Tresp*, *Rockentreßp*. S.
 Habitat in agris fecalinis arenosis vbiue.
- 61 *BROMVS aruenis* panicula nutante, spiculis ouato-oblongis.
 Germ. *Ackertresp*. S.
 Habitat locis ruderatis, fertilibus, siccis ad vias, copiosissima in vallo vrbis.
- 62 *BROMVS giganteus* panicula nutante, spiculis quadrifloris, aristis breuioribus.
 Germ. *Hoher Tresp*.
 Habitat in syluis, Gryphiae rario. In Rugia passim copiosus.
- 63 *AVENA fatua* paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus basi pilosis aristis totis laevibus.
 Germ. *Wildhafer*. S.
 Habitat in agris inter segetes.
- 64 *AVENA pratensis* spicata, calycibus quinquefloris.
 Germ. *Wiesenhafer*. S.
 Habitat in apricis, pascuis siccis, v. g. *auf dem Galgenkamp*.
- 65 *ARVNDO phragmites* calycibus quinquefloris, panicula laxa.

5 Gerin. *Rohrschilf*. S.

Habitat in Ricco fossis, piscinis, lacubus.

66 ARVNDO *Epigaeos calycibus unifloris; panicula erecta, foliis subtus glabris.*

Germ. *Bergschilf*. S.

Habitat in collibus aridis passim in agris circa Subsow.

67 LOLIVM *perenne* spica mutica: spicis compressis muticis.

Germ. *Perennirender Lülich*. S.

Habitat passim ad agros, in pascuis.

68 LOLIVM *temulentum* spica aristata: spiculis compressis aristatis.

Germ. *Taumel-Lülich*. S.

Habitat passim in agris inter Hordeum et in vallo rarius.

69 ELYMV ARENARIUS spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus.

Germ. *Flugsandgras*. S.

Habitat ad litora marina, v. g. *bey Wampen und auf dem Streng*.

70 HORDEV MURINUM flosculis lateralibus masculis aristatis, inuolucris intermediis ciliatis.

Germ. *Mausgerste*. S.

Habitat locis ruderatis vbique, in plateis et areis urbis quietis.

71 TRITICVM *repens* calycibus subulatis quadri-floris acuminatis.

Germ. Quaekgras, Quacken, Queckweizen. S.
Pharmac. Gramen.

Habitat in cultis, hortis, vix extirpanda.

TRIGYNIA.

72 *HOLOSTEVUM umbellatum* floribus umbellatis.

Germ.

Habitat in vallo urbis meridiem versus *beym Fleischerthor*, copiosissime; alibi rarius.
Floret Aprili.

CLASSIS IV.
T E T R A N D R I A.

MONOGYNIA.

73 SCABIOSA *Succisa* corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis integrerimis.

Germ. *Abbiss*, *Teufelsabbiss*. Pharm. *Morsus diaboli*.

Habitat in pascuis humidiusculis passim, in collibus zu *Kleinzaßtrow* et alibi. Floret Julio.

74 SCABIOSA *aruensis* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis: lobis distantibus.

Germ. *Apostemkraut*, *Scabiosen*. Pharmac. *Scabiosa*.

Habitat iuxta interque segetes, et in pratis haud infrequens. Floret Iunio.

75 SCABIOSA *Columbaria* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis.

Germ.

Habitat in colli et fccis ante ponticulum iuxta viam qua itur ad *Kleinzaßtrow*. Floret Iulio et Augusto.

76 SCHERARDIA *aruensis* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.

Germ. *Scherards-Kraut*.

Habitat circa *Kleinzaßtrow* in aruis rarissima. Semel in excursione eam legi, postmodum non reperii.

- 77 *ASPERVLA odorata* foliis octonis lanceolatis,
florum fasciculis pedunculatis.
Germ. *Waldmeister, Sternleberkraut.* Pharm.
Matrisylua.
Habitat in syluis, vmbrosis, im *Eldenaer Hol-*
ze zur rechten des Weges nach Koetenhagen
copiosissime.
- 78 *GALIVM palustre* foliis quaternis obouatis in-
aequalibus, caulibus diffusis.
Germ.
Habitat inter *Hohenmühlen* et *Elmshagen* in ri-
vulo limoso, inque paludibus. Floret Iunio.
79. *GALIVM uliginosum* foliis senis lanceolatis re-
trorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis,
corollis fructu maioribus.
Germ.
Habitat vbique copiose in paludibus graminofis,
pascuis aquofis, et pratis aqua irrigatis.
Floret Iunio.
- 80 *GALIVM verum* foliis octonis linearibus sulca-
tis, ramis floriferis breuibus.
Germ. *Meyenkraut, Labkraut, unser Frauen-*
bettstroh, Waldstroh. Pharmac. *Galium*
luteum.
Habitat in graminofis, iuxta sepes et inter ar-
busta passim. Floret Julio.
- 81 *GALIVM boreale* foliis quaternis lanceolatis
trineruiis glabris, caule erecto, seminibus
hispidis.
Germ. *Weismeyerkrat.*

- Habitat in pratis sterilibus vulgatissimum.
Floret aestate.
- 82 GALIVM Aparine** foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido.
Germ. *Klebkraut, Zaunreiss, Klebrich.*
Habitat in cultis, ad sepes vbique. Floret in eunte aestate.
- 83 PLANTAGO maior** foliis ouatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis.
Germ. *Wegerig, Wegbladt.* Pharmac. *Plantago latifolia.*
Habitat cum varietatibus in viis, pratis et horis vbique.
- 84 PLANTAGO media** foliis ouato-lanceolatis, pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti.
Germ. *Kleiner Wegerich.*
Habitat in pratis apricis argillosis rarer.
- 85 PLANTAGO lanceolata** foliis lanceolatis, spica subouata nuda, scapo angulato.
Germ. *Schmaler Wegerich.*
Habitat iuxta vias et agros vbique obuia. Floret Maio et Iunio.
- 86 PLANTAGO maritima** foliis semicylindraceis integerimis: basi lanatis, scapo tereti.
Germ. *Seewegerich.*
Habitat in litoribus maris fabulosis apricis sterilibus v. g. pone *Wampen.* Floret Iulio.
- 87 SANGVISORBA officinalis** spicis ouatis.
Germ. *Blutkraut, Wiesenknöpfe, Biebernelli.*
Pharmac. *Pimpinella italicica.*

Habitat in pratis siccioribus. Ex agro gryphico in hortum intuli, locum vbi sumta fuit determinate docere nequeo.

§8 CORNVS *sanguinea* arborea cymis nudis.

Germ.

Habitat in arbustis et dumetis ex relatione fide dignoruin, mihi legere nondum contigit.

§9 ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis.

Germ. *Sinau*, *Loewenfuss*. Pharmac. *Alchemilla*.

Habitat passim in pascuis vmbrosis, zu Ludwigsburg oben im Elmshägner Holze nach Hohenmühlen hin. Floret Maio et seriūs.

DIGYNIA.

§0 CUSCUTA *europaea* floribus sessilibus.

Germ. *Frauenhaar*, *Flachsseide*. Pharmac. α) *Cuscuta*. β) *Epithymum*.

Habitat in plantis variis parasitica, auf dem Galgenkamp in vepretis ad fossam quae est inter agrum et arbusta.

TETRAGYNIA.

§1 ILEX *aquifolium* foliis ouatis acutis spinosis.

Germ. *Stechpalmen*.

Habitat in sylva Eldenaensi; in Rugia et auf dem Darß frequentior.

§2 POTAMOGETON *natans* foliis oblongo-ouatis petiolatis natantibus.

Germ. *Saamkraut*, *Fließend Saamkraut*.

Habitat in Ricco et piscinis.

§3 POTAMOGETON *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus.

Germ.

Germ. *Klar Saamkraut.*

Habitat in Piscina zu Hohenmühlen.

94 *POTAMOGETON crispum* foliis lanceolatis alternis vndulatis.

Germ. *Kraus Saamkraut.*

Habitat in fossis et riuulis rarius.

95 *POTAMOGETON pusillum* foliis linearibus oppositis alternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti.

Germ. *Klein Saamkraut.*

Habitat in paludibus paßim et in inundatis Ricco adiacentibus.

96 *SAGINA procumbens* ramis procumbentibus, petalis brevissimis.

Germ.

Habitat in pascuis sterilibus, viginosis aridis v. g. iuxta agrum et prope pratum inundatum bey Hohenmühlen.

CLASSIS V.

P E N T A N D R I A.

MONOGYNIA.

97 *Myosotis scorpioides* seminibus nudis: foliorum apicibus callosis.

a. arvensis, foliis hirsutis.

Habitat ubique campis aridis. Floret Aprili et serius.

b. palustris, foliis glabris.

Germ. *Vergiss mein nicht.*

Habitat in aquosis, scaturiginosis, palustribus frequens.

98 *LITHOSPERMUM officinale* seminibus laevibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis.

Germ. *Steinsaame, Steinhirse.* Pharmac. *Lithospermum.*

Habitat an der Stadtmauer et in vallo.

99 *LITHOSPERMUM arvense* seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus.

Germ. *Ackersteinsaame.*

Habitat in agris et aruis; In vallo versus meridiem vere copiosissimum. Floret Aprili.

100 *ANCHVSA officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis.

Germ. *Ochsenzunge, rothe Ochsenzunge.* Pharmac. *Buglossum.*

Habitat passim in ruderatis, ad vias et agros v. g. zu Hanshagen, et auf dem Kirchhofe zu Neuenkirchen.

101 *CYNOGLOSSVM officinale* staminibus corolla breuioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus.

Germ. *Hundszunge*. Pharmac. *Cynoglossa*.

Habitat in ruderatis et ad vias vbiue.

102 *PULMONARIA officinalis* foliis radicalibus ouato-cordatis scabris. V. folio non maculofo.

Germ. *Lungenkraut*. Pharm. *Pulmonaria maculosa*.

Habitat in nemoribus v. g. zu *Hohenmühlen*, et sylua Grubenhagensi locis subhumidis. Maculosa rarior. Floret Maio.

103 *SYMPHYTVM officinale* foliis ouato-lanceolatis decurrentibus.

Germ. *Schwarzwurz*, *Wallwurz*, *Beinwelle*. Pharmac. *Consolida maior*.

Habitat in umbrofisi, humidis, aquofisi, fossis vbiue, variat flore albo, cereuleo et rubro. Floret Maio et Ierius.

104 *LYCOPSI S arvensis* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis.

Germ. *Schminkwurz*. Pharm. *Asperugo pre-cumbens*.

Habitat in aruis et agris, nec non inter segetes aestiuas vbiue. Floret Maio.

105 *ECHIVM vulgare* caule tuberculato-hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus.

Germ. *Wilde Ochsenzunge*, *blaue Ochsenzunge*.

Habitat ad vias et agros rarius, v. g. zu *Griebnow vorm Schloße*, ad viam publicam Gry-

- phiam inter et Sundiam. Floret Julio.
- 106 PRIMVLA veris officinalis foliis dentatis rugosis limbo corollarum concauo.
 Germ. Schliesselbluhmen. Pharm. *Primula veris*.
 Habitat in pratis, locisque sylvestribus elatis rario, v. g. an den Gräben im Eldenaischen Holze nahe bey dem Wege nach Koethen-hagen.
- 107 MENYANTHES trifoliata foliis ternatis.
 Germ. Bieberklee, Sumpfklee. Pharmac. *Tri-folium aquaticum*.
 Habitat in paludibus fere ubique, v. g. zwischen dem Fleischer- und Fettenthör; copio-sissima hinter der letzten Mühle, et alibi. Floret Iunio.
- 108 HCTTONIA palustris pedunculo verticillato-multifloro.
 Germ. *Wasserviole*.
 Habitat cum praecedente. Floret Iunio.
- 109 LYSIMACHIA vulgaris paniculata, racemis terminalibus.
 Germ. *Gelber Weiderich*.
 Habitat ad ripas et pascuis depressis, v. g. auf dem Galgenkamp. Foliis binatis ternatisque variat. Floret Julio.
- 110 LYSIMACHIA thyriflora racemis lateralibus pedunculatis.
 Germ. *Wasserweiderich*.
 Habitat am Stadtgraben hinter dem Collegio.

111 LYSIMACHIA *Nummularia* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente.

Germ. *Egelkraut*, *Pfennigkraut*. Pharmac. *Nummularia*.

Habitat in umbrosis, syluaticis, iuxta scrobes
im Eldenaer Holz nicht weit vom Hofe.
Floret Julio.

112 ANAGALLIS *aruensis* foliis indiuisis, caule procumbente.

Germ. *Gauchheil*, *Grundheil*.

Habitat in arvis, iuxta viam publicam bey Eldena.

113 CONVOLVULUS *aruensis* foliis sagittatis utrinque acutis.

Germ. *Ackerwinde*, *Kleine Winde*.

Habitat in agris, inter segetes ubique.

114 CONVOLVULUS *sepium* foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris.

Germ. *Zaunwinde*, *Zaunklocken*.

Habitat in sepibus ubique, v. g. zwischen den Gärten. Floret Augusto.

115 CAMPANULA *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.

Germ. *Gloecklein*.

Habitat ubique in pratis et ad margines agrorum.
Floret Julio et Augusto.

116 CAMPANULA *Trachelium* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis ciliatis.

Habitat in nemoribus et umbrosis frequens.

- 117 CAMPANVLA *glomerata* caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo *terminali*.
Germ.
Habitat in pratis duris es syluaticis passim. *Im Helmshägner Holz nach dem Pottkrug hin.*
- 118 LONICERA *Periclymenum* capitulis ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis.
Germ. *Waldwinde*.
Habitat in sylvis, dumetis, collibus fruticibus confitis frequens, *auf dem Galgenkamp*. Floret Julio.
- 119 VERBASCVM *Thapsus* foliis decurrentibus vtrinque tomentosis.
Germ. *Wollkraut*, *Königskerze*, *Fackelkraut*.
Pharmac. *Verbascum*.
Habitat in glareofisis sterilibus rarius. Ex agro in hortum illatum est. Floret Julio et Augusto.
- 120 VERBASCVM *nigrum* foliis oblongo-cordatis petiolatis.
Germ. *Wegkerze*, *Braunwurz*. Pharm. *Verbascum*. (radix).
Habitat ad pagos, vias, v. g. zu *Derschow*. Floret Julio.
- 121 DATVRA *Stramonium* pericarpiis spinosis erectis ouatis, foliis ouatis glabris.
Germ. *Stechapfel*, *Dornapfel*.
Habitat in ruderatis ante portas.
- 122 HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus.

Germ.

- 1 Germ. *Dollkraut, Bilsenkraut.* Nostratibus
Dullbillerkrut. Pharm. *Hyoscyamus.*
 Habitat in ruderatis pinguibus ubique. Ante
 portam *Fleischherthor* tam copiose crescit ut
 dum floret, odore, suo tetro aerem quasi infi-
 ciat, imense Iulio et Auguflo.
- 123 SOLANVM *Dulcamara* caule inermi frute-
 scente flexuoso, foliis superioribus hastatis, ra-
 cemis cymosis.
- Germ. *Je länger je lieber, Hindschkraut.* Phar-
 mac. *Dulcamara.*
 Habitat in fossis, locisque humentibus, v. g.
 am *Stadtgraben.*
- 124 SOLANVM *nigrum vulgatum* caule inermi
 herbaceo, foliis ouatis dentato-angulatis, um-
 bellis nutantibus.
- Germ. *Nachtshatten, Saukraut.* Pharm. *So-*
lanum.
 Habitat locis cultis, in hortis frequentissimum.
 Floret aestate.
- 125 RHAMNVS *catharticus* spinis terminalibus
 floribus quadrifidis dioicis, foliis ouatis.
 Germ. *Creuzbeer, Wegdorn.* Pharmac. *Spi-*
na ceruina.
 Habitat in sepibus auf dem *Galgenkamp.* Flo-
 ret Iunio.
- 126 RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus mo-
 nogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.
 Germ. *Faulbaum, Pinnholz.* Pharm. *Fran-*
gula.
 Habitat cum praecedente, floretque.

127 *EVONYMVS Europaeus* floribus plerisque quadrifidis, a) tenuifolius.

Germ. *Spillbaum, Spindelbaum.*

Habitat in sepibus paucis; auf dem *Galgenkamp.* Floret Iunio.

128 *RIBES nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis.

Germ. *Gichtbeerbaum, Gichtbaum.* Pharmac. *Ribia nigra.*

Habitat in fossa syluatica Hindrichshagensi, auf dem *Galgenkamp* et alibi. Floret Aprili et Maio.

129 *RIBES Vua crispa* ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla.

Germ. *Stickelbeeren, Stachelbeeren.*

Habitat paucim in sepibus, forte ex hortis australia. Floret Martio rarius, Aprili ubique.

130 *HEDERA helix* foliis ouatis lobatisqne.

Germ. *Epheu.* Nostratisbus *Wintergryn.* Phar. *Hedera arborea.*

Habitat cum variationibus in sylvis umbrosis Grubenhagensi et Eldenaensi.

131 *GLAVX maritima.*

Germ. *Milchkraut.*

Habitat in maritimis, salmis, auf dem *Rosenthal* et alibi copiose. Floret Iunio et Iulio.

DIGYNIA.

132 *ASCLEPIAS Vincetoxicum* foliis ouatis basi barbatis, caule crebro, umbellis proliferis.

Germ. *Schwalbenwurz.* Pharmac. *Hirundinaria.*

Habi-

- Habitat auf dem Streng, inter Wampen continentem et insulam Koos. Floret Augusto.
- 133 HERNIARIA glabra** glabra herbacea.
 Germ. *Bruchkraut*. Pharm. *Herniaria*.
 Habitat in apricis, glareofisis, fccisis, v. g. zu Ludwigsburg auf der Strandweide. Floret Maio.
- 134 CHENOPODIVM Bonus Henricus** foliis triangulañ-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis.
 Germ. *Stolzer Heinrich*, *Guter Heinrich*, *Schmirgel*. Pharm. *Bonus Henricus*.
 Habitat in ruderatis, plateis, ad sepes vbique. Floret Maio.
- 135 CHENOPODIVM rubrum** foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis foliosis caule breuioribus.
 Germ. *Rothe Melthe*. Pharmac. *Atriplex sylvestris*.
- 136 CHENOPODIVM album** foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis.
 Germ. vid. Rupp. Ien. *Weisse Melthe*.
 Habitat passim in agris, cultis.
- 137 CHENOPODIVM viride** foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subsfoliatis.
 Germ. *Grüne Melte*.
 Habitat in cultis, oleraceis, locisque fertilibus nimium abundans. Floret cum affinibus aestate.

- 138 CHENOPODIVM *glaucum* foliis ouato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis.
 Germ. *Gelbe Melte, Kleiner Schmirgel.*
 Habitat ad finitem, in plateis suburbium.
- 139 CHENOPODIVM *Vulnaria* foliis integerrimiis rhoimbeo-ouatis, floribus glomeratis axillaribus.
 Germ. *Wuhlkraut, Bockskraut, Stinkende Melte* etc. Pharmac. *Vulnaria.*
 Habitat iu cultis oleraceis, hortis pone murum et ante portas.
- 140 CHENOPODIVM *polyspermum* foliis integerimis ouatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus.
 Germ. *Stauderich.*
 Habitat in cultis. Forte an plures species dantur.
- 141 SALSOLA *Kali* herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus.
 Germ. *Salzkraut.*
 Habitat ad litora maris, zu *Wampen hinter der Koppel.* Floret Julio.
- 142 VLMVS *campestris* foliis duplicato-ferratis: basi inaequalibus.
 Germ. *Ulmbaum.* Pharm. *Ulmus.*
 Habitat ad Pagos et in syluis.
- 143 GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus.
 Germ. *Herbstenzian.*
 Habitat apud Sundiam.

144 GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo.

Germ. *Tausendgildenkraut*. Pharmac. *Centaurium minus*.

Habitat inter *Helmshagen* und *Pottkrug*, zu *Hanshagen* locis apricis et depresso.

Centaurium minus pumilum ramosissimum.

Hab. in pratis salsis zu *Wampen*. Floret Iulio et Augusto.

145 GENTIANA *campestris* corollis quadrifidis fauce barbatis.

Germ. *Feldenzian*.

Habitat in pratis siccis, v. g. in *Hindrichshagen* et auf dem *Galgenkamp*. Floret Augusto.

VMBELLATAE.

146 ERYNGIVM *maritimum* foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis.

Germ. *Manstreu*, *Gemein Manstreu*.

Habitat ad littora maris arenosa, v. g. zu *Ludwigsburg* et auf dem *Streng*. Floret exaequata aestate.

147 HYDROCOTYLE *vulgaris* foliis peltatis, vimbellis quinquefloris.

Germ.

Habitat in fossis et aquis stagnantibus.

148 SANICULA *europaea* foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus.

Germ. *Sannikel*. Pharm. *Sanicula*.

Habitat in sylvis vimbrosissimis, zu *Ludwigsburg*. Floret Iunio.

- 149 **TORDYLIVM** *Anthriscus vimbellis consertis*,
foliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis.
Germ.
Habitat prope vias inter hortos et in ruderatis
ante portas frequens. Floret Julio.
- 150 **DAVCVS** *Carota seminibus hispidis*, petiolis
subtus neruosis *sylvestris*.
Germ. *Vogelnest*. Pharm. *Daucus sylvestris*.
Habitat ad versuras agrorum, ad vias, et sepes
locis aridis passim, v. g. ad fossam *bey der*
Drift am Busch zu Wampen copiose. Flo-
ret Julio et Augusto.
- 151 **CONIVM** *maculatum* *seminibus striatis*.
Germ. *Schierling*. Pharm. *Cicuta*.
Habitat in ruderatis ubique. Floret Julio.
- 152 **SELINVM** *palustre* sublaetescens, radice unica.
Germ.
Habitat in fossis aquofis et paludibus vmbrofis,
v. g. *bey Hohenmühl*. Floret Augusto.
- 153 **LASERPITIVM** *latifolium* foliolis cordatis in-
ciso-ferratis.
Germ. *Weis Hirtzwurz*. Pharm. *Gentiana*
alba.
Habitat in vmbrosis et sylvis densis solo sub-
humido, v. g. *auf dem Galgenkamp*.
- 154 **HERACLEVM** *Sphondylium* foliis pinnatifidis.
Germ. *Deutsch Bährenklau*.
Habitat in pratis, syluaticis, subhumidis cum
praecedente.
- 155 **ANGELICA** *sylvestris* foliolis aequalibus oua-
to-lanceolatis ferratis.

Germ.

- Germ. *Wilde Angelik.* Pharmac. *Angelica sylvestris.*
 Habitat ad paludes et locis syluaticis humidis,
 v. g. *bey der letzten Windmühle vorm Fettenthor.* Floret Augusto.
- 156 *SIVM latifolium* foliis pinnatis, umbellis terminalibus.
 Germ.
 Habitat in riuulis et ad ripas paludosas frequens.
 Floret Augusto.
- 157 *OENANTHE fistulosa* stolonifera, caulinis pinnatis filiformibus fistulosis.
 Germ. *Wasser Steinbrech.*
 Habitat in fossis et inundatis v. g. *beym Steg worüber man nach dem Galgenkamp geht.*
 Floret Julio.
- 158 *PHELLANDRIVM aquaticum* foliorum ramificationibus diuaricatis.
 Germ. *Unächter Schierling.*
 Habitat in fossis limosis, v. g. *am Stadtgraben.*
- 159 *CICVTA virosa* umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis.
 Germ. *Wasser Schierling, aechter Schierling.*
 Pharm. *Cicuta.*
 Habitat cum praecedente.
- 160 *AETHVSA Cynapium.*
 Germ. nostr. *Wilde Petersilie.*
 Habitat in hortis.
- 161 *CHAEROPHYLLVM sylvestre* caule striato geniculis tunidiusculis.

Germ. nostr. *Kalwerkropp*. Pharm. *Cicutaria*.
Habitat in cultis et ruderatis ubique. Floret
Iunio.

162 CHAEROPHYLLVM temulentum caule scabro,
geniculis tumidis.

Germ. *Klein Kalwerkropp*.

Habitat ad aruos, vias, sepes zwischen den Gär-
ten vorm Fleischerthor.

163 PASTINACA sativa foliis simpliciter pinnatis.

Germ. *Wilde Pasternaken*. Pharm. *Pastinaca*.

Habitat in pascuis passim, auf dem Wall beym
Fleischerthor.

164 CARVM Carui.

Germ. *Wilder Körwel*. Pharm. *Carui*.

Habitat in pratis siccis, duris auf dem Galgen-
kamp et alibi.

165 PIMPINELLA saxifraga foliis pinnatis: fo-
liolis radicalibus subrotundis; summis linea-
ribus.

Germ. *Bokspeterlein*. Pharm. *Pimpenella no-
stras*.

Habitat in pascuis siccis vulgatissima, auf dem
Galgenkamp. Variationes maiores passim
in syluis et vmbrosis. Im Helmshager Holz
nach den Pottkrug hin. Floret Augusto.

166 AEGOPODIVM Podagraria foliis caulinis
summis ternatis.

Germ.

Habitat ad sepes, et in cultis, oleraceis, po-
inariis frequens. Floret Iunio et serius cum
congeneribus sere omnibus.

TRIGYNIA.

- 167 VIBVRNVM *Opulus* foliis lobatis, petiolis glandulosis.

Germ. *Hirschholder*. Nosfr. *Goosfleder*?

Habitat in dumetis et sepibus passim auf dem Galgenkamp. Floret Iunio.

- 168 SAMBVCVS *Ebulus* cymis trifidis, stipulis foliaceis, caule herbaceo.

Germ. *Attich*. Pharmac. *Ebulus*.

Habitat passim in sylvis et sepibus.

- 169 SAMBVCVS *nigra* cymis quadripartitis, caule arboreo.

Germ. *Fliederbaum*, *Hollunder*. Pharmac. *Sambucus*.

Habitat vbiue ad pagos, sepes.

- 170 ALSINE *media* petalis bipartitis, foliis ouatocordatis.

Germ. *Hühnerdarm*, *Hühnerbiss*.

Habitat vbiue in cultis. Floret toto fere anno.

TETRAGYNIA.

- 171 PARNASSIA *palustris*.

Germ. *Parnassgrass*. Pharm. *Hepatica alba*.

Habitat in vliginosis, hinter Hinrichshagen.

PENTAGYNIA.

- 172 STATICE *Armeria* scapo simplici capitato, foliis linearibus.

Germ.

Habitat in campis aridis, elatis vbiue.

- 173 LINVM *Radiola* foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis.

Germ.

Habitat locis fabulosis inundatis, *bey Weidenhagen in der Moorkoppel nach dem Pottkrug hin.*

174 DROSERA *rotundifolia* scapis radicatis, foliis orbiculatis.

Germ. Sonnenthau. Pharmac. Ros solis.

Habitat locis turfosis, depressis rario. *In Moor beym Pottkrug.*

175 DROSERA *longifolia* scapis radicatis, foliis oblongis.

Germ. Sonnenthau. Pharmac. Ros solis.

Habitat cum praecedente sed ubique frequenter.

POLYGYNIA.

176 MYOSVRVS *minimus*.

Germ. Mausschwanz.

Habitat in hortis, agris et collibus apricis. Floret Maio.

CLASSIS VI.
HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

- 177 *ALLIUM arenarium* caule planifolio bulbiferō, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis.
 Germ. *Sandlauch*.
 Habitat campis arenosis rario.
- 178 *ORNITHOGALUM luteum* scapo angulo diphylo, pedunculis vimbellatis simplicibus.
 Germ. *Ackerzwiebel*.
 Habitat in cultis, oleraceis, auf dem Wall hinterm Collegio. Floret Aprili.
- 179 *ORNITHOGALUM minimum* scapo angulato diphyllo, pedunculis vimbellatis ramosis.
 Germ. *Klein Ackerzwiebel*.
 Habitat in cultis rario in sylvis paissim copiose v. g. im Helmshägner Holz beym Richtsteig nach Grubenhagen. Floret Aprili.
- 180 *ASPARAGUS officinalis* caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis duabus interioribus una erectiore.
 Germ. *Spargel, Aspars.* Pharm. *Asparagus*.
 Habitat in apricis paissim, auf dem Wall gegen Süden und auf dem Galgenkamp &c.
- 181 *CONVALLARIA majalis* scapo nudo.
 Germ. *Mayblumen, Liliengconvallien.* Pharm. *Lilium convallium*.
 Habitat in sylvis caeduis Gryphiae rario.

182 CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis
amplexicaulibus, caule ancipi, pedunculis
axillaribus subunifloris.

Germ. *Weisswurz*. Pharmac. *Sigillum Salomonis*.

Habitat in sylvis, vmbrosis frequens, *auf dem Galgenkamp*. Floret medio Maii.

183 CONVALLARIA *multiflora* foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris.

Germ. *Klein VWeisswurz*.

Habitat passim in vmbrosis, nemoribus *auf dem Galgenkamp, bey Hohenmühlen*. Floret Maio.

184 CONVALLARIA *bifolia*.

Germ. *Einblatt*.

Habitat in pratis depresso, asperis et vmbrosis,
auf dem Galgenkamp nach VVacherow. Floret Iunio.

185 ACORVS *vulgaris*.

Germ. *Kalmus, Ackerwurz*. Pharm. *Calamus vulgaris*.

Habitat in fossis paludosis vbique. *Im Stadtgraben*.

186 IVNCVS *conglomeratus* culmo nudo stricto,
capitulo laterali.

Germ. *Knopfkroetengrass*. Schreb.

Habitat in vliginosis frequens.

187 IVNCVS *effusus* culmo nudo stricto, panicula laterali.

Germ. *Buschkroetengrass*. Sch.

Habitat

Habitat in vliginosis, vmbrosis humidis *im La-debower Holz.*

- 188 IVNCVS *squarrosum* culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis aphyllis.

Habitat in vliginosis, cespitosis, *zu Helms-hagen.*

- 189 IVNCVS *articulatus* foliis nodofo-articulatis, petalis obtusis.

Germ. *Gliederkroetengrass.*

Habitat in campis aquosis, turfosis. *Im Moor beym Pottkrug auf der VViese gegen VVa-ckerow hin.* Floret Julio dantur variationes.

- 190 IVNCVS *bufonius* caule dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus.

Germ. *Kriechendes Kroetengrass.*

Habitat in inundatis.

- 191 IVNCVS *pilosus* foliis planis pilosis, corymbo ramoso.

Germ. *Haariges Kroetengrass. S.*

Habitat in sylvis, *zu Elmshagen.* Floret Aprili.

- 192 IVNCVS *campestris* foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque.

Germ. *VViesenkyroetengrass.*

Habitat in pascuis cum variationibus inter cari-ces sat frequens. Floret Maio.

- 193 RVMEX *crispus* floribus hermaphroditis: val-vulis integris graniferis, foliis lanceolatis un-dulatis acutis.

Germ. *Krauss Grindweiz.*

Habitat ad pagos agrosque passim.

194 RUMEX acutus floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenatis.

Germ. Grindwurz, wilde Rhabarber. Pharin.

Lapathum acutum.

Habitat in umbrosis, succulentis, zu Hans-hagen,

195 RUMEX aquaticus floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis.

Germ. Wassergindwurz.

Habitat ad ripas flumiiorum et paludum passim.

196 RUMEX Acetosa floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.

Germ. Wild Saurampfer.

Habitat cum variationibus in pascuis ubique.

Floret Iunio.

197 RUMEX Acetosella floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis.

Germ. Kleiner Saurampfer.

Habitat in pascuis et aruis arenosis, locisque elatis duris frequens. Floret Maio.

198 TRIGLOCHIN palustre capsulis trilocularibus sublinearibus.

Germ. nostr. Fettgras.

Habitat in pratis humidis rario, v. g. auf der
Wiese zwischen der Landstraße und Höhennühlen. Floret Iunio.

199 TRIGLOCHIN maritimum capsulis sexlocularibus ouatis.

Germ.

Germ.

Habitat in pratis depresso maritimis copiosissima, et cum praecedente.

200 ALISMA *Plantago aquatica* foliis ouatis acutis fructibus obtuse trigonis.

Germ. *Wasserwegerich, Froschlöffelkraut.*

Habitat ubique in aquosis et ad ripas fluuiorum, paludum.

201 ALISMA *Ranunculoides* foliis linear-lanceolatis, fructibus globo-squarroso-s.

Germ.

Habitat locis aquosis rario. In sylva Helms-hagensi ipse legi, locis minus umbrosis.

CLASSIS VII.
HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

202 TRIENTALIS *Europaea* foliis lanceolatis integerrimis.

Germ.

Habitat in sylvis in iuniperetis fere ubique.
Floret Iunio, rarius Maio.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

203 EPILOBIVM *palustre* foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto.

Germ.

Habitat locis depressis, humidis et irrigatis.
Statura et foliis variat. Floret Julio.

204 EPILOBIVM *hirsutum* foliis oppositis lanceolatis serratis decurrenti amplexicaulibus.

Germ. *VVasserviolein.*

Habitat ad fossas, paludes et in vepretis solo humido, *auf dem Galgenkamp.* Floret Julio et Augusto.

205 VACCINIVM *viginosum* pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis.

Germ.

Germ. nostr. *Puttegnaden, Bullgräfen.*

Habitat in vliginofis, turfosis. *Im Moor hinter dem Pottkrug.* Maturescit Iulio.

206 VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis vniifloris, foliis ferratis ouatis deciduis, caule angulato.

Germ. nostr. *Bixbeeren.* Germ. *Heidelberen* Pharmac. *Myrtillus.*

Habitat in syluis vmbrosis. Copiose *im Kirchenholz zu Hanshagen.* Floret vere, maturescit aestate.

207 VACCINIVM *Oxycoccus* foliis integerrimis reuolutis ouatis, caulibus repentibus filiformibus nudis.

Germ. *Moosbeeren, Sumpfbeeren.*

Habitat cum V. vliginofo, zu *Ludwigsburg in der Moorkoppel.* Floret Iunio.

208 ERICA vulgaris antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat locis campestribus sterilissimis frequenter.

209 ERICA Tetralix antheris bicornibus inclusis, corollis subglobosis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat locis depresso cespitosis et in ericetis rarior Gryphiae; alibi vulgaris.

TRIGYNIA.

210 POLYGONVM amphibium floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus.

terre-

a. terrestris. Germ.

Habitat in pratis argillosis, iuxta vias et agros frequens.

B. palustris. Habitat in fossis et paludibus passim copiose fluitans.

211 POLYGONVM *Hydropiper* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis.

Germ. *Bitterling*, *Wasserpfeffer*, *Flöhkraut*.

Pharin. *Perficularia*.

Habitat locis subhumidis vbiue.

212 POLYGONVM *Perficularia* floribus hexandris digynis, spicis ouato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.

Germ. *Pferdingkraut*, *Flöhkraut*.

Habitat cum variationibus in cultis.

213 POLYGONVM *auiculare* floribus octandris trigynis axillaribus, caule procumbente herbaceo.

Germ. *Wegetritt*, *Wegegrass*. Pharin. *Centumnodia*.

Habitat in viis, agris, cultis vbiue tantum non solo sterili arenoso.

214 POLYGONVM *Convolvulus* foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis.

Germ. *Vogelzung*, *Wildheidenkorn*.

Habitat in agris, inter Cannabim passim copiosissime. Floret Julio.

TETRAGYNIA.

215 PARIS *quadrifolia*.

Germ. *Einbeer*, *Wolfsbeer*.

Habitat

Habitat nemoribus rario. *Im Hohenmühler Holz* locis depressis. Floret Maio.

216 ADOXA Moschatellina.

Germ.

Habitat in nemoribus, auf dem *Galgenkamp* inter arbusta. Floret Aprili.

CLASSIS IX.

E N N E A N D R I A.

HEXAGYNIA.

217 BVTOMVS umbellatus.

Germ. *Bluhmenbinsen.*

Habitat in fossis vbique. Floret Julio.

CLASSIS X.
DECANDRIA.

MONOGYNIA.

- 218 MONOTROPA *Hypopithys* floribus lateralibus octandris, terminali decandro.
 Germ.
 Habitat in syluis rario*n* Parasitica radicum. *Im Kirchenholz zu Hanshagen.*
- 219 LEDVM *palustre*.
 Germ. *Pors.*, *Post.* Pharmac. *Rosmarinus sylvestris.*
 Habitat in paludibus viginosis turfosis *im Helmshäger Torfmoor.*
- 220 ANDROMEEEDA *Polifolia* pedunculis aggregatis, corollis ouatis, foliis alternis lanceolatis revolutis.
 Germ.
 Habitat cum praecedente, *zu Ludwigsburg in der Moorkoppel.* Floret Iunio.
- 221 ARBVTVS *vua vrfi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.
 Germ. *Baerentraube.* Pharm. *Vua vrfi.*
 Habitat rarissime in syluis. *Im Grubenhager Holz.* Semel copiose natam reperiui, postea frustra quaesiui.
- 222 PYROLA *rotundifolia* staminibus ascendentibus pistillo declinato.
 Germ. *Waldmangoldt.* Pharmac. *Pyrola.*
 Habitat in syluis rario*n*. *Im Eldenaer, Hanshäger Holz.* Floret Julio.

223 PYROLA *secunda* racemo vnilaterali,

Germ.

Habitat in sylvis caeduis rario, cuin praece-
dente *im Hanshäger Kirchenholz*.

DIGYNIA.

224 CHRYSOSPLENIUM *alternifolium*.

Germ. *Güldenmilzkraut*.

Habitat in opacis humentibus. Copiose *im Helmshäger Holz beym Moor*. Floret Ma-
io et Iunio.

225 SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reni-
formibus lobatis, caule ramoso, radice granu-
lata.

Germ. *Weisser Steinbrech*. Pharmac. *Saxi-
fraga alba*:

Habitat in apricis, *auf dem Galgenkamp*. Flo-
ret Maio.

226 SAXIFRAGA *tridactylites* foliis caulinis cu-
neiformibus trifidis alternis, caule erecto ra-
moso.

Germ.

Hab. in aruis, *zu Ludwigsburg*. Floret Maio.

227 SCLERANTHVS *annuus* calycibus fructus pa-
tulis.

Germ.

Habitat in aruis, campestribus arenosis vbique.

228 SCLERANTHVS *perennis* calycibus fructus
clausis.

Germ. *Johannis-Kraut*.

Habitat in campis apricis arenosis.

229 DIANTHVS *prolifer* floribus aggregatis capitatis: squamis calycinis ouatis obtusis muticis tubum superantibus.

Germ.

Habitat in collibus et pascuis sterilibus rario, zu Hanshagen.

230 DIANTHVS *deltoides* floribus solitariis: squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis.

Germ. Heidenelken.

Habitat in pratis duris et pascuis sterilibus pa-
sim, hinter Hohenmühlén. Floret Iunio et
Julio.

TRIGYNIA.

231 CVCBALVS *Behen* calycibus subglobosis
glabris reticulato-venosis, capsulis triloculari-
bus, corollis subnudis.

Germ.

Habitat in pratis siccis, am Wege nach Koeten-
hagen unter den Biischen. Floret Julio.

232 STELLARIA *nemorum* foliis cordatis petio-
latis, panicula pedunculis ramosis.

Germ. Waldsternbluhme.

Habitat in nemoribus, zu Hohenmühlén. Elo-
ret Maio.

233 STELLARIA *graminea* foliis linearibus inte-
gerrimis, floribus paniculatis.

Germ. Sternbluhme.

a. *Maior* foliis latioribus. Habitat in siccis, iu-
niperetis, auf dem Wall am Stadtgraben
hinter dem Collegio.

Minor

- β.** *Minor angustifolia*. Habitat in pratis humidis copiose, *bey Hohenmühlen*, huius variationes aliquot reperi. Floret Maio.
- 234** *ARENARIA peploides* foliis oviatis acutis carnosis.
Germ.
Habitat ad litora maris, *bey Wampen in dem Seedank*.
- 235** *ARENARIA trineruia* foliis ouatis acutis petiolatis nervosis.
Germ.
Habitat in syluis locisque umbrosis ubique, *auf dem Galgenkamp*. Floret Junio.
- 236** *ARENARIA serpyllifolia* foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus.
Habitat in arenosis, glareosis, aridis passim.
Floret Maio.
- 237** *ARENARIA rubra* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus.
Germ. *Sandblüthe*.
a. campestris. Habitat in collibus nudis glareosis. Floret Junio.
- β. marina.** Habitat in litoribus marinis ubique *auf dem Rosenthal*. Floret vere et serius.
- 238** *SEDV M Telephium* foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto.
Germ. *Fette Henne*. Pharm. *Telephium*.
Habitat in agris arenosis siccis rarissimum, inter *Helmshagen* et *Grubenhagen* reperi.
- 239** *SEDV M acre* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis eretiusculis alternis, cyma trifida.

- Germ. *Mauerpfeffer*. Pharmac. *Sedum minus*.
 Habitat in campis et apricis siccissimis inque te-
 ctis frequens.
- 240 **OXALIS Acetosella** scapo vniifloro, foliis ter-
 natis, radice squamoso-articulata. 240
 Germ. *Sauerklee*. Pharm. *Acetosella*. 240
 Habitat in syluis, locis subhumidis et ad radi-
 ces arborum, Floret Iunio.
- 241 **AGROSTEMMA Githago** hirsuta, calycibus
 corollam aequantibus, petalis integris nudis.
 Germ. nostr. *Radel*.
 Habitat inter Segetes nimia.
- 242 **LYCHNIS Flos Cuculi** petalis quadrifidis, fru-
 ctu subrotundo. 242
 Germ. *Kukuksbluhnte*. 242
 Habitat in pratis humidiusculis ubique. Floret
 Iunio.
- 243 **LYCHNIS dioica** floribus dioicis. 242
 a. *rubra*. Habitat in vmbrosis succulentis,
 auf dem *Galgenkamp*. Floret Maio.
 b. *alba*. Habitat locis siccis, apricis ubique,
 auf dem *Wall*. Floret aestate.
- 244 **CERASTIVM vulgatum** foliis ouatis, petalis
 calyci aequalibus, caulis diffusis.
 Habitat in pratis, areis frequens.
- 245 **CERASTIVM viscosum** erectum viscosum.
 Germ.
 Habitat in pratis macilentis, auf dem *Wall*.
- 246 **CERASTIVM semidecandrum** floribus pen-
 tandris, petalis emarginatis. 246
 Habitat in apricis, auf dem *Wall*. Floret April.
 Huic

Huic accedit CERASTIVM, quod hybrida proles, mihiique *dubium*. HORT. GRYPH. Primo vere planta vncialis aut biuncialis, in hortum illata et culta excreuit, formamque mutauit, semper dichotoma, diffusa, mire cum reliquis conueniens simulque ab iisdem differens. Habitat in vallo et alibi in apricis; cultis rario-

247 SPERGVLA *aruensis* foliis verticillatis, floribus decandris.

Germ. *Knoeterich* Nostr. *Nägenkne*.

Habitat vbique in agris et inter segetes. Floret Junio.

248 SPERGVLA *nodosa* foliis oppositis subulatis laeuiibus, caulis simplicibus.

Germ.

Habitat in campis subhumidis rario; versus *Derschau*.

CLASSIS XI.
DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

249 LYTHRUM *Salicaria* foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.

Germ. *Brauner Weiderich*.

Habitat ad ripas fossarum et paludum et in inundatis, vbiue. Floret exeunte aestate.

DIGYNIA.

250 AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis.

Germ. *Aggermennig, Odermennig* Pharmac. *Agrimonia*.

Habitat vbiue in pratis apricis argillaceis. *Auf dem Galgenkamp* inter vepretes. Floret Julio.

TRIGYNIA.

251 EUPHORBIA *Peplis* vmbella trifida: dichotoma, inuolucellis ouatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis.

Germ. *Wolfsmilch*.

Hab in cultis oleraceis vbiue. Flor. tota aestate.

252 EUPHORBIA *Helioscopia* vmbella quinquefida: trifida: dichotoma, inuolucellis obouatis, foliis cuneiformibus ferratis.

Germ. *Wolfsmilch. Milchkraut*.

Habitat in cultis rarior.

DODECAGYNIA.

253 SEMPERVIVVM *teftorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus.

Germ. *Hauslauch*. Pharm. *Sempervivum maius*.

Hab. in tectis passim. *Zu Hanshagen*. Flor. Jul.

CLASSIS

CLASSIS XII.

I S O S A N D R I A.

MONOGYNIA.

254 PRVNVS *Padus* floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis.

Germ. *Vogelkirschen*.

Habitat in sepibus, auf dem *Galgenkamp*. Floret Maio.

255 PRVNVS *Cerasus* vmbellis subfessilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis glabris.

Germ. *Kirschen*.

Habitat in syluis rario, auf dem *Galgenkamp*. Forte ex hortis allata.

256 PRVNVS *auium* vmbellis sessilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis subtus pubescentibus.

Germ. *Vogelkirschen*.

Habitat in syluis, sepibus, auf dem *Galgenkamp*.

257 PRVNVS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, rainis spinosis.

Germ. *Schleendorn*. *Schleen* Pharmac. *Acacia nostras*.

Habitat in sepibus, syluis auf dem *Galgenkamp*. Floret Aprili.

DIGYNIA.

258 CRATAEGVS *Oxyacantha* foliis obtusis subtrifidis ferratis.

Germ.

Habitat in pratis apricis duris, sepibus vbique, auf dem *Galgenkamp*.

TRIGYNIA.

- 259 *SORBVs aucuparia* foliis pinnatis vtrinque glabris.

Germ. *Sperberbaum*, *Vogelbeeren*. Pharmac.

Sorbus aucuparia.

Habitat in syluis.

PENTAGYNIA.

- 260 *MESPILVs Cotoneaster* inermis, foliis ouatis integerrimis.

Germ.

Habitat in collibus apricis, duris. Floret Vere.

- 261 *PYRVS communis* foliis ferratis, pedunculis corymbosis.

Germ. *wilder Birnbaum*.

Habitat in syluis passim, zu *Ludwigsburg*.

- 262 *PYRVS Malus* foliis ferratis, vmbellis sessilibus.

Germ. *wilder Aepfelbaum*.

Habitat in syluis cum praecedente.

- 263 *SPIRAEA Vlmaria* foliis pinnatis: impari maiore lobato, floribus cynosis.

Germ. *Geissbahrt*. Pharmac. *Vlmaria*.

Habitat in pratis vliginosis, vmbrosis, auf dem *Galgenkamp*. Floret Julio.

POLYGYNIA.

- 264 *ROSA canina* germinibus ouatis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.

Germ. *wilde Rosen*. Pharmac. *Rosa sylvestris*.

Habitat in sepibus, ad margines viarum passim.

- 265 *ROSA spinosissima* germinibus ouatis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatissimis.

Ger-

Germanis nostr. Luusbeeren.

Habitat ad aquorum margines eorumque aceruos passim.

266 *RVBVS idaeus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.

Germ. *Hindbeeren, Hohlbeeren.* Pharm. *Rubus idaeus.*

Habitat in syluis passim. *Im Busch zu Wampen beym alten Wege.*

267 *RVBVS caesius* foliis ternatis subnudis: laterilibus bilobis, caule tereti aculeato.

Germ.

Habitat in syluis et dumetis frequens.

268 *RVBVS fruticosus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.

Germ. *Brombeerstrauch, Kratzbeer.*

Habitat ad vias et in dumetis vbique.

269 *RVBVS saxatilis* foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus.

Germ.

Habitat in pratis, inter lapides, et ad litora maris elata abrupta passim.

270 *FRAGARIA vesca* flagellis reptans.

α *Sylvestris.* Germ. *Erdbeer kraut.* Pharmac. *Fragaria.*

Habitat in campis sylvestribus apricis frequen-
tissima. Floret Maio et Iunio.

271 *POTENTILLA Anserina* foliis pinnatis ferratis,
caule repente.

Germ. *Gaenserich.* Pharm. *Anserina.*

Habitat in pascuis viridis, in argillosis argentea vbiue. Floret Iunio.

272 *POTENTILLA argentea* foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto.

Germ. *Weiss Fünffingerkraut.*

Habitat in ruderatis, apricis, aufm Wall.

273 *POTENTILLA verna* foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis: caulinis ternatis, caule declinato.

Germ. *Kleinfünffingerkraut.*

Habitat in pascuis siccis, aridis, mari propinquis. Huic simillima an variatio? foliis radicalibus septenis copiose crescit passim, v. g. zu Ludwigsburg auf den Wiesen am Strande. Floret vere.

274 *POTENTILLA reptans* foliis digitatis, caule repente, pedunculis vniifloris.

Germ. *Fünffingerkraut.* Pharmac. *Pentaphyllum.*

Habitat in apricis rario, auf dem Streng. Floret Iulio.

275 *TORMENTILLA erecta* caule erectiusculo, foliis sessilibus.

Germ. *Tomentillwurzel.* Pharmac. *Tomentilla.*

Habitat in pascuis siccis vbiue. Floret Iunio et Iulio.

276 *GEVM urbanum* floribus erectis, fructu globoso

boso villoso: aristis vncinatis nudis, foliis
lyratis.

Germ. *Garaffel*. Pharmac. *Caryophyllata*.
Habitat in vmbrosis ad sepes, muros frequens.

Floret Maio.

277 *GEVM riuale* floribus nutantibus, fructu ob-
longo: aristis plumosis.

Germ.

Habitat in pratis subhumidis et ripis fossarum.

Floret Aprili.

278 *COMARVM palustre*,

Germ. *Gänsekraut, Siebenfingerkraut*.

Habitat in paludibus coenosis, inundatis vli-
ginosisque frequens, auf dem *Galgenkamp*.

Floret Iulio.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

- 279 *CHELIDONIUM maius* pedunculis virbellatis.
 Germ. *Schellkraut*. Pharm. *Chelidonium maius*.
 Habitat vbique in locis ruderatis et ad muros.
 Floret Maio et Iunio.
- 280 *PAPAVER Argemone* capsulis clauatis hispidis, caule folioso multifloro.
 Germ. *Ackermohn*.
 Habitat in campis et agris, agrorumque marginibus. Floret Maio.
- 281 *PAPAVER Rhoeas* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis.
 Germ. *Klapperrosen*. Pharm. *Rhoeas*.
 Habitat in aruis, agris cum praecedente.
- 282 *PAPAVER dubium* capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adspersis, foliis pinnatifidis incisis.
 Germ. *wilder Mohn*.
 Habitat inter segetes.
- 283 *NYMPHAEA lutea* foliis cordatis integrerrimis calyce petalis maiore pentaphyllo.
 Germ. *Seeblumen*. Nostr. *Waatermümmelken*,
Geelmümmelken.
 Habitat in Ricco eiusque fossis v. g. *Hinter den Mühlen vom Fettenthor*, et alibi. Floret Julio.

284 *NYMPHAEA alba* foliis cordatis integerrimis,
calyce quadrifido. Floret Augusto.

Germ. *Wasserrosen*. Pharm. *Nymphaea alba*.
Habitat in ricco solo profundiore.

285 *TILIA europaea* floribus nectario destitutis.

Germ. *Linde*. Pharmac. *Tilia*,

Habitat in sylvis passim.

TRIGYNIA.

286 *DELPHINIVM Consolida* nectariis monophyl-
lis, caule subdiuiso.

Germ. *Rittersporn*. Pharm. *Consolida regalis*.
Habitat in agris restilibus et inter segetes.
Floret aestate.

287 *ACONITVM Napellus* foliorum laciniis linea-
ribus superne latioribus linea exaratis.

Germ. *Eisenhütlein*.
Habitat Grubenhangæ, forte non spontanea.
Floret Julio et Augusto.

HEXAGYNIA.

288 *STRATIOTES Aloides* foliis ensiformi-trian-
gulis ciliatō-aculeatis.

Germ. *Wasseraloë*.
Habitat in aquis cum nymphaea lutea. Floret
Augusto.

POLYGYNIA.

289 *ANEMONE Pulsatilla* pedunculo involucra-
tō, petalis rectis, foliis bipinnatis.

Germ. *Küchenschellen*. Pharmac. *Pulsatilla*.
Habitat in collibus apricis exaridis rarior. v. g.
bey Grimm. Floret vere.

- 290 ANEMONE nemorosa** seminibus acutis, foliolis incisis, caule vnifloro. *Germ. nostr. Wittög schen. Pharmac. Ranunculus albus.* Habitat in asperis, duris nemoribus. *Copiosissima auf dem Galgenkamp.* Floret Aprili.
- 291 ANEMONE Ranunculoides** seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro. *Germ. nostr. Geelög schen.* Habitat in pratis nemorofis v. g. *neben dem Holz bey Hohenmühlen* et alibi. Floret Aprili.
- 292 THALICTRUM flavum** caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Germ. Wiesenraute.* Habitat in pratis subhumidis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.
- 293 RANUNCULVS Flammula** foliis ouato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Germ.* Habitat in pascuis vdis passim. Floret Iunio.
- 294 RANUNCULVS reptans** foliis linearibus caule repente. *Germ.* Habitat in pascuis invndatis et depressis interque ericeta frequens.
- 295 RANUNCULVS Lingua** foliis lanceolatis, caule erecto. *Germ.* Floret Iunio, copiosius Iulio. Habitat in fossis, aquis limofis, pratis vdis *auf der Wiese bey Eldena* et alibi.

- 296 RANUNCULVS** *Ficaria* foliis cordatis angustatis petiolatis.
 Germ. *Feigwarzenkraut*. Pharmac. *Chelidonium minus*.
 Habitat rarius in cultis, aruis, ruderatis. Floret Aprili et Maio.
- 297 RANUNCULVS** *Thora* foliis reniformibus subtrilobis crenatis: caulinus sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro.
 Germ. *Wolfsieurz*, *Leopardenwurz*.
 Habitat in hortis, cultis, oleraceis.
- 298 RANUNCULVS** *auricomus* foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis: caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.
 Germ. *Goldblumen*.
 Habitat in pascuis humidiisculis vmbrosis paucim. v. g. *Im Elmshäger Holz*.
- 299 RANUNCULVS** *sceleratus* foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis.
 Germ. *Wasserhahnenfuss*.
 Habitat ad paludes et fossas frequens. Floret Maio et Iunio.
- 300 RANUNCULVS** *bulbosus* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis composit.
 Germ.
 Habitat in pratis et pascuis siccis ubique. Floret Maio et Iunio.
- 301 RANUNCULVS** *repens* calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis reptantibus, foliis compositis.
 Germ. *Hahnenfuss*, *Krähenfuss*.
 Hab.

- Hab. in cultis passim. Floret cum praecedente.
- 302 RANVNCVLVS polyanthenios** calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis.
- Germ. *Butterblumen*.
- Habitat in pratis et locis graminosif.
- 303 RANVNCVLIS acris** calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis linearibus.
- Germ. *Butterblumen*.
- Hab. cum praecedentibus in pratis frequens.
- Floret Maio et Iunio.
- 304 RANVNCVLYS lanuginosus** calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirtis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis.
- Germ. *Seidenhanenfuß*.
- Hab. in syluis, umbrosis graminosis. *Im Grubenhäger, Elmshäger Holz.* Floret Maio.
- 305 RANVNCVLVS arvensis** seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus.
- Germ. *Stachel*.
- Hab. inter segetes aestiuas frequens. Flor. Iun.
- 306 RANVNCVLVS aquatilis** foliis submersis capillaceis, emersis subpeltatis.
- Germ. *Weisserhanenfuß, Haarkraut*.
- Hab. cuin variationibus in aquis stagnantibus, fossis, riuulis ubique. Rarior foliis omnibus capillaceis. Floret Iunio et Julio.
- 307 CALTHA palustris.**
- Germ. *Wiesenblume, Dotterblume*.
- Hab. ubique in pratis inundatis copiosissime.
- Floret Aprili.

CLASSIS XIV.
DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMA.

- 308 *AVGA pyramidalis* tetragono pyramidalis.
 Germ. *Gyldengünsel*. Pharm. *Consolida media*.
 Habitat in pratis syluaticis, duris, montosis
 siccis rarior. Inter *Eldena* et *Diedrichshagen*.
- 309 *AVGA repens* stolonibus reptantibus.
 Germ. *Kriechender Gyldengünsel*.
 Habitat in duris, montosis, subvimbrosis, bey
 Kleinzaistro am hohen Wäge gleich wenn
 man über den Bach geht.
- 310 *NEPETA Cataria* floribus spicatis, verticillis
 subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-
 serratis.
 Germ. *Katzenmünze*. Pharm. *Nepeta*.
 Habitat in ruderatis, siccis passim. Unten am
 Bollwerk bey den Salzkoten. Floret Julio.
- 311 *BETONICA officinalis* spica interrupta, corol-
 larum lacinia intermedia labii inferioris emar-
 ginata.
 Germ. *Betonie*. Pharm. *Betonica*.
 Habitat.
- 312 *MENTHA aquatica* spicis capitatis, foliis
 ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla
 longioribus.
 Germ. *Wassermünze*.
 Habitat ad ripas fluuiorum, fossarum, locis-
 que depressis vimbrosis frequens.

- 313 MENTHA *arvensis* floribus verticillatis, foliis
ouatis acutis ferratis, staminibus corollam ae-
quantibus.
Germ. *Ackernünze*.
Habitat in aruis passim, in agris post messein,
item pratis humidis, cultis, ruderatis sat
frequens. Floret aestate media.
- 314 GLECHOMA *hederacea* foliis reniformibus
crenatis.
Germ. *Gundelreben*. Pharm. *Hedera terrestris*.
Habitat vbiue locis fertilibus, in umbrosis,
ad sepes copiose. Floret Aprili et serius.
- 315 LAMIVM *album* foliis cordatis acuminatis pe-
tiolatis, verticillis vigintifloris.
Germ. *weiße Taubnessel*. Pharmac. *Lamium
album*.
Habitat ad sepes, in cultis et ruderatis vbiue
Floret Iunio.
- 316 LAMIVM *purpureum* foliis cordatis obtusis
petiolatis.
Germ. *Rothe Taubnessel*.
Habitet in cultis vbiue. Mense Martio flo-
re in apricis incipit, continuat tota aestate.
- 317 LAMIVM *amplexicaule* foliis floralibus sessi-
libus amplexicaulibus obtusis.
Germ.
Habitat passim in agris, prope vias, in hortis
rarior. *Vorm Fleischerthor*. Floret Iunio.
- 318 GALEOPSIS (*Ladanum*) internodiis caulinis
aequalibus: verticillis omnibus remotis.
Germ. *Blaue Taubnessel*.
Hab.

Habitat in aruis, agris requietis et demetitis.

Gegen Helmshagen zu. Floret Augusto.

319 GALEOPSIS (Tetrahit) Internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis. Germ. Bunte Taubnessel, Taube-todte-Nessel.

Habitat in agris et inter segetes vulgatissima. Variationes coloris ubique obviae. Floret prima aestate.

320 GALEOPSIS, *Galeobdolon* verticillis sexfloris inuolucro tetraphyllo.

Getm. Gelbe Taubnessel, Goldnessel.

Habitat in nemoribus vmbrosis, locis subhumidis, ad radices truncorum, im Holz zu Hohenmühlen, sat frequens. Floret Maio.

321 STACHYS sylvatica verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis.

Germ. Taube Heckennessel.

Habitat in nemoribus locisque vmbrosis frequens. Floret Iunio.

322 STACHYS palustris verticillis sexfloris, foliis linear-lanceolatis semiamplexicaulibus.

Germ.

Habitat in agris et cultis humidioribus et ad ripas frequens agrorum vitium. Flor. Julio.

323 BALLOTA nigra foliis cordatis indiuisis serratis, calycibus acuminatis.

Germ. Schwarzer Andorn.

Habitat ubique in ruderatis.

324 MARRUBIVM (vulgare) dentibus calycinis setaceis vncinatis (decem).

- Germ. *weisser Andorn*. Pharm. *Marrubium album*. Habitat in ruderatis, ad vias in suburbii. Floret Julio.
- 325 **LEONVRVS** (*Cardiaca*) foliis caulinis lanceolatis trilobis. Germ. *Herzgespann*. Pharm. *Cardiaca*. Habitat in ruderatis, ad domos et pagos. Floret Julio et Augusto.
- 326 **CLINOPODIVM vulgare** capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. Germ. *Wirbeldost*. Habitat in dumetis collium, locis vimbrosis aridis, auf dem Galgenkamp. Floret Julio.
- 327 **ORIGANVM** (*vulgare*) spicis subrottundis paniculatis gloomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis. Germ. *Organ*. Habitat in apricis subumbrosis sylvestribus in glareosis prope Danneberg. Floret Augusto.
- 328 **THYMVS** *Serpillum* floribus capitatis, caulis decumbentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. Germ. *Quendel*. Pharm. *Serpillum*. Habitat ubique in campis eleuatis collibusque apricis exaridis, auf dem Galgenkamp. Dantur variationes. Floret Julio.
- 329 **THYMVS** (*Acinos*) verticillis sexfloris, caulis erectis subramosis, foliis acutis serratis. Germ. *wild Basilien*.

Habitat

4 Habitat in collibus glareosits aridis rario. *Bey Derschow.* Floret Julio et Augusto.

330 SCUTELLARIA (*galericulata*) foliis cordato-dilatatis crenatis, floribus axillaribus.

Germ. *Helmkraut.*

Habitat ad fossas et ripas passum.

331 PRUNELLA *vulgaris* foliis omnibus ouato-oblongis petiolatis.

Germ. *Brunellen.* Pharm. *Pruniella.*

Habitat in pascuis et pratis sterilibus humenti-
busque frequens, *auf dem Galgenkamp.* Variatio quæ maior est et caerulea in sylvis ra-
rior, *bey Elmshagen.*

ANGIOSPERMA.

332 RHINANTHVS *Crista galli* corollaruim labio superiore compresso breuiore.

Germ. *Hahnenkamm.* Nostr. *Dofradel.*

Habitat ubique in pratis siccioribus. Floret Iunio. Foenisecum determinat.

333 EUPHRASIA *officinalis* foliis ouatis lineatis argute dentatis.

Germ. *Augentrost.* Pharmac. *Euphrasia.*

Habitat in pascuis aridis sterilibus, ubique. Floret Iunio.

334 EUPHRASIA *odontites* foliis linearibus: omni-
bus ferratis.

Germ. *Brauner Augentrost.*

Habitat in agris, pascuisque sterilibus passum copiose, *auf dem Galgenkamp.* Floret Julio.

335 MELAMPYRVM *nemorosum* floribus secundis

lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceola-tis: summis coloratis.

Germ. Johannisblume.

Habitat in pratis et nemoribus umbrosis locis succulentis frequens. Floret circa solstitium aestiuum.

336 MELAMPYRVM *pratense* floribus secundis lateralibus: coniugationibus remotis, corollis clausis.

Germ.

Habitat in pratis siccis et umbrosis passim. Floret Iunio.

337 MELAMPYRVM *syluaticum* floribus secundis lateralibus: coniugationibus remotis, corollis hiantibus.

Germ.

Habitat in sylvis sat frequens, *bey Hohemüh-lei*. Floret Iunio.

338 LATHRAEA *Squamaria* caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido.

Germ. Zahnwurz.

Habitat in sylvis umbrosis simis. *Im hohen Holz bey Eldena*. Floret Aprili et Maio.

339 PEDICVLARIS *palustris* caule ramoso, caly-cibus calloso, punctatis, corollis labio obliquis.

Germ. Läuskraut. Pharm. *Pedicularis aquatica*.

Habitat in pratis et pastuis aquofis nec non locis paludosis frequens. *Bey Wackerow*.

340 PEDICVLARIS *syluatica* caule ramoso, caly-cibus

cibus oblongis angulatis laeuis, corollis labio cordato.

Germ. *Läuskraut.*

Habitat in pratis syluaticis, nemoribus paludosis passim, zwischen Wampen und Ladebow.

341 ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis.

Germ. *Leinkraut, Harnkraut.* Pharmac. *Linaria.*

Habitat in ruderatis, ad margines et fossas agrorum passim, auf dem Gulgenkamp. Floret Julio et Augusto.

342 SCROPHVLARIA nodosa foliis cordatis trinervatis, caule acutangulo.

Germ. *Braunenrz.* Pharmac. *Scrophularia foetida.*

Habitat locis vmbrofis, humidis succulentis vbique. Hinter der Stadtmauer gegen Norden.

CLASSIS XV.

T E T R A D Y N A M I A.

SILICVLOSA.

343 *MYAGRVM satiuum* siliculis obouatis pedunculatis polyspermis.

Germ. *Leindotter.*

Habitat in agris inter Linum. Floret Julio et Augusto.

344 *DRABA verna* scapis nudis, foliis lanceolatis subincisis.

Germ. *Hungerblühmchen.*

Habitat in aruis, agris, aridis frequens. Floret primo vere, Aprili et Maio.

345 *LEPIDIVM ruderale* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis.

Germ. *Stink-Kresse.*

Habitat in ruderatis et ad vias publicas haud procul ab vrbe. *Vorm Fleischerthor.* Floret Julio.

346 *THLASPI aruense* siliquis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris.

Germ. Pharm. *Thlaspi.*

Habitat in agris frequens. Floret aestate.

347 *THLASPI Bursa pastoris* siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis.

Germ. *Taeschelkraut.* Pharm. *Bursa Pastoris.*
Hab. vbique in ruderatis cultis, apricis aridis et ad vias. Floret primo totoque vere. Habitu folio-

foliorum et statura pro soli differentia admodum differt.

349 *IBERIS nudicaulis* herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplici.

Germ.

Habitat in arenosis, syluaticis, nudis, sterilissimis, auf dem Fuchsberg bey Hohenmühl et alibi. Floret Maio et Iunio.

349 *ALYSSVM incanum* caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosif.

Germ.

Habitat in apricis, arenosis, siccis rario. Floret aestate.

351 *CARDAMINE pratensis* foliis pinnatis foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis.

Germ. *Wiesenkresse.*

Habitat in pascuis aquosis, ad fossas frequens. Floret Maio.

352 *SISYMBRIVM Nasturtium aquaticum* siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis.

Germ. *Bornkresse, Brunnenkresse.* Pharmac.

Nast. ▽.

Habitat ad fontes, ripas riuulorum passim bey Hohenmühlen. Floret aestate.

352 *SISYMBRIVM amphibium* siliquis declinatis oblongo-ouatis, foliis pinnatifidis ferratis.

Germ.

α. *Palustre* in palustribus, fossis exsiccandis.

β. *Aquaticum* in aquis profundioribus, paludibus.

- 352 *Terræstris in aquosis, irrigatis; siccis crescit*
Pro solo natali folia et corollæ color variant.
Floret in eunte æstate.
- 353 *SISYMBRIVM Sophia petalis calyce in minoribus,*
foliis decomposito-pinnatis.
Germ. Sophienkraut. Pharm. Sophia.
Habitat in ruderatis, macerii, muris, tectis
frequens. Floret Iulio.
- 354 *SISYMBRIVM Irio foliis runcinatis dentatis*
nudis, caule laeui, siliquis erectis.
Germ.
Habitat in cultis, ruderatis, hortis. Floret
Iunio et Iulio.
- 355 *ERYSIMVM officinale siliquis spicae appressis*
foliis runcinatis.
Germ. Wegsenf. Pharmac. Erysimum.
Habitat iuxta muros, in plateis et ruderatis
vbiue.
- 356 *ERYSIMVM (Barbarea) foliis lyratis extimo*
subrotundo.
Germ.
Habitat locis succulentis paßlim.
- 357 *ERYSIMVM (Alliaria) foliis cordatis.*
Germ. Knoblochskraut. Pharm. Alliaria.
Habitat in ruderatis, succulentis, et ad sepes
frequens. Floret Maio.
- 358 *HESPERIS inodora, caule simplici erecto,*
foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis.
Habitat in monticulo Galgenkamp in dumetis
frequens colore variat. Floret cum H. ma-
tronali.

359 *ARABIS thaliana* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis.

Germ.

Habitat in aruis et sabulosis aridis supra *Helmis-hagen.*

360 *TURRITIS (glabra)* foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.

Germ. *Thurmkraut, Glattthurmkraut.*

Habitat in pascuis siccis apriis, auf dem Wall.

361 *TURRITIS hirsuta* foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus.

Germ. *Rauhthurmkraut.*

Habitat in pratis syluaticis praecedenti rario.

362 *BRASSICA (campestris)* radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus.

Germ. nostr. *Knütgen?*

Habitat in agris, non argillosis, inter segregates.

363 *SINAPIS arvensis* siliquis multangulis, toro-lo-turgidis rostro longioribus.

Germ. *Ackersenf. Nostr. Küdick.*

Habitat in agris, nimis frequens inter Hordeum. Floret aestate.

364 *SINAPIS nigra* siliquis glabris apice tetragonis.

Germ. *wilder Senf. Nostr. Küdick. Pharmac. Sinapi.*

Hab.

Habitat in agris, cum praecedente, locisque
cultis, hortis ubique. Floret aestate.

365 RAPHANVS *Raphanistrum* filiisque teretibus
articulatis laevisibus vnilocularibus.

Germ. *Hederich.*

Habitat in agris et inter segetes, colore variat.

366 BNIAS *Kakile* filiisque ouatis laevibus an-
cipitibus.

Germ. *Seekohl.*

Habitat ad litora maris, bey Wampen. Floret

Julio.

367 *Thlaspi* ssp. *arvense* L. ex Willd.
et Schrad. ex Willd. ex Benth. ex DC.
Hab. in agro, et in præcipue vallis.

368 *Thlaspi* ssp. *arvense* L. ex Willd.
et Schrad. ex Willd. ex Benth. ex DC.
Hab. in agro, et in præcipue vallis.

369 *Thlaspi* ssp. *arvense* L. ex Willd.
et Schrad. ex Willd. ex Benth. ex DC.
Hab. in agro, et in præcipue vallis.

370 *Thlaspi* ssp. *arvense* L. ex Willd.
et Schrad. ex Willd. ex Benth. ex DC.
Hab. in agro, et in præcipue vallis.

371 *Thlaspi* ssp. *arvense* L. ex Willd.
et Schrad. ex Willd. ex Benth. ex DC.
Hab. in agro, et in præcipue vallis.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

367 GERANIVM (*cicutarium*) pedunculis multi-floris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis.

Germ. *Gemeinstorchenschnabel*.

Habitat in locis cultis, sterilibus, agris plateis frequens. In vallo urbis floret inde ab Aprili tota aestate.

368 GERANIVM (*syluaticum*) pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto, petalis emarginatis.

Germ. *Waldstorchenschnabel*.

Habitat in sylvis vimbrosis solo humidissculo; *bey Kleinzastnow*.

369 GERANIVM *pratense* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis pinnatolaciniatis rugosis acutis, petalis integris.

Germ. *Wiesenstorchenschnabel*.

Habitat in pratis subvimbrosis passim.

370 GERANIVM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decenniangulatis.

Germ. Pharm. *Géranium robertianum*.

Habitat in saxosis ruderatis vimbrosis et ad muros frequens, *an der Stadtmauer gegen Norden*.

371 GERANIVM *molle* pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, caule ramoso erectissculo, calycibus muticis arillis laeuisbus.

Germ.

Germ. *Weicherstorchen schnabel.*

Habitat in cultis et ad pagos passum.

372 GERANIVM rotundifolium pedunculis bifloris, petalis integris obtusis unis longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis.

Germ. *Runderstorchen schnabel.*

Habitat in cultis.

POLYANDRIA.

373 MALVA rotundifolia caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis.

Germ. *Gaensepappeln.* Nostr. *Kattenkees.* Pharm.

Malva vulgaris.

Habitat in ruderatis, viis, plateis, ubique. Floret Julio.

374 MALVA syriaca caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolatis que pilosis.

Germ. *Rosspappeln.* Nostr. *Haaspäppeln.*

Habitat in umbrosis, siccis, sepibus et plateis frequens. Floret toto autumno.

375 MALVA Alcea caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis.

Germ. *Rosenpappeln.*

Habitat in collibus apricis, dunetis, umbrosis passum, auf dem Galgenkamp. Floret exangue aestate.

supradicta. L. 172
John. 172

CLASSIS XVII. di VIII
DIADEPHIA.

376 FVMARIA (*bulbosa*) caule simplici, bracteis
in longitudine florarum.

a. Caua, radice bulbosa caua maior.

Germ. *Hohiurz*.

Habitat locis cultis, hortis. In horto academico spontanea flore et albo et purpureo.

Pharm. *Aristolochia fabacea*.

B. Media radice bulbosa non caua minor. In vmbrosis rarioe v.g. ad fossas in sylva Eldenaensi cum Farfara. Floret Aprili.

377 FVMARIA (*officinalis*) pericarpis polyspermis racemosis, caule diffuso.

Germ. *Erärauch*. Pharmac. *Fumaria*.
Habitat in agris, cultis, hortis frequens. Floret vere et serius.

OCTANDRIA.

378 POLYGALA vulgaris floribus cristatis racemosis; caulis herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linear-lanceolatis.

Germ. *Creuzblume*.

Habitat in pratis et pascauis siccis. Colore rubro, purpureo, caeruleo et albo variat. Floret.

DECANDRIA.

379 SPARTIVM (*stoparium*) foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis.

Germ. *Haasengel*.

Hab.

Habitat in sylvis locis aridis apicis, collibus siccis, sepibus passim copiose, *bey Hohenmühlen.* Floret aestate.

380 GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *AJGAMV T dT*
Germ. *Färberpfriemen.* Nostr. *Glösen.* Pharm.
Genista.

Habitat in campis, ericetis, collibus passim, *bey Kleinzwastrow.* Floret Julio.

381 ONONIS *spinosa* floribus racemosis geminis, foliis ternatis; superioribus solitariis, ramis internis subuillosis.

a. Spinoza, caule spinoso. *AJGAMV T dT*
Germ. *Hauhechel.* Pharm. *Ononis.*

Habitat in campis siccis, pratis, et ad litora maris frequens.

B. Mitis, acaule inermi. In pratis maritimis rarer. Florent Julio et Augusto.

382 ANTHYLLIS (*Vulneraria*) herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato.

Germ. *Wundkraut.*

Habitat in campis et collibus siccioribus rarer.
Bey Grimin.

383 LATHYRVS (*pratensis*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis; foliis lanceolatis.

Germ. *Wie.*

Habitat in pratis, dumetis, sepibus frequens.

384 LATHYRVS (*sylvestris*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliis ensiformibus, internodiis membranaccis.

Germ.

Germ.

Habitat in nemoribus, dumetis, sepibus passim.

385 **LATHYRVS latifolius** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, interno-diis membranaceis.

386 **VICIA (Cracca)**, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescen-tibus, stipulis integris.

Germ.

Habitat in agris inter segetes vbiue.

387 **VICIA sepium** leguminibus pedicellatis sub-quaternis erectis, foliolis ouatis integerrimis: exterioribus decrescentibus.

Germ. *Zaunwicken.*

Habitat in sepibus et vmbrofisis haud infrequens.

Floret Iunio.

388 **VICIA (satiua)** leguminibus sessilibus subbi-natis erectis, foliis retusis, stipulis notatis.

Germ.

Habitat passim inter segetes.

B. Nigra, semine rotundo nigro habitat cum priori.

389 **ERVVM (Lens)** pedunculis subbifloris, semi-nibus compressis conuexis.

Germ. *Linsen.*

Habitat nonnunquam inter segetes forte non spontanea.

390 **ERVVM (tetraspermum)** pedunculis subbiflo-ris, seminibus globosis quaternis.

Germ.

Habitat in agris et oleraceis cultis.

- 391 ERVVM (*hirsutum*) pedunculis multifloris,
seminibus globosis binis.
Germ.
Habitat in agris et hortis.
- 392 ORNITHOPVS (*perpusillus*) foliis pinnatis,
leguminibus subarcuatis.
Germ. *Vogelfuss.*
Habitat in campis arenosis, sylvestribus siccis
et sterilibus v. g. *bey Helmshagen, am Wald-*
graben bey Hindrichshagen.
- 393 ASTRAGALVS (*glycyphyllos*) caulescens pro-
stratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, fo-
liis ouatis pedunculo longioribus.
Germ. *Wildfischholz.*
Habitat in collibus nemorosis rario, *auf dem*
höchsten waldigsten Hügel bey Kleinzaßtrow.
Floret Julio.
- 394 TRIFOLIVM (*hybridum*) capitulis vimbellarib-
us, leguminibus tetraspermis, caule adscen-
dente.
Habitat in cultis et ad vias agrorum passim ra-
rior. Floret Augusto.
- 395 TRIFOLIVM (*repens*) capitulis vimbellaribus
leguminibus tetraspermis, caule repente.
Germ. *weisser Klewer.* Pharmac. *Trifolium*
album.
Habitat ubique in campis et pascuis. Floret
Julio.
- 396 TRIFOLIVM *pratense* spicis subuillosis, cinc-
ctis stipulis oppositis membranaceis, corollis
monopetalis.

Germ. *rother Klewer*, *Wiesenkleee*.

Habitat in pascuis et pratis graminosis frequens.

397 TRIFOLIUM arvense spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus.

Germ. *Haasenpoten*.

Habitat in pascuis sterilibus, montosis frequens.

398 TRIFOLIUM montanum capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, foliolis lanceolatis ferratis.

Germ. *Bergklewer*.

Habitat in pratis et collibus siccioribus paucim, *bey Kleinzaströw dīseit des Bachs*.

399 TRIFOLIUM procumbens spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulis procumbentibus.

Germ. *gelber Klewer*.

Habitat passim in aruis et inter segetes, *bey Derschow an der Landstraße, bey Gribnow*.

Floret Iunio et Iulio.

400 LOTUS corniculata capitulis depresso, caulis decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus.

Germ.

Habitat in pratis vulgatissima.

401 MEDICAGO lupulina spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente.

Germ. *Hopfenkleee*.

Habitat in pratis, aruis, cultis et fere ubique.

Floret tota aestate.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

402 HYPERICVM perforatum floribus trigynis,
caule ancipi, foliis obtusis pellucido punctatis.

Germ. Johanniskraut. Pharm. Hypericum.

Habitat in collibus, sepibus, dumetis frequens.

403 HYPERICVM quadrangulum, floribus trigynis caule quadrato herbaceo.

Germ.

Habitat in pratis et ad vias rario, an der Stadtmauer gegen Norden.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS

Semiflosculosi.

404 TRAGOPOGON pratense calycibus corollae
radium aequantibus, foliis integris strictis.

Germ. Bockbart. Pharmac. Barba Hirci.

Habitat in pratis apricis rarius, bey Hohenmühlein.

405 PICRIS Hieracioides perianthiis laxis, foliis
integrис.

Germ.

Habitat in agris eorumque versuris.

406 SONCHVS arvensis pedunculis calycibusque
hispidis, foliis runcinatis, basi cordatis.

Germ.

Germ. *Ackerdistel*.

Habitat inter segetes, in agris argillofis et requietis frequens.

407 *SONCHVS oleraceus* pedunculis tomentosis, calycibus glabris. $\alpha)$ *laevis*. $\beta)$ *asper*.

Germ. *Hasenkohl*, *Milchdistel*.

Habitat solo laetiori culto ruderato frequens, foliorum laciniis et asperitie varians.

408 *LACTVCA virosa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis.

Germ.

Habitat in aggeribus, sepibus raro, *bey der Wallmühle*. Floret Iulio.

409 *PRENANTHES muralis* flosculis quinis, foliis runcinatis.

Germ.

Habitat in nemoribus et vimbrosis, *an der Stadtmauer gegen Norden*. Floret Iulio.

410 *LEONTODON (Taraxacum)* calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laevis.

Germ. *Pfaffenzähnlein*, *Dotterblühne*. Nostr. *Butterblühne*. Pharm. *Taraxacum*.

Habitat in pascuis locisque cultis et ruderatis vbique. Floret tota vere; in vallo Martio incipit.

411 *LEONTODON (autumnale)* caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.

Germ.

Habitat in pratis et pascuis, autumno.

**412 LEONTODON (*hispidum*) calyce toto erecto,
foliis dentatis integerimis hispidis: pilis fur-
catis.**

Germ.

Habitat in pratis vmbrosis, sepibus, *auf dem
Galgenkamp.* Floret Augusto.

**413 HIERACIVM *Pilosella* foliis integerimis oua-
tis, subtus tomentosis, caule repente, scapo
vnifloro.**

Germ. *Mausohr.*

Habitat in pascuis aridis, collibus, aggeribus
vbique. Floret Iunio et Julio.

**414 HIERACIVM *dubium* foliis integris ouato-
oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo
multifloro.**

Germ.

Habitat in aggeribus, marginibusque agrorum
rarior, *bey Hohenmühlen nach Hindrichsha-
gen hin.* Floret cum praecedente.

**415 HIERACIVM *muronum* caule ramoso, foliis
radicalibus ouatis dentatis, caulino minore.**

Germ.

a. *Syluaticum folio glabro.* Habitat in syluis
et vmbrosis durioribus passim.

B. *Myophorum.* Habitat in pinetis et fagetis
rarior, *zu Hanshagen im Kirchenholz.* Flo-
ret aestate.

**416 HIERACIVM *paludosum* caule paniculato,
foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calyci-
bus hispidis.**

Germ.

Hab.

- Habitat in nemoribus paludosis et vmbrosis.
Floret aestate.
- 417 *HIERAGIVM sabaudum* caule erecto multi-floro, foliis ouato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus.
Germ. *Habichtkraut.*
Habitat in vmbrosis, *bey Hohenmühl und Wampen.* Floret aestate.
- 418 *HIERACIVM umbellatum* foliis linearibus sub-dentatis sparsis, floribus subvimbellatis.
Germ.
Habitat in pascuis apricis siccis rario, *bey Kleinzaftrow:* in Rugia passim copiose. Floret augusto.
- 419 *CREPIS tectorum* foliis lanceolato-runcinatis sessilibus laevis: inferioribus dentatis, caule glabro.
Germ.
Habitat in apricis, aridis. Floret aestate.
- 420 *HYOSERIS minima* caule diviso nudo, pedunculis incrassatis.
Germ.
Habitat in aruis, ad agros et agrorum aggeres. Copiose *bey Kleinzaftrow;* rario inter *Ladebow* et *Wampen.* Floret Iulio.
- 421 *LAPSANA communis* calycibus fructus angustatis, pedunculis tenuibus ramosis simis.
Germ. *Rainkohl.*
Habitat in cultis, oleraceis, ruderatis frequens.
- 422 *CICHORIVM Intybus* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis.

Germ. *Wegwart*, *Hindläufte*. Pharm. *Cichoreum*.

Habitat ad margines agrorum viarumque, vor dem *Fleischerthor*.

Capitati.

423 ARCTIVM (*Lappa*) foliis cordatis inerimibus petiolatis. α . capitulis tomentosis. β) non tomentosis.

Germ. *Klettendistel*. Pharm. *Bardana*.

Habitat in cultis ruderatis vbique.

424 SERRATVLA *tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, flosculis conformibus.

Germ. *Schartenkraut*.

Habitat in pratis, interque dumeta passim, *bey Wampen neben der Trift*. Floret Augusto.

425 SERRATVLA *arvensis* foliis dentatis spinosis. Germ. *Saudistel*, *Ackerdistel*.

Habitat in cultis, agris, hortis vbique nimia.

426 CARDVVS *lanceolatus* foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis diuaricatis, calycibus ouatis spinosis villosis, caule piloso.

Germ. *Distel*, *grosse Distel*.

Habitat in cultis ruderatis.

427 CARDVVS *acunthoides* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis.

Germ. *Distel*, *Wegdistel*.

Habitat in ruderatis, ad pagos et sepes.

429 CARDVVS *crispus* foliis decurrentibus sinuatibus,

tis, margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus inermibus.

Germ. *Distel*, *krause Distel*.

Habitat in agris, cultis et ruderatis.

429 *CARDVVS palustris* foliis decurrentibus: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus.

Germ. *Sumpfdistel*.

Habitat in pratis subpaludosis et vimbrosis humidis frequens.

430 *CARDVVS (acaulis) acaulis* calyce glabro.

Germ. *Herbstdistel*.

Habitat in pascuis apricis depresso, zwischen Hindrichshagen und Derschow. Floret Augusto.

431 *CNICVS oleraceus* foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis subcoloratis integris concavis.

Germ. *Kohldistel*.

Habitat ad fossas vimbrosas et in pratis nemorosis humidis frequens, bey Hohenmühlen. Floret Augusto.

432 *CARLINA vulgaris* caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calycibus radio albis.

Germ. *Sooddistel*, *Gemein Eberwurz*.

Habitat in montosis, aridis, sabulosis passim.

Floret Augusto.

433 *BIDENS tripartita* foliis trifidis, calycibus subsoliosis, feminibus erectis.

Germ. *Zweyzahn*.

Habitat in aquofis, fossis, vbi aquae pluuiiales
stagnant, frequens.

434 BIDENS cernua seminibus erectis, foliis lan-
ceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis.

Germ.

Habitat ad fossas et fontes minus frequens.

435 EVPATORIVM (cannabinum) foliis digitatis.

Germ. *Wasserdsten*. Pharm. *Eupatorium*.

Habitat ad aquas inque fossis, *bey Hohenmüh-*
len et alibi frequens. Floret Julio.

POLYGAMIA SVPERFLVA.

436 TANACETVM vulgare foliis bipinnatis incisis
ferratis.

Germ. *Reinfahren*. Pharm. *Tanacetum*.

Habitat in siccis pratis, aggeribus et margini-
bus agrorum frequens.

436 ARTEMISIA vulgaris foliis pinnatifidis pla-
nis incisis: subtus tomentosis, racemis simpli-
cibus, floribus ouatis: radio quinquefloro.

Germ. *Beyfuss*, *Stabwurz*. Pharm. *Artemi-
sia rubra alba*.

Habitat in cultis, ruderatis vbique.

438 ARTEMISIA campestris foliis multifidis linea-
ribus, caulibus procumbentibus.

Germ. *Feldwermuth*.

Habitat in campis apricis, arenosis, aridis;
bey Hanshagen.

439 ARTEMISIA maritima foliis multipartitis to-
mentosis, racemis cernuis, flosculis femi-
neis ternis.

Germ.

Germ. *Seewermuth.*

Habitat ad litora maris.

440 *ARTEMISIA Absinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo.

Germ. *Wermuth.* Pharm. *Absinthium vulgare.*

Habitat in ruderatis et ad pagos ubique.

441 *GNAPHALIVM arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule simplicissimo, corymbo composito.

Germ. *Reinblumen.* Pharm. *Stoethas citrina.*

Habitat in campis apricis sterilibus arenosis *bey Neuenkirchen und Derschow.* Floret Julio et Augusto.

442 *GNAPHALIVM dioicum* farmentis procumbentibus caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis.

a. mas flore rotundiore.

B. femina flore et folio longiore.

Germ. *Katzenpfötgen.* Nostr. *Kattenpoten.*

Pharm. *Gnaphalium.*

Habitat in apricis aridis ericetis frequens. Floret Maio.

443 *GNAPHALIVM syluaticum* caule simplicissimo floribus sparsis.

Germ.

Habitat in sylvis arenosis, *bey Koetenhagen.* Floret Julio.

444 *GNAPHALIVM viginosum* herbaceum, caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus.

Germ. *Wegruhrkraut.*

Hab.

Habitat vbi aquae hyemali tempore stagnarunt
saepe in ipsis viis, frequens. Floret aestate.

- 445 ERIGERON acre** pedunculis alternis vniifloris.
Germ.

Habitat in apricis montosis sterilibus arenosis
passim.

- 446 TVSSILAGO Farfara** scapo imbricato vniifloro,
foliis subcordatis angulatis denticulatis.

Germ. *Hufattich.* Pharm. *Farfara.* *Tussilago.*
Habitat ad agros argillosos et fossas glareae, fa-
rinaeae passim, *bey Eldena.* Floret Mar-
tio et initio Aprilis.

- 447 TVSSILAGO Petasites** thyrso ouato, floscu-
lis omnibus hermaphroditis.

Germ. *Pestilenzwurz.* Pharm. *Petasites.*

Habitat locis ruderatis. *Vor dem Fleischerthor
am Stadtgraben.* Floret Aprili.

- 448 SENEPIO vulgaris** foliis pinnato-sinuatis am-
plexicaulibus, floribus nudis sparsis.

Germ. *Creuzwurz.*

Habitat in cultis, ruderatis, plateis vbiue.

Floret toto vere et aestate.

- 449 SENEPIO Jacobaea**, corollis radiantibus, fo-
liis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule
erecto.

Germ. *Jacobskraut.*

Habitat pasuis et pratis montosis frequens,
auf dem Wall. Floret Julio.

- 450 ASTER Tripolium** foliis lanceolatis integerri-
mis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus
corymbosis.

Germ.

Germ. *Wassersternbluhme*.

Habitat in litoribus marinis, et fossis falsis frequens, auf dem Rosenthal, bey der Salzhütte. Floret Augusto, copiosius Septembri.

451 SOLIDAGO *Virgaurea* caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis consertis.

Germ. *Goldrutha*. Pharm. *Virga aurea*.

Habitat in pascuis siccis, aggeribus, muris frequens. Floret Augusto.

452 INVLA *Helenium* foliis amplexicaulibus ouatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ouatis.

Germ. *Alandwurz*. Pharm. *Enula*.

Habitat in pratis depresso et ad fossas, zu Friedrichshagen und Grubenhagen.

453 INVLA (*Britannica*) foliis amplexicaulibus lanceolatis distinctis ferratis, subtus villosis, caule rimofo villoso erecto.

Germ.

Habitat in campis et pratis subhumidis, nec non pascuis falsis, auf dem Galgenkamp und bey Wampen.

454 INVLA *Pulicaria* foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis.

Germ. *Flohkraut*.

Habitat ad vias ubi aquae pluviales stagnarunt frequens.

455 ARNICA *montana* foliis ouatis integris, caulinis geminis oppositis.

Germ. *Wollverley*, *Mutterwurz*, *Johannisbluhme*. Pharm. *Arnica*.

Hab.

- Habitat in collibus pratenibus apricis *bey Grimm*, in syluis sterilibus *bey Hanshagen*.
- 456 BELLIS (*perennis*)** scapo nudo vniifloro.
 Germ. *Gänseblümchen*, *Marienblumen*, *Marl-blühmchen*. Pharm. *Bellis minor*.
 Habitat in campis apricis roridis vbique. Floret toto fere anno vix niue fuganda.
- 457 CHRYSANTHEMVM** *segetum* foliis amplexicaulibus superne laciniatis inferne dentato-serratis.
 Germ. Nostr. *Wokerblume*. Pharm. *Bellis pratensis*.
 Habitat inter segetes aestiuas, præfertim hordeo frequens agrorum vitium. Floret Iulio et serius.
- 458 CHRYSANTHEMVM** *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis inferne dentatis.
 Germ.
 Habitat in pratis siccioribus, aggeribus passim, *bey Kleinzaftrow*. Floret Iulio.
- 459 MATRICARIA** *Parthenium* foliis compositis planis: foliolis ouatis incisis, pedunculis ramosis.
 Germ. *Mutterkraut*, *Mater*. Pharmac. *Matricaria*.
 Habitat in cultis, ruderatis circa urbem. Floret aestate.
- 460 MATRICARIA** *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus.

Germ

Germ. *Chamillen*, nostr. *Kamellen*. Pharmac.
Chamomilla nostras.

Habitat in cultis, ruderatis, agris fecalinis frequens.

461 ANTHEMIS *Cotula receptaculis conicis*, paleis setaceis, seminibus nudis.

Germ. *Kräten-dill*. Nostr. *Hundsblume*. Pharm.
Cotula foetida.

Habitat ad vias, plateas, in ruderatis et agris vbique. Floret aestate.

462 ANTHEMIS *arvensis*, receptaculis conicis, lanceolatis, seminibus coronato-marginatis.

Germ. Nostr. *wilde Kamellen*.

Habitat in aruis et agris requietis frequens.

463 ACHILLAEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis.

Germ. *wilder Bertram*. Pharm. *Ptarmica*.

Habitat in pratis humectis et ad sepes, auf dem *Galgenkamp*, bey *Wampen*. Floret Augusto.

464 ACHILLAEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis laciniis linearibus dentatis, caulis sulcatis.

Germ. *Schafgarbe*. Nostr. *Reinfahren*. Pharm. *Millefolium*.

Habitat in pascuis et pratis siccioribus vbique. Variat purpureo et albo colore.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

465 CENTAVREA *scabiosa* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis.

Germ. *Hartkopf*. Nostr. *Hartkopf?*

Habitat in pratis sterilibus, marginibus agrorum,

rum, et ripis praeruptis maritimis frequens.
Floret Augusto.

- 466 CENTAVREA *Iacea*** calycibus squamosis, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis.

Germ.

Habitat in pratis campisque apricibus duris,
auf dem Galgenkamp. Floret Augusto.

- 467 CENTAVREA *Cyanus*** calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis.

Germ. *Kornblühme.* Nostr. *Trempern.* Pharm.
Cyanus.

Habitat in agris fecalinis et triticeis saepe nimis abundans. Variat corolla albida. Floret Julio.

POLYGAMIA NECESSARIA.

- 468 FILAGO *pyramidata*** caule dichotomo erecto, capitulis globosis axillaribus terminalibusque.

Germ. *Ruhrkraut.*

Habitat in agris, campis et secus vias passum.

- 469 FILAGO *montana*** caule erecto diuiso, floribus pyramidatis lateralibus exillaribusque.

Germ. *Bergruhrkraut.*

Habitat in fabulosis, montosis, aridis, *bey Ugnade.*

- 470 FILAGO *aruensis*** floribus conicis lateralibus, caule paniculato.

Germ. *Ackerruhrkrant.*

Habitat in campis fabulosis passum. Filagines florent exeunte aestate.

MONOGAMIA.

471 *IASIONE montana*.

Germ.

Habitat in aruis et collibus aridis arenosis paſſum. Zwischen Helmshagen und Hohenmühlen.

472 *VIOLA odorata*, acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus.

Germ. Märzviolen. Nostrat. Blauögschen.

Pharm. *Viola*, *Violaria*.

Habitat in graminosis apricis vmbrosis collibus paſſum. Floret Aprili, rarius Martio.

473 *VIOLA canina* caule adultiore ascendentē, foliis oblongo-cordatis.

Germ. Hundsviolen.

Habitat in vmbrosis vbique. Floret Aprili, *odorata* serius.

474 *VIOLA palustris*, acaulis foliis reniformibus.

Germ. Sumpviolen.

Habitat in pratis humidis, ericetis locisque subudis. Zwischen Hindrichshagen und Subsow. Floret Maio.

475 *VIOLA tricolor* foliis oblongo incisis, stipulis dentatis, caule triquetro diffuso.

Germ. Freisamkraut, Stiefmütterchen.

a. bicolor flore candido et luteo, habitat vbique in sterilibus aruis, hortis, tectis.

B. bicolor flore caeruleo et candido, habitat cum praecedente rarer. Floret Aprili et serius. *Tricolor* visa nondum fuit spontanea, tametsi in hortis nascatur.

476 IMPATIENS noli tangere pedunculis multifloris solitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus.

Germ. *Springkraut*.

Habitat in fossis nemorosis umbrosis humidis passim copiose v. g. im Graben am Wege wenn man von Eldena nach Kaetenhagen geht. Floret Julio.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

477 ORCHIS (*Morio*) bulbis indiuisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso, petalis omnibus connuentibus.

Germ. *Knabenkraut.*

Habitat in pratis et sylvis subhumidis passim,
bey Hohenmühlen.

478 ORCHIS (*conopsea*) bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio crenato.

Germ.

Habitat in pratis nemorosis passim, *bey Hohenmühlen und Hindrichshagen.*

479 ORCHIS *maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breuiore: labio plano, petalis dorsalibus patulis.

Germ. *geflecktes Knabenkraut.*

Habitat in pratis depressis, frequens.

480 ORCHIS *latifolia* bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.

Germ. *Breitblättriches Knabenkraut.*

Habitat in pratis humidioribus et vimbrosis frequens. Floret Iunio, rarius Maio, cum affinibus.

481 OPHRYS *ouata* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido.

Germ. *Zweyblatt.*

Habitat in pratis humidioribus sylvestribus.
Copiose bey Hohenmühlen.

482 OPHRYS *Nidus avis* bulbis fibroso-fascicula-
tis, caule vaginato, nectarii labio bifido.

Germ. *Vogelnest.*

Habitat in sylva Eldenaensi locis umbrosissi-
mis; aliquoties a me lecta inter Kaetenha-
gen et Friedrichshagen.

483 SERAPIAS *Helleborine* bulbis fibrosis, necta-
rii labio obtuso petalis breuiore.

Germ.

Habitat in sylva Grubenhagensi. Figura folio-
rum variat. Floret Julio et Augusto.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

DIANDRIA.

- 484 LEMNA (*polyrrhiza*) foliis sessilibus, radicibus confertis.

Germ.

Habitat in paludibus et fossis.

- 485 LEMNA (*minor*) foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis.

Germ. *Wasserlinsen*.

Habitat in aquis stagnantibus et quietis.

- 486 LEMNA *trifolia* foliis petiolatis lanceolatis.

Habitat in riuulis lente fluentibus, fossis et aquis altioribus passim.

TRIANDRIA.

- 487 TYPHA (*angustifolia*) foliis semicylindricis, spica mascula semineaque remotis.

Germ.

Habitat ad ripas piscinarum et paludum passim.

Im Rickfluss.

- 488 SPARGANIVM (*erectum*) foliis erectis triangularibus.

Germ.

Habitat in fossis et piscinis frequens.

- 489 CAREX *pulicaris* spica simplici androgyna.

Germ. *Kleinriedgras*.

- Habitat in paludibus limo repletis aestate vix siccandis accessu difficilioribus. *Im Grubenhäger Torfmoor.*

- 490 CAREX *vulpina* spica supra decomposita in-

ferne laxiore, spiculis androgynis ouatis sessilibus glomeratis superne masculis.

Germ. *Fuchsriedgras.*

Habitat in Vepretis et iuxta aquas passim.

491 CAREX *filiformis* spica mascula oblonga, feminis sessilibus oblongis: inferiore foliolo propiore breuiore.

Germ. *dünnes Riedgras.*

Habitat in nemoribus, *bey Hohenmühl.*

492 CAREX *limosa* spicis ouatis pendulis: masculina longiore erectiore, radice repente.

Germ. *Sumpfriedgras.*

Hab. in paludibus limosis profundis syluaticis.

493 CAREX *cespitosa* spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro.

Germ. *Raaseriedgras.*

Habitat in paludibus cespites virides constituens.

494 CAREX *vesicaria* spicis masculis pluribus feminis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis.

Germ. *blasigtes Riedgras.*

Habitat ad fossas frequens.

495 CAREX *acuta* spiculis masculis pluribus, feminis subsessilibus, capsulis obtusiusculis.

Germ. *spitziges Riedgras.* Sch.

Habitat $\alpha)$ maior ad fossas et ripas riuulorum passim, $\beta)$ minor in pratis frequens humentibus.

496 CAREX *hirta* spiculis masculis pluribus, feminis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis.

Germ. *rauhes Riedgras.*

Hab.

Habitat in fuccis glareosis passim. Carices pleraque vere florent.

TETRANDRIA.

497 BETVLA (*alba*) foliis ouatis acuminatis seratis.

Germ. *Birke.* Pharmac. *Betula.*

Habitat in syluis haud frequens.

498 BETVLA (*Alnus*) pedunculis ramosis.

Germ. *Aerle, Eller.*

Habitat in syluis locis humidis et ad riuulos.

499 VRTICA (*vrens*) foliis oppositis oualibus.

Germ. *Eiterneßel.*

Habitat in anaceriis, sepibus, cultis vbique.

Floret Iunio.

500 VRTICA (*dioica*) foliis oppositis cordatis, racemis geminis.

Germ. *Brennueßel, Waldneßel.* Pharm. *Vrtica maior.*

Habitat vbique ad domos, sepes, et in locis cultis et ruderatis. Floret Iunio et serius.

PENTANDRIA.

501 XANTHIVM (*strumarium*) caule inermi, foliis cordatis trineruatis.

Germ. *Bettlerläus.* Pharm. *Xanthium.*

Habitat in ruderatis et sterquiliniis frequens.

POLYANDRIA.

502 MYRIOPHYLLVM *spicatum* floribus masculis interrupte spicatis.

Germ.

Habitat in paludibus et fossis. Floret Julio.

503 SAGITTARIA *sagittifolia* foliis sagittatis acutis.

Germ. *Pfeilkraut.*

Habitat ad ripas fluvii Ricci.

504 QVERCVS *Robur* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis.

Germ. *Eiche.* Pharmac. *Quercus.*

Habitat in syluis.

505 FAGVS *sylvatica* foliis ouatis obsolete ferratis.

Germ. *Büche, Buchbaum.* Pharm. *Fagus.*

Habitat in syluis, sylvas vastas constituens.

506 CARPINVS *betulus* squamis strobilorum planis.

Germ. *Hagbütche.*

Habitat in sylvis et nemoribus locis depresso humidis.

507 CORYLVS *Auellana* stipulis ouatis obtusis.

Germ. *Hasselstaude.* Pharm. *Corylus.*

Habitat in syluis et sepibus. Floret Ianuario et Februario.

MONADELPHIA.

508 PINVS *syliestris* foliis geminis primordiali libus glabris.

Germ. *Fichte, Fichtenbaum.* Pharm. *Pinus.*

Habitat in syluis locis eleuatis siccis, passim.

Sylvas ipsa constituit v. g. *Hanshagen.*

509 PINVS *Abies* foliis subulatis mucronatis lae-
uibus bifariam versis.

Germ. *Tanne*. Pharmac. *Abies*.

Habitat in sylvis cum praecedente.

SYNGENESIA.

510 BRYONIA (*alba*) foliis palmatis vtrinque cal-
loso-scabris.

Germ. *Zaunrübe*. Pharmac. *Bryonia*.

Habitat in sepibus, ad pagos et domus haud
infrequens. *Zwischen den Gärten*. Floret
Julio.

CLASSIS XXII.
D I O E C I A.

DIANDRIA.

511 *SALIX vitellina* foliis ferratis ouatis acutis
glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis callo-
so-punctatis.

Germ. *Zähweiden.*

Habitat ad pagos et domus, forte allata.

512 *SALIX amygdalina* foliis ferratis glabris, foliis
pentandris.

Germ. *Rothe Srockweiden.*

Habitat ad fossas et in paludibus passim.

513 *SALIX fragilis* foliis ferratis glabris, ouato-
lanceolatis, petiolis dentato glandulosis.

Germ. *Srockweiden.*

Habitat ad domos et pagos, nec non in sylvis
rarior.

514 *SALIX purpurea* foliis ferratis glabris lanceo-
latis: inferioribus oppositis.

Germ. *Rheinweiden, gelbe Zähweiden.*

Habitat ad fossas et pagos plantata.

515 *SALIX arenaria* foliis integris ouatis acutis,
supra subuillosis, subtus tomentosis.

Germ.

Habitat in pascuis vdis et ad paludes.

516 *SALIX incubacea* foliis integerrimis lanceola-
tis: subtus villosis nitidis, stipulis ouatis acutis.

Germ. *Bruchweiden.*

Habitat in pascuis duriusculis, viginosis.

- 517 *SALIX caprea* foliis ouatis rugosis: subtus tomentosis, vndatis superne denticulatis.
Germ. *Palmweiden*.
Habitat in nemorosis, siccis.
- 518 *SALIX viminalis* foliis subintegerrimis lanceolato linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis.
Germ. *Korbweiden, Aehntsweiden*.
Habitat in syluis et ad pagos.
- 519 *SALIX cinerea* foliis subferratis oblongo-ouatis: subtus subvillosis, stipulis dimidiato cordatis.
Germ.
Habitat in paludosis subhumidis.
- 520 *SALIX alba* foliis lanceolatis acuminatis ferratis vtrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis.
Germ. *wisse Weiden, Silberweiden, Zahneiden*.
Habitat ad pagos et domus.
- Incpta adhuc est Salicum familia ob varietates, pro solo obuias. Hinc certas aliquot species tantum adtuli, quum plures omnino sponte circa Gryphiam crescant. Id quod nomintum gerinanorum copia testatur. Ad do *Salicem politundram* Staminibus octo ad decem, quae frutex est et in huinidis auf dem *Galgenkamp* crescit.

TETRANDRIA.

- 521 *VISCUM album* foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus.
Germ. *Mispel. Pharmac. Viscum*.

Hab.

Habitat in sylvis parasitica in truncis arborum rarioꝝ. In sylva Eldenaensi.

PENTANDRIA.

522 CANNABIS sativa.

Germ. *Hanf*. Pharm. *Cannabis*.

Habitat in ruderatis prope urbem copiose, et alibi ad pagos et sepes.

523 HVMVLVS *Lupulus*.

Germ. *Wilder Hopfen*. Pharm. *Lupulus*.

Habitat in sepibus passim; *hinter der Stadtmauer*. Ex hortis aufuga.

OCTANDRIA.

524 POPVLVS *alba* foliis subrotundis dentato angulatis subtus tomentosis.

Germ. *weisse Pappeln*. Nostr. *Abelen*.

Habitat in sylvis et ad domos passim.

525 POPVLVS *tremula* foliis subrotundis dentato angulatis vtrinque glabris.

Germ. *Afspan*. Nostr. *Fauläschchen*.

Habitat in sylvis passim.

526 POPVLVS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis ferratis.

Germ. *schwarze Pappeln*. Pharm. *Populus*.

Habitat ad pagos et in sepibus rarioꝝ.

ENNEANDRIA.

528 MERCVRIALIS *perennis* caule simplicissimo, foliis scabris.

Germ.

Germ.

Habitat in syluis, vmbrosis rarior, *bey Eldena.*

529 MERCVRIALIS *annua* caule brachiato, foliis
glabris, floribus spicatis.

Germ. *Bingelkraut.* Pharm. *Mercurialis.*
Habitat in cultis, oleraceis, hortis passim
copiose.

530 HYDROCHARIS (*morsus ranae*).

Germ. *Froschbiss.*

Habitat in fossis limosis vbique.

MONADELPHIA.

531 IVNIPERVS *communis* foliis ternis patentibus
mucronatis bacca longioribus.

Germ. *Wacholderstrauch.* Nostrat. *Knirk.*
Pharmac. *Iuniperus.*

Habitat in apricis, duris, ericetis vbique. Sem-
per frutex humilis, arbor nondum visa.

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.

MONOECIA.

- 531 *HOLCVS lanatus* gluinis bifloris villosis: hermaphrodito mutico, masculo aristा recurva.
 Germ. *Wollichtes Darrgrass*. Schr.
 Habitat in pascuis, vt plurimum arenosis.
- 532 *VALANTIA Crucifera* floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis.
 Germ. *Gülden Waldmeister*, *Creuzkraut*,
gelb Creuzkraut, *rauch Meyerkraut*.
 Habitat in dumetis rarior, *bey Kleinzastrow*.
- 533 *PARIETARIA officinalis* foliis lanceolatis ouatis alternis.
 Germ. *Glasskraut*. Pharmac. *Parietaria*.
 Habitat in ruderatis, vimbrosis. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden* copiose. Floret Augusto.
- 534 *ATRIPLEX laciniata* caule herbaceo foliis deltoidibus dentatis, subtus argenteis.
 Germ.
 Habitat in littoribus maritimis.
- 535 *ATRIPLEX hastata* caule herbaceo, valuulis semineis magnis deltoidibus sinuatis.
 Germ.
 Habitat paſſim in cultis, ruderatis.
- 536 *ATRIPLEX patula* caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus leminum disco dentatis.

Germ.

Germ. *Wilde Melden.*

Habitat in ruderatis, cultis, agris.

537 *ATRIPLEX litoralis* caule herbaceo erecto,
foliis omnibus linearibus integerrimis.

Germ.

Hab. in littoribus maris, *bey Wampen.* Flo-
ret Iulio.

538 *ACER Platanoides*, foliis quinquelobis acu-
minatis acute dentatis glabris, floribus corym-
bosif.

Germanis *Lönn.*

Habitat in syluis passim.

DIOECIA.

539 *FRAXINVS excelsior* foliolis ferratis, floribus
apetalis.

Germ. *Aesche.* Pharmac. *Fraxinus.*

Habitat in syluis et ad pagos et domus.

CLASSIS XXIV.
CRYPTOGAMIA.

FILICES.

- 540 *EQUISETUM (syluaticum)* caule spicato, frondibus compositis.
 Germ.
 Habitat in sylvis desertis eoruinque pratis.
- 541 *EQUISETUM (aruense)* scapo fruticante nudo, sterili frondoso.
 Germ. (*scapus fructificans*) *Duwock* (*sterilis frondosus*).
 Habitat in pratis, aruis, saepe et in agris calamitosa.
- 542 *EQUISETUM (palustre)* caule angulato, frondibus simplicibus.
 Germ.
 Habitat locis paludosis, fossis limosis et aquosis.
- 543 *EQUISETUM (fluviatile)* caule striato, frondibus subsimplicibus.
 Germ.
 Habitat ad ripas riuulorum.
- 544 *EQUISETUM (hyemale)* caule nudo scabro, basi lùbramofo.
 Germ. *Schaffruss*.
 Habitat in sylvis viginosis asperis passim.
- 545 *OSMVNDA (Lunaria)* scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria.
 Germ.
 Habitat in pratis et pasuis apricis fccioribus rarissi-

rarissime. Am Wege bey Kleinzaftrow gleich wenn man über den Bach geht.

546 OSMVNDA regalis frondibus bipinnatis apice raceiniferis.

Germ.

Habitat in Hanshagen et alibi locis longius ab vrbe remotis.

547 ACROSTICHVM (Septentrioiale) fronde nuda linearie laciniata.

Germ.

Habitat in rimis murorum locis ruderatis umbrosis rarissimum.

548 ASPLENIUM (Trichomanes) frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis.

Germ.

Habitat cum praecedente rarissimum.

549 ASPLENIUM (Ruta muraria) frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis.

Germ. *Mauerraute.*

Habitat cum praecedente sed frequentior.

550 PTERIS (aquilina) fronde supra decomposita foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus.

Germ.

Habitat in sylvis praeustis exaridis frequens.

551 POLYPODIUM vulgare frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtusis, radice squamata.

Flora.

I

Germ.

Germ. *Engeliis.* Pharm. *Polypodium.*

Habitat rarissimum in sylvis umbrosissimis ad lapides, *bey Hanshagen.*

552 POLYPODIVM (*Phragopteris*) fronde subbipinnata: foliolis insimis reflexis; paribus pinnula quadrangulari adunatis.

Habitat in Fageticis passim.

553 POLYPODIVM (*Filix mas*) fronde bipinnata; pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo.

Germ.

Habitat passim in sylvis.

554 POLYPODIVM (*Filix femina*) fronde bipinnata: pinnis lanceolatis acutis pinnatifidis.

Germ.

Habitat in umbrosis et apricis salicetis humidis.

MUSCI.

555 LYCOPODIVM clavatum foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis.

Germanis.

Habitat in sylvis umbrosis.

556 SPHAGNVM palustre ramis deflexis.

Habitat in paludibus turfosis et ad aquas stagnantes frequens, stagna replens.

557 POLYTRICHVM (commune) caule simplici, anthera parallelepipedata.

Dantur variationes α) *vulgatum* siue maius.
 β) *glaucum* siue medium γ) *pilosum* f. minus.

Habitat α) in vliginosis β) pascuis et monto-
sis subhumidis γ) arenosis, siccis, sterilissimis.

558 MNIVM (*pellucidum*) caule simplici, foliis
ouatis.

Habitat in pascuis succulentis vmbrosis. *Am
Stadtgraben unter den Weiden.*

559 MNIVM (*hygrometrum*) acaule, anthera
nutante, calyptora reflexa tetragona.

Habitat in apricis, vmbrosis, sterilibus, vel
paullo fertilioribus. *Hinter der Stadtmauer
beym Rickfluss.*

560 MNIVM (*Serpullifolium*) pedunculis aggrega-
tis, foliis patentibus pellucidis.

α . *proliferum* pedunculis aggregatis, foliis ro-
faceo congestis lanceolatis acutis.

β . *vndulatum*, foliis oblongis vndulatis.

Habitat in muscosis frequens; et cum prae-
cedente.

561 MNIVM (*Iungermannia*) foliis distichis, pin-
nis subtus auriculatis.

Habitat in subhumidis. *Am Rick.*

562 BRYVM (*apocarpum*) antheris sessilibus ter-
minalibus, calyptora minima.

β . *hirustum*.

Habitat in arboribus et ad earum radices, haud
vmbrosas.

563 BRYVM (*striatum*) antheris subsessilibus spar-
sis, calyptris striatis, sursumue pilosis.

α. maius. Habitat in arboribus, truncis.

β. minus. Habitat in muris, saxis, arboribus.

γ. pilosum. Habitat in vmbrosis, syluis.

564 BRYVM (*pyriforme*) antheris erectis obouatis, calyptre subulata, surculis acaulibus, foliis ouatis muticis.

Habitat in pratis paßim rarius.

565 BRYVM (*pomiforme*) antheris erectis sphæricis.

Habitat ad aggeres syluarum truncosve locis succulentis. *In Eldnaer Holz.*

566 BRYVM (*rurale*) antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis.

Habitat in muris, tectis stramineis, arborumque truncis frequens.

567 BRYVM (*murale*) antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus cespitosis.

Habitat in muris, tectis, tegulis vbique.

568 BRYVM (*puluinatum*) antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis.

Habitat in muribus.

569 BRYVM (*Hypnoides*) antheris erectis, caule erectiusculo, ramis lateralibus breuibus fertilibus.

Habitat in syluis, saxis, fabulosis rarius. *Bey Hanshagen im Kirchenholz.*

570 HYPNVM (*complanatum*) fronde pinnata ramosa;

mosa: foliolis imbricatis acutis complicatis compressis.

Habitat ad truncos arborum. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden.*

571 HYPNVM (*rutabulum*) ramis vagis subrepentibus, foliis ouatis mucronatis imbricatis.

Habitat in sepibus, vmbrosis, ad arborum truncos antiquos.

572 HYPNVM *proliferum*, surculis proliferis plano pinnatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis, syluis. *Bey Hindrichshagen am Waldgraben.*

573 HYPNVM *parietinum* surculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis et syluis fccis.

574 HYPNVM (*squarrosum*), ramis vagis, foliis ouatis apice subulatis vndique reflexis.

Habitat in vmbrosis, subhumidis. *Hinter der Mauer.*

575 HYPNVM (*cupressiforme*) surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis.

Habitat ad truncos et radices arborum locis succulentis. *Hinter der Mauer.*

576 HYPNVM (*curtipendulum*) surculis vagis teretibus, foliis ouatis acutis patulis, antheris pendulis.

Habitat cum praecedente.

577 HYPNVM (*purum*) surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ouatis obtusis connuentibus.

Habitat in pascuis et syluis rarius. Inter Hortos ad sepes.

578 HYPNUM (*illecebrum*) surculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis.

Habitat in pascuis locisque subvimbrosis.

579 HYPNUM (*sericeum*) surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis.

Habitat ad truncos, muros frequens.

580 HYPNUM (*serpens*) surculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis.

Habitat ad caudices, ligna, faxa vbiue.

ALGAE.

581 IVNGERMANNIA (*asplenoides*) frondibus simpliciter pinnatis: foliolis ouatis subciliatis.
Habitat ad radices salicium locis vimbrosis.

582 IVNGERMANNIA (*dilatata*) surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbri-catis, ramis apice latioribus.

Habitat in truncis arborum copiose, lichen im-bricatum mentiens.

583 MARCHANTIA (*polymorpha*) calyce com-muni decemfido.

Habitat iuxta aquas, ad ripas riuuolorum vim-brosas et ad fontes.

584 MARCHANTIA (*hemisphaerica*) calyce com-muni quinquefido hemisphaerico, perichaetio nullo.

Hab.

Habitat in pascuis humidis rarius. *Bey Kae-*
tenhagen haud procul a scaturigine, it. *im*
Torfmoor beym Pottkrige Mensē Iulio.

585 RICCIA (*minima*) frondibus glabris bipartitis
 acutis

Habitat in pascuis arenosis, vbi per hyemen
 aquae stagnarunt.

586 LICHEN (*scriptus*) leprosus albicans, lineolis
 nigris ramosis, characteriformibus.

Habitat in corticibus arborum laeuioribus.

587 LICHEN (*rugosus*) leprosus albicans, lineo-
 lis simplicibus punctisque nigris confertis.

Habitat in truncis arborum, in sylvis frequens.

588 LICHEN (*sanguinarius*) leprosus cinereo-
 virescens, tuberculis atris.

Habitat in arboribus frequens, in sepibus
 paucim.

589 LICHEN (*fusco-ater*) leprosus fuscus, tuber-
 culis atris.

Habitat in muris, lapidibus, petris.

590 LICHEN (*fagineus*) leprosus albus, tuber-
 culis albis farinaceis.

Habitat in truncis Fagorum.

591 LICHEN (*carpineus*) leprosus cinereus, tu-
 berculis albidis rugosis.

Habitat in truncis Carpini.

592 LICHEN (*ericetorum*) leprosus candidus, tu-
 berculis incarnatis.

Habitat in sylvis paludosis sphagno palustri in-
nascentia. *Im Grubenhäger Moor.*

593 LICHEN (*candelarius*) crustaceus flauus, scu-
tellis luteis.

Habitat in muris et parietibus antiquis frequens.

594 LICHEN (*palleiens*) crustaceus albicans, scu-
tellis pallidis.

Habitat in corticibus arborum.

595 LICHEN (*ciliaris*) foliaceus erectiusculus:
laciiniis linearibus ciliatis, scutellis peduncula-
tis crenatis.

Habitat in arboribus frequentissimus.

596 LICHEN (*pulmonarius*) foliaceus laciniatus
obtusus glaber: supra lacunosus, subtus to-
mentosus.

Phar. *Pulmonaria arborea.*

Habitat super arborum truncos in sylvis anti-
quis v. g. *Im Eldenaer Holz.*

597 LICHEN (*furfuraceus*) foliaceus decumbens
furfuraceus: laciniis acutis; subtus lacunosis
atris.

Habitat in arboribus et parietibus ligneis.

598 LICHEN (*farinaceus*) foliaceus erectus com-
pressus ramosus farinaceus: lateribus verrucosis.
Habitat in antiquis arboribus et parietibus.

599 LICHEN (*calicaris*) foliaceus erectus linearis
ramosus lacunosus convexus mucronatus.
Habitat in antiquis arboribus foliosis.

600 LICHEN (*fraxineus*) foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis.

Habitat in truncis Querci et Fraxini.

601 LICHEN (*prunastri*) foliaceus erectiusculus lacunosus subtus tomentosus albus.

Habitat in Fraxinis et prunis spinosis.

602 LICHEN (*iuniperinus*) foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis liquidis.

Habitat in arboribus in primis Juniperis.

603 LICHEN (*aphthosus*) foliaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali ascendentem.

Pharmac. *Muscus cumatilis*.

Habitat in sylvis sterilibus muscosis sub iuniperis.

604 LICHEN (*caninus*) foliaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali ascendentem.

Pharmac. *Muscus caninus*.

Habitat in sylvis ad lapides demersos.

605 LICHEN (*cocciferus*) scyphifer simplex integrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

Pharmac. *Muscus pyxidatus*.

606 LICHEN (*pyxidatus*) scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis.

Habitat ubique in sterilibus. Variationes dantur, a me nondum satis obseruatae.

- 607 LICHEN (*gracilis*) scyphifer ramosus denticulatus filiformis.
Habitat in sterilibus, petrosis, muris antiquis.
- 608 LICHEN (*deformis*) scyphifer simpliciusculus subuentricosus, calycibus dentatis.
Habitat in syluis, muris antiquis vimbrosis.
- 609 LICHEN (*subulatus*) fruticulosus tubulosus dichotomus, ramis simplicibus subulatis.
- 610 LICHEN (*plicatus*) filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis.
Pharm. *Muscus arboreus*. Vulgo Vsnea.
Habitat ubique in densis syluis.
- 611 LICHEN (*barbatus*) filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentissimis.
Habitat in Fagis aliisque arboribus acerosis antiquis.
- 612 CHARA (*vulgaris*) caulis laeibus, frondibus interne dentatis.
Habitat in aquis pigris rarius. *Vor dem Fettenthor auf der Weide.*
- 613 TREMELLA (*iuniperina*) sessilis membranacea auriformis fulua.
Habitat in iuniperis post pluuias. In sylva prope *Hohenmühlen*.
- 614 TREMELLA (*Nastoc*) plicata vndulata.
Habitat in pratis rarius.
- 615 TREMELLA (*Auricula*) sessilis membranacea auriformis cinerea.

Pharm.

Pharmac. *Fungus sambucinus Auricula Iudee.*
Habitat ad arbores putridas, in sambuco praefertim.

616 TREMELLA (*purpurea*) subglobosa sessilis
solitaria glabra.
Habitat in arboribus moribundis.

617 FVCVS (*serratus*) fronde plana dichotoma
ferrata versus apices tuberculata.
Habitat in mari balthico. In littoribus maris
passim reiecta reperitur.

618 FVCVS (*vesiculosus*) fronde dichotomo integra,
caule medium folium transcurrente, vesiculis
verrucosis terminalibus.
Germanis nostr. Dauk.
Habitat in mari balthico. In littoribus frequens.

619 FVCVS (*fastigiatus*) dichotomus ramosissi-
mus teres vuniformis fastigiatus.
Habitat cum praecedente.

620 FVCVS (*Filum*) filiformis simplex fragilis
opacus.
Habitat cum praecedente.

621 VLVA (*intestinalis*) tubulosa simplex.
Habitat cum praecedente. Reiicitur ad littora
Rarius in fossis salinis.

622 VLVA (*compressa*) sabulosa ramosa com-
pressa.
Habitat cum praecedente.

- 623 **VLVA** (*granulata*) sphaerica aggregata.
Habitat ad ripas paludum.
- 624 **CONFerva** (*bulloſa*) filamentis aequalibus
ramulis bullas aereas includens.
Habitat in aquis pigris et stagnantibus.
- 625 **CONFerva** (*littoralis*) filamentis aequalibus
ramosissimis elongatis scabriusculis.
Habitat cum fucis.
- 626 **Byssvs** (*saxatilis*) puluerulenta cinerea ru-
pes operiens.
Habitat in faxis.
- 627 **Byssvs** (*Flos aquae*) filamentis plumosis
natantibus.
Habitat in aquis, quae inde inter diu aestate
virescunt.
- 628 **Byssvs** (*velutina*) filamentosa viridis.
Habitat in terra locis umbrosis et abditis.
- 629 **Byssvs** (*candalaris*) puluerulenta flava lig-
nis adnascens.
Habitat in corticibus arborum, parietibus
tectis.
- 630 **Byssvs** (*phosphorea*) lanuginosa violacea
lignis adnascens.
Habitat in lignis vetustis.
- 631 **Byssvs** (*botryoides*) puluerulenta viridis.
Habitat in terra, vbi aquae stagnarunt, in ollis
hortulanorum et alibi frequens.

FVNGI.

632 AGARICVS (*piperatus*) caulescens, pileo planiusculo lactescente margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis.

Germ. *Pfifferling.*

Habitat in syluis, inter Eldena et Diedrichshagen.

633 AGARICVS (*campestris*) stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis rufis.

Germ. *Champignon.*

Habitat in pratis paßim. *Auf der Straße in Neuenkirchen.* Reperitur Menſe Augusto.

634 AGARICVS (*Chantarellus*) stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. Vulgo *Chanterelle.*

Habitat in pratis syluaticis. *Zu Hanßhagen.*

635 AGARICVS (*deliciosus*) stipitatus, pileo testaceo, succo lutescente.

Germ. *Reischen.*

Habitat in montosis asperibus syluaticis. Aliquoties tantum reperi Hanshagae scilicet et *zu Kleinzaſtrow.*

636 AGARICVS (*quertinus*) acaulis, lamellis labyrinthiformibus.

Germ. *Eichenschwamm.*

Habitat in truncis asperibusque quercinis.

637 AGARICVS (*labyrinthicus*) acaulis coriaceus villosus margine obtuso, lamellis anastomosantibus.

Germ.

Germ. *Baumchwam.*

Habitat in truncis arborum, in primis Betulae.

638 BOLETVS (*bouinus*) stipitatus, pileo glabro puluinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis breuioribus.

Habitat in pratis et syluis meirse Augusto.

639 BOLETVS (*fomentarius*) acaulis puluinatus inaequalis obtusus, poris teretibus aequalibus glaucis.

Germ. *Feuerschwamm.*

Habitat in truncis et caudicibus Betulae.

640 BOLETVS (*suberosus*) acaulis puluinatus alb. bus laevis, poris acutis difformibus.

Habitat in truncis arborum rario, in Betulis frequens.

641 BOLETVS (*vericolor*) acaulis, fasciis dicoloribus, poris albis.

Habitat ad truncos arborum antiquarum, nec non in afferibus et parietibus ligneis prope terram rario.

642 PHALLVS (*esculentus*) pileo ouati, stipite nudo rugoso.

Germ. *Murchel.*

Habitat in syluis antiquis. *Zu Grubenhagen.*

643 ELVELA (*Mitra*) pileo deflexo adnato lobato difforini.

Germ. *Steinmurchel.*

Habitat in truncis putridis, locisque succulentis vimbrosis syluarum.

644 PEZIZA (*lentifera*) campanulata lentifera.

Habitat in sepibus et areis hortorum.

645 PEZIZA (*scutellata*) plana margine convexo piloso.

Habitat in parietibus ligneis antiquis rarissima.
Vor den Thoren zwischen den Gärten.

646 PEZIZA (*punctata*) turbinata truncata, disco punctato.

Habitat supra equorum stercorea. Vere tantum reperi.

647 LYCOPERDON (*stellatum*) volua multiplici patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato.

Habitat in monticulo, *Fuchsberg* dicto.

648 LYCOPERDON (*epiphyllum*) aggregatum parasiticum, ore multifido lacero, puluere fuluo.

Habitat in dorso foliorum *Tussilaginis Farfarae* rarius. *Im Eldnaer Holz.*

649 LYCOPERDON (*epidendrum*) cortice farinaceo purpurea.

Habitat in hortorum asseribus et parietibus antiquis.

650 LYCOPERDON (*Bouista*) subrotundum lacero dehiscens.

Germ. *Bovist.* Pharmac. *Crepitus Lupi.*
Habitat in collibus, campisque sterilibus ubique.

651 Mvcor (*vnguiculus*) vnguiculus flauus.

Germanis.

Habitat in terra praegnante, et ad parietes
frequens.

652 Mvcor (*Mucedo*) fugax stipitatus, capsula
globosa.

Gerin. *Schimmel.*

Habitat in putridis.

653 Mvcor (*Erysiphe*) albus, capitulis fuscis
setilibus.

Gerin. *Honigthau.*

Habitat in plantis variis.



L INDEX GENERVM.

	No.		No.
Acorus	185	Anthemis	461
Aconitum	287	Arundo	65
Achillea	463	Arbutus	221
Acer	538	Arenaria	234
Acrostichum	547	Arabis	359
Adoxa	216	Arctium	423
Aegopodium	166	Artemisia	437
Aethusa	160	Arnica	455
Agrostis	38	Asperula	77
Agrostemma	241	Asclepias	132
Agrimonia	250	Asparagus	180
Agaricus	632	Astragalus	393
Aira	42	Aster	450
Aiuga	308	Asplenium	548
Alopecurus	34	Atriplex	534
Alchemilla	89	Auena	63
Alsine	170		B
Allium	177		
Alisma	200	Ballota	323
Alyssum	349	Betonica	311
Anthoxanthum	19	Bellis	456
Anchusa	100	Betula	497
Anagallis	112	Bidens	433
Angelica	155	Boletus	638
Andromeda	220	Briza	52
Anemone	289	Bromus	60
Antirrhinum	341	Brassica	362
Anthyllis	382	Bryonia	510
		K	Bryum

I. INDEX.

	No.		No.
Bryum	562	Convolvulus	113
Butoinus	217	Conium	151
Bunias	366	Conuallaria	181
Byssus	626	Comarum	278
C		Corylus	507
		Conferua	624
Callitricha	2	Crataegus	258
Campanula	115	Crepis	419
Carum	164	Cuscuta	90
Caltha	307	Cucubalus	231
Cardamine	350	Cynosurus	54
Carduus	426	Cynoglossum	101
Carlina	432	D.	
Carex	489	Dactylis	53
Carpinus	506	Datura	121
Cannabis	522	Daucus	150
Cerastrum	244	Delphinium	286
Centaurea	465	Dianthus	229
Chenopodium	134	Draba	344
Chaerophyllum	161	Drosera	174
Chrysosplenium	224	E.	
Chelidonium	279	Echium	105
Chrysanthemum	457	Elymus	69
Chara	612	Eluela	643
Circaeа	5	Epilobium	203
Cicuta	159	Equisetum	540
Cichorium	422	Eriophorum	29
Clinopodium	326	Eryngium	146
Cnicus	431	Erica	
Cornus	88		

I. INDEX.

	No.		No.
Erica	208	Hesperis	358
Erysimum	355	Hippuris	1
Eruum	389	Hieracium	413
Erigeron	445	Hordeum	70
Euphorbia	251	Holosteum	72
Euphrasia	333	Hottonia	108
Eupatorium	435	Holcus	531
Euonymus	127	Humulus	523
F.		Hydrocotyle	147
Fagus	505	Hyoscyamus	122
Festuca	55	Hyoseris	420
Filago	468	Hypericum	402
Fragaria	270	Hydrocharis	529
Fraxinus	539	Hypnum	570
Fumaria	376		I.
Fucus	617	Iasione	471
G.		Iberis	342
Galium	78	Ilex	91
Galeopsis	318	Impatiens	476
Gentiana	143	Inula	452
Geum	276	Iris	23
Geranium	367	Iuniperus	530
Genista	380	Iungermannia	582
Glaux	131	Iuncus	186
Glechoma	314		L.
Gnaphalium	441	Lasérpitium	153
H.		Lamium	315
Hedera	130	Lathraea	338
Herniaria	133	Lathyrus	383
Heracleum	154	Lactuca	408
K.	2		Lapsana

I. INDEX.

	No.		No.
Lapsana	421	Medicago	401
Ledum	219	Mercurialis	527
Leonurus	325	Milium	37
Lepidium	345	Mnium	558
Leontodon	410	Monotropa	218
Lemna	484	Mucor	651
Ligustrum	4	Myosotis	97
Lithospermum	98	Myosurus	176
Linum	173	Myagrum	343
Lichen	586	Myriophyllum	502
Lolium	67	N.	158
Lonicera	118	Nepeta	310
Lotus	400	Nymphaea	283
Lycopsis	104	O.	157
Lycopus	13	Oenanthe	381
Lysimachia	109	Ononis	481
Lychnis	242	Ophrys	327
Lythrum	249	Origanum	178
Lycopodium	555	Ornithogalum	392
Lycoperdon	647	Ornithopus	477
M.		Orchis	545
Marrubium	324	Osmunda	240
Malua	373	Oxalis	P.
Matricaria	459	Panicum	163
Marchantia	583	Pastinaca	171
Melica	45	Parnassia	215
Menyanthes	107	Paris	280
Mespilus	260	Papauer	533
Mentha	312	Parietaria	Pedicularis
Melampyrum	335		

I. INDEX.

	No.		No.
Pedicularis	339	R.	
Peziza	644	Ranunculus	293
Phalaris	31	Raphanus	365
Phellandrium	158	Rhamnus	125
Phleum	33	Rhinanthus	332
Phallus	642	Ribes	128
Pinguicula	15	Riccia	585
Pimpinella	165	Rosa	264
Picris	405	Rubus	266
Pinus	508	Rumex	193
Plantago	83	S.	
Poa	46	Sanguisorba	87
Potamogeton	92	Sagina	96
Polygonum	210	Salsola	141
Potentilla	271	Sanicula	148
Polygala	378	Sambucus	168
Populus	524	Saxifraga	225
Polypodium	551	Sagittaria	503
Polytrichum	557	Salix	511
Primula	106	Scirpus	24
Prunus	254	Scabiosa	73
Prunella	331	Sherardia	76
Prenanthes	409	Scleranthus	227
Pteris	550	Scutellaria	330
Pulmonaria	102	Scrophularia	348
Pyrola	222	Selinum	152
Pyrus	261	Sedum	238
		Semperuiuum	253
		Serratula	424
Quercus	504	Senecio	448
		K 3	
		Serapias	

I. INDEX.

	No.		No.
Serapias	483	Triglochin	198
Sium	156	Trientalis	202
Sisymbrium	351	Trifolium	394
Sinapis	363	Tragopogon	404
Solanum	123	Tremella	613
Sorbus	259	Turritis	360
Sonchus	406	Tussilago	446
Solidago	451	Typha	487
Spergula	247	U.	
Spiraea	263	Ulmus	142
Spartium	379	Ulua	621
Sparganium	488	Urtica	499
Sphagnum	556	Utricularia	16
Statice	172	V.	
Stellaria	232	Valeriana	20
Stratiotes	288	Vaccinium	205
Stachys	321	Valantia	532
Symphytum	133	Verbena	17
T.		Veronica	6
Tanacetum	436	Verbascum	119
Thalictrum	292	Viburnum	167
Thlaspi	346	Vicia	386
Thymus	328	Viola	472
Tilia	285	Viscum	521
Tordylium	149	X.	
Tomentilla	275	Xanthium.	501
Triticum	71		



II. INDEX

NOMINVM GERMANORVM.

	No.		No.
<i>Abbiss</i>	73	<i>Bärentraube</i>	221
<i>Abelen</i>	524	<i>Beinholz</i>	4
<i>Ackerzwiebeln</i>	178	<i>Beinwelle</i>	103
- - <i>klein</i>	179	<i>Betonic</i>	311
- - <i>wurz</i>	185	<i>Beifuss</i>	427
- - <i>wiohn</i>	280	<i>Bertram, wilder</i>	463
- - <i>sempf</i>	363	<i>Bettlerläus</i>	501
- - <i>distel</i> 406.	425	<i>Biberklee</i>	107
<i>Aggermennig</i>	250	<i>Bilsenkraut</i>	122
<i>Alandiwurz</i>	452	<i>Bixbeeren</i>	206
<i>Angelick, wilde</i>	155	<i>Bitterling</i>	211
<i>Andorn, schwarz.</i>	323	<i>Birnbaum, wilder</i>	261
- - <i>weisser</i>	324	<i>Birke</i>	497
<i>Apostemkraut</i>	74	<i>Bingelkraut</i>	588
<i>Apfelbaum, wilder</i>	262	<i>Bintkraut</i>	87
<i>Aspars</i>	180	<i>Blumenbinsen</i>	217
<i>Aeschen-Faul</i>	525	<i>Blauögischen</i>	472
<i>Aesche</i>	539	<i>Bockskraut</i>	139
<i>Attich</i>	168	- - <i>peterlein</i>	165
<i>Augentrost</i>	333	<i>Bocksbart</i>	404
- - <i>brauner</i>	334	<i>Bornkresse</i>	351
<i>B.</i>		<i>Bofist</i>	650
<i>Bachbungen</i>	8	<i>Braunewurz</i> 120.	342
<i>Baldrian, klein</i>	20	<i>Bruchkraut</i>	133
- - <i>gemein</i>	21	<i>Brönbeerstrauch</i>	268
<i>Basilien, wild</i>	329	<i>Brunellen</i>	331
<i>Bährenklau, teutsch</i>	154	<i>Brunkresse</i>	351
		<i>K 4</i>	<i>Brenn-</i>

II. INDEX.

	No.		No.
	K.		
<i>Heinrich, stolzer</i>	134	<i>Kaliverkrop</i>	161
- - - <i>guter</i>	134	- - - <i>klein</i>	162
<i>Heldelbeeren</i>	206	<i>Kalmus</i>	185
- - - <i>Nelken</i>	230	<i>Kattenkäs</i>	373
- - - <i>kraut</i>	208 209	- - - <i>pötgen</i>	442
<i>Hederich</i>	365	<i>Kamellen</i>	460
<i>Herzgespann</i>	325	- - - <i>wilde</i>	462
<i>Helmkraut</i>	330	<i>Kirschen</i>	255
<i>Hirse, grasgrauicht.</i>	32	<i>Klettendiebst</i>	423
<i>Hindschkraut</i>	123	<i>Klebkraut</i>	82
<i>Hirzwurz</i>	153	<i>Kleberich</i>	82
<i>Hindläufte</i>	422	<i>Klocken, wald</i>	116
<i>Hirschholder</i>	167	<i>Klapperrosen</i>	281
<i>Hinbeeren</i>	266	<i>Klewer, weiser</i>	395
<i>Holunder</i>	169	- - - <i>rother</i>	396
<i>Hohlbeeren</i>	266	- - - <i>Wiesen</i>	396
- - - <i>wurz</i>	376	- - - <i>Berg</i>	398
<i>Hopfen, wilder</i>	523	- - - <i>gelber</i>	399
<i>Honigthau</i>	653	- - - <i>Hopfen</i>	401
<i>Hundsblumie</i>	461	<i>Knoten Fuchsfchw.</i>	35
- - - <i>Zunge</i>	101	<i>Knoblauchskraut</i>	357
- - - <i>Violen</i>	473	<i>Knütgen</i>	362
<i>Hungerblümchen</i>	344	<i>Knabenkraut</i>	477
<i>Huflattich</i>	446	- - - <i>geflecktes</i>	479
<i>Hünerdarm</i>	170	- - - <i>breitblätterich.</i>	480
- - - <i>biss</i>	170	<i>Knirck</i>	580
<i>J.</i>		<i>Kornblume</i>	467
<i>Jacobskraut</i>	449	<i>Königskerze</i>	119
<i>Je länger je lieber</i>	123	<i>Körwell, wilder</i>	164
<i>Johanniskr.</i> 228. 402			
- - - <i>blum</i>	335. 455	<i>Kratz-</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Kratzbeer</i>	268	<i>M.</i>	
<i>Krähenfuss</i>	301	<i>Mannstreu</i>	146
<i>Krötengras, Knopf</i>	186	- - <i>gemein</i>	146
- - <i>Busch</i>	187	<i>Mauschwanz</i>	167
- - <i>Glieder</i>	189	- - <i>Ohr</i>	413
- - <i>kriechendes</i>	190	<i>Mangold, Wald</i>	222
- - <i>starriches</i>	191	<i>Mauerpfeffer</i>	239
- - <i>Wiesen</i>	192	- - <i>raute</i>	549
<i>Krötendill</i>	461	<i>Marienblum</i>	456
<i>Kukucksblumen</i>	242	<i>Marlblum</i>	456
<i>Küchenchellen</i>	299	<i>Melte, weisse</i>	135
<i>Kydick</i>	363. 364	- - <i>grüne</i>	137
<i>L.</i>		- - <i>rothe</i>	136
<i>Labkraut</i>	80	- - <i>gelbe</i>	128
<i>Lämmerlattig</i>	22	- - <i>stinkende</i>	139
<i>Läuskraut</i>	340. 339	<i>Melden, wilde</i>	536
<i>Lön</i>	538	<i>Merzviolen</i>	472
<i>Leopardenwurz</i>	297	<i>Meyerkraut</i>	80
<i>Leinkraut</i>	341	- - <i>weiss</i>	81
- - <i>dotter</i>	343	<i>Milchkraut</i>	131. 252
<i>Lilienconvallien</i>	181	- - <i>Diestel</i>	407
<i>Linde</i>	285	<i>Mispel</i>	521
<i>Linsen</i>	389	<i>Milzkraut, gülden</i>	224
- - <i>Wasser</i>	485	<i>Moosbeern</i>	207
<i>Löwenfuss</i>	89	<i>Mohn, wilder</i>	282
<i>Löffelkraut, Frosch</i>	200	<i>Mundholz</i>	4
<i>Lungenkraut</i>	102	<i>Mutterwurz</i>	455
<i>Luusbeeren</i>	265	- - <i>kraut</i>	459
<i>Lülch, perennirender</i>	67	<i>Murchel</i>	632
- - <i>Taunel</i>	68	- - <i>Stein</i>	643
		<i>Münze-</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Münze, Katzen</i>	310	<i>Pfeilkraut</i>	503
<i>Wasser</i>	312	<i>Pfifferling</i>	632
<i>Acker</i>	313	<i>Pinnholz</i>	126
<i>N.</i>		<i>Pors</i>	219
<i>Nachtschatten</i>	124	<i>Post</i>	219
<i>Nägenknee</i>	247	<i>Puttegnaden</i>	205
<i>Nessel, gold</i>	320	<i>Q.</i>	-
<i>Nüßgensallat</i>	22	<i>Quendel</i>	328
<i>O.</i>		<i>R.</i>	-
<i>Odermenning</i>	250	<i>Rapünzel</i>	22
<i>Ochsenzunge</i>	100	<i>Rasenbinsen</i>	25
<i>wilde</i>	105	<i>Radel</i>	241
<i>blaue</i>	105	<i>Reinkohl</i>	421
<i>Oegschen, witt</i>	290	<i>- fahrn</i>	436. 464
<i>- Geel</i>	291	<i>- blumen</i>	441
<i>Organ</i>	327	<i>Reischen</i>	635
<i>P.</i>		<i>Rhabarber, wilde</i>	194
<i>Pasternacken, wilde</i>	163	<i>Rittersporn</i>	286
<i>Parnassgrass</i>	171	<i>Riedgrass, klein</i>	489
<i>Pappeln, Gänse</i>	373	<i>Fuchs</i>	490
<i>Ross</i>	374	<i>dünnes</i>	491
<i>Haus</i>	374	<i>Sumpf</i>	492
<i>Rosen</i>	375	<i>Rasen</i>	493
<i>weiße</i>	524	<i>blasigtes</i>	494
<i>schwarze</i>	526	<i>spitziges</i>	495
<i>Petersilie, wilde</i>	160	<i>Rauhes</i>	496
<i>Pestilenzwurz</i>	447	<i>Rosen, wilde</i>	264
<i>Pfennigkraut</i>	111. 346	<i>Ruchgrass</i>	19
<i>Pferdingkraut</i>	212	<i>Ruhrkraut</i>	468
<i>Pfaffenröhlein</i>	410	<i>Berg</i>	469
		<i>Ruhr-</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Ruhrkraut, Acker</i>	470	<i>Schminkewurz</i>	104
- - - S.		<i>Schiwalbenwurz</i>	132
<i>Saamenkraut</i>	92	<i>Schlüsselblumen</i>	106
- - - fliessend	92	<i>Schnirgel</i>	134
- - - klar	93	- - - kleiner	138
- - - klein	95	<i>Schierling</i>	151
<i>Saukraut</i>	124	- - - ächter	159
- - - diestel	425	- - - unächter	158
<i>Sauerklee</i>	240	<i>Schleen</i>	257
<i>Saurampfer, wilder</i>	196	<i>Schleendorn</i>	257
- - - kleiner	197	<i>Schellkraut</i>	279
<i>Salzkraut</i>	141	<i>Schartenkraut</i>	424
<i>Sanickel</i>	149	<i>Schaafgarbe</i>	464
<i>Sandlauch</i>	177	<i>Schaffruss</i>	544
- - - blume	237	<i>Schwamm-Eichen</i>	636
<i>Schwertel, gelber</i>	23	- - - Baum	637
<i>Schmielen, blaue</i>	42	- - - Feuer	639
- - - Rifen	43	<i>Schimmel</i>	652
- - - graue	44	<i>Seebinsen</i>	27
<i>Schwingel, Schaaf</i>	55	- - - blumen	283
- - - rother	56	- - - kohl	566
- - - kriechender	57	<i>Sinai</i>	89
- - - Wiesen	58	<i>Siebenfingerkraut</i>	278
- - - Manna	59	<i>Sonnentau</i>	175. 174
<i>Schwadengrütze</i>	59	<i>Sophienkraut</i>	353
<i>Schöngras, hangend.</i>	45	<i>Spillbaum</i>	127
<i>Schilfrohr</i>	65	<i>Spindelbaum</i>	127
- - - Berg	66	<i>Spargel</i>	180
<i>Scherardtskraut</i>	76	<i>Sperberbaum</i>	259
<i>Schwarzwurz</i>	103	<i>Springkraut</i>	476
		<i>Stachel-</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
<i>Stachelbeeren</i>	129	<i>Sumpfbinsen</i>	24
<i>Stauderich</i>	140	- - - <i>Dünengrass</i>	29
<i>Stachel</i>	305	- - - <i>klee</i>	107
<i>Stabwurz</i>	427	- - - <i>beern</i>	207
<i>Sternblum, Wald</i>	232	- - - <i>violen</i>	474
	233	<i>Süßholz, wild</i>	393
- - <i>Frühjahrs</i>	- 2		<i>T.</i>
- - <i>Herbst</i>	3	<i>Tanne</i>	509
- - <i>Wasser</i>	450	<i>Taubenkraut</i>	17
<i>Sternleberkraut</i>	77	<i>Tausendgüldenkr.</i>	144
<i>Stechpalmen</i>	91	<i>Taubnessel, weisse</i>	315
- - <i>Aepfel</i>	121	- - - <i>rothe</i>	316
<i>Steinsaame</i>	98	- - - <i>blaue</i>	318
- - <i>Hirse</i>	98	- - - <i>bunte</i>	319
- - <i>Saame, Acker</i>	99	- - - <i>gelbe</i>	320
<i>Steinbrech, weisser</i>	225	<i>Taub-todte Nessel</i>	319
<i>Stickelbeeren</i>	129	- - - <i>Heckennessel</i>	321
<i>Stinkkresse</i>	345	<i>Teichbinsen</i>	26
<i>Stiefmütterchen</i>	475	<i>Teuffelsabbis</i>	73
<i>Storchen schn. gem.</i>	367	<i>Teschelkraut</i>	347
- - <i>Wald</i>	368	<i>Thurmkraut</i>	360
- - <i>Wiesen</i>	369	- - - <i>glatt</i>	360
- - <i>weicher</i>	371	- - - <i>rauch</i>	361
- - <i>runder</i>	372	<i>Tomentillwurzel</i>	275
<i>Strausgrass, Acker</i>	38	<i>Tresprocken</i>	60
- - - <i>rothes</i>	39	- - - <i>acker</i>	61
- - - <i>braunes</i>	40	- - - <i>hoher</i>	62
- - - <i>Haar</i>	41	<i>Trempsen</i>	467
<i>Straußigtes Fladder-</i>			<i>U.</i>
<i>grass</i>	37	<i>Ulmbaum</i>	142
			<i>V.</i>

II. INDEX.

	No.		No.
	<i>V.</i>		
<i>Vergiss mein nicht</i>	97	<i>Wasserdosten</i>	435
<i>Viehgrasswasser</i>	46	<i>Wallwurz</i>	103
- - <i>dreyblätterichtes</i>	47	<i>Wegerich</i>	83
- - <i>fünfblättericht.</i>	48	- - <i>blad</i>	83
- - <i>Sommer</i>	49	- - <i>kleiner</i>	84
- - <i>Berg</i>	50	- - <i>schmaler</i>	85
- - <i>Wald</i>	51	- - <i>See</i>	86
<i>Vogelhest</i>	150. 482	<i>Weiderich, gelber</i>	109
- - <i>zung</i>	214	- - <i>Wasser</i>	100
- - <i>kirschen</i>	254. 256	- - <i>brauner</i>	249
- - <i>beern</i>	259	<i>Wegtritt</i>	213
- - <i>fuss</i>	392	- - <i>grass</i>	213
	<i>W.</i>	<i>Wegkerze</i>	120
<i>Waldbinsen</i>	28	- - <i>dorn</i>	125
- - <i>meister</i>	77	- - <i>senf</i>	355
- - <i>stroh</i>	80	- - <i>wart</i>	422
- - <i>nessel</i>	500	- - <i>ruhrkraut</i>	444
- - <i>meister, güld.</i>	532	<i>Weitzen, Queck</i>	71
<i>Wacholderstrauch</i>	530	<i>Weisswurz</i>	182
<i>Wassergauchheil</i>	9	- - <i>klein</i>	183
- - <i>Andorn</i>	18	<i>Weiden, Zäh</i>	511
- - <i>viole</i>	108	- - <i>rothe Sprock</i>	512
- - <i>steinbrech</i>	157	- - <i>Sprock</i>	513
- - <i>schierling</i>	159	- - <i>Rhein</i>	514
<i>WasservioLEN</i>	204	- - <i>gelbe Zäh</i>	514
- - <i>Pfeffer</i>	211	- - <i>Bruch</i>	516
- - <i>mümmelchen</i>	283	- - <i>Palm</i>	517
- - <i>rosen</i>	284	- - <i>Aemis</i>	518
- - <i>Aloe</i>	283	- - <i>Korb</i>	518
		<i>Weiden,</i>	

II. INDEX.

	No.		No.
Weiden, weisse	520	Wildheidenkorn	214
Silber	520	Wilder Senpf.	355
Zäh	520	Wirkelodost	326
Wermuth, Feld	432	Wollkraut	119
See	430. 439	Wolfsbeer	215
Wiesen Dünngras	30	- milch	251. 252
foenich	33	- - - wurz	297
fuchsfchwanz	34	Wollwerley	455
knöpfe	87	Wokerblumen	457
rauthe	292	Wundkraut	382
kress	350	Wüllkraut	139
Winde, Zaun	114	Z.	-
Acker	113	Zahnwurz	338
kleine	113	Zaunreiss.	82
Wald	118	- - - rübe	510
Wintergrün	130	Zaunklocken	114
Wicken	383	Zweyblatt	48 F
Zaun	387	Zweyzahn	433

III. INDEX

NOMINVM PHARMACOPOEORVM

	No.		No.
A bies	509	Betula	497
A bsinthium vulg.	440	Bonus Henricus	134
A corus palustris	23	Bryonia	510
A cetosella	240	Buglossum	100
A cacia	257	Burfa pastoris	347
A grimony	250		C.
A lchemilla	89		
A lliaria	357	Carvi	164
A ngelica sylvestris	155	Calamus vulgaris	185
A nserina	271	Caryophyllata	267
A ristolochia, fabacea	367	Cardiaca	325
A rtemisia rubra	437	Cannabis	522
A rnica	455	Centaurium minus	144
A sparagus	180	Chelidonium majus	
A triplex sylvestris	135	- - minus	296
A uricula Iudae	615	Chamomilla	460
		Cicuta	159
		Cichoreum	422
B .		Cicutaria	161
B arba hirci	404	Consolida major	103
B ardana	423	- - media	308
B eccabunga	8	- - regalis	286
B etonica	311	Cotula foetida	461
B ellis minor	456	Corylus	507
B ellis pratensis	457		
<i>Flora.</i>		L	Crepitus

III. INDEX.

	No.		No.
Serpillum	328	U	Urticodellata
Sigillum Salomonis	182	Ulmaria	263
Sinapi	364	Urtica maior	500
Solanum	124	Usnea	610
Sorbus aucuparia	259	Uva vrsi	221
Sophia	353	V	Valeriana minor
Spina ceruina	125	Veronica	1
Stoechas citrina	441	Verbena	17

T.

Taraxacum	410	Verbascum	119
Tanacetum	436	- - radix	126
Telephium	238	Virga aurea	451
Thlaspi	346	Viola violaria	472
Tilia	285	Viscum	521
Torrentilla	275	Vulnaria	139
Trifolium aquatic.	107	Xanthium	501
- - album	395		
Tussilago	446		

X.

T A N T V M.

107	107	107	107
107	107	107	107
259	259	259	259
364	364	364	364
410	410	410	410
436	436	436	436
446	446	446	446
451	451	451	451
472	472	472	472
501	501	501	501
521	521	521	521
139	139	139	139


CHRISTIANI LUDOV.
WILLICH,

MEDICI NORDHEIMENSIS,

ILLVSTRATIONES
QVAEDAM BOTANICAE
CELEBERRIMO VIRO
NICOL. IOS. JACQVIN
DICATAE,



G O T T I N G A E
S V M T. VIDVAE ABRAMI VANDENHOECK
CCLXVI.



199.
Haec Tibi in primis
Jacquin Celeberrime di-
caui, cum multa ex Tuis
muneribus nata sint, gra-
tumque animum etiam
publice profiteri fas sit.
Scripsi Nordheim M. Ja-
nuario. a. 1766.





I.

Lycopodium clavatum LINN. spec. 2.
p. 1564. n. 4. spicas non semper
geminas sed simplicem interdum habet,
abunde diuersum a *Lycopodio annotino*
L. seu *Lycopodio caule erecto, spica glabra*
terminato HALL. enum. helv. p. 93. n. 2.
Hoc ipsum Lyc. annotinum folia fre-
quenter habet quaterna, raro quina,
superiora longe plerumque verticilla-
ta, inferiora sparsa.

II.

Taxus R VELL. De flore femina di-
xi in *Obseruat.* a. 1762. editis n. III.
Nunc de mare aliqua addo. Ex alis
fo-
A 3

foliorum prodeunt flores singuli ex singulis alis pedunculo linearie insidentes. Calyx gemmae similis ex squamis circiter septem, quorum inferiores minores, duriiores; superiores maiores, teneriores. Hae squamae continent stilum firmum squamis paulo longiore, in fine diuisum in antheras circiter decem arcte congestas. Quaelibet anthera loculos continet plerumque quinque inferne aperiendos. Hinc ante excusione spermatis anthera ex quinque circiter globulis composita quasi videtur, sed eo excusso loculi inferne adparent, superficies autem superior magis plana fit, & eam figuram quam TOVRNEFORTIVS *Instit.* tab. 362. pinxit, satis bene exprimit. Ceterum foliorum petiolus cauli arctissime per non breue spatium adglutinatur, foliaceus totus, a caule vero secedens angustatur, mox vero iterum latefecit in folium.

III.

Vidi olim Pini foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli *G M E L. sibir.* I. p. 179. n. 30. nuces omnino magnas & cinereas.

nereas, sed dein ex ipsa Sibiria accepi
nuces minores, rufas; vt ergo hoc di-
scrimen arborem sibiricam & helueti-
cam sciungere non possit.

IV.

Salicem procumbentem foliis ouato-
lanceolatis subtus sericeis **HALL.** **h.**
gott. p. 8. repetitam in *Emendat.* III. p.
33. n. 94. duce **P R A E C E P T O R E** in
torfaceis Cellensibus abunde legi, cum
flore dein missam ab expertissimo in au-
la Hannouerana pharmacopoeo Dn.
A N D R E E. Dum vero plantam floren-
tem cum iconē *Salicis humilis repantis*
L O B. *icon.* II. p. 138. *aduersar.* p. 423.
confero, tunc omnino vtraque differre
videtur. *Lobeliana* enim julis florens
ramos terminat, paucis capsulis instru-
ctus, quatuor & quinque. Cellensis
vero juli laterales sunt, capsulis nume-
rosissimis 30 vel 40 instructi. **L O B E -**
L I V S dicit, suam plantam in montibus
Sabaudiae, Lugdunensibus & Vega-
niis nasci, nostra in planicie torfosa pro-
uenit. Et valde suspicor plantam **L O -**
B E L I I esse Salicem foliis laeuisbus oua-
tis integerrimis, julis paucifloris **HALL.**

emendat. III. p. 34. n. 97. quo etiam in *enumerat.* *heluet.* p. 154. n. 13. relatam esse video. Confirmor quando iconem **CAMERARIANAM** *Salicis pusillae Epit.* p. 108. cum **LOBELIANA** confero. Quod si vero dicas in neutra icone venas parallelas pietas esse, quales sunt in serpillifolia siue salice foliis laeibus &c. **HALLERI**, respondeo, nec semper in meis certe exemplis neruos parallelos in omnibus foliis incedere, etsi id frequentius obtineat. *Salicem* etiam *pumilam folio vtrinque glabro* I. B. I. part. 2. p. 217. cum **LOBELIANA** conjungendam esse suadent earum icones collatae, adparet enim facile Bauhinianam esse imitationem Lobeliana, sed aliud inde dubium circa conjunctionem hujus cum serpillifolia oritur, cum Bauhinus sua plantae folia vnciam longa adsignet, folia vero vtrinque glabra, plantam Bauhinianam a **LINNAEANA fusca** retinere videntur.

V.

Lapathum aruense subhirsutum, folio retuso, caule longius brachiat, capsula seminis crenata **TILL. pis.** de quo in

in *Obseruat.* a. 1762. n. XVII. dixi, omnino idem est cum Lapatho foliis supra petiolum emarginatis HALL. *emendat.* p. 127. n. 20. *Enumerat. helv.* p. 172. n. 14 & cum *Rumice pulchro LINN. spec.* vt & plantis a Dn. de HALLER missis, cum hortensibus a me cultis, collatis, manifeste video. Ex eodem enim semine natae sunt plantae foliis radicalibus supra petiolum emarginatis siue panduriformibus, & folia integra. Etiam plantae cui priori anno folia radicalia integra fuerant, sequenti emarginata protulerunt. *Icon I. Bauhini* 2. 988. pro varietate emarginata quoad folia bona est, sed pessima ratione caulis, quem simplicem pro planta adulta pingit, & palmarem esse dicit, cum & in spontaneis exemplis insigniter brachiatus sit, & a sesquipedie ad cubitum altus.

VI.

Atriplex littoralis LINNAEI, omnino differt ab Atriplice sylv. angusto oblongo folio C. B. Folia tamen non sunt perpetuo integerrima, verum interdum rariter dentata, fineque recurvo; colore semper glauco; caule sulcato.

VII.

Salsola Kali LINN. spec. 2. p. 322. n. 1. videtur esse eadem cum *Salsola Trago ibid. n. 2.* ita quidem ut haec sit planta junior, illa autem adulta, calyce tunc margine foliaceo albicante aucto, omnibusque plantae partibus durioribus factis. Fructus autem superius planus est, balsamo ibi paucō luteolo tectus. Semen vnicum cochleae instar spirale, cis finem in duos ramos aequē longos diuiditur.

VIII.

Atriplex orientalis, fructus aculeatus, flore pulchro DILL. h. elth. p. 47. t. 40. f. 47. siue *Atraphaxis spinosa* L. Annon haec planta aliquando sine spinis occurrit. Certe in horto Gottingensi video arbusculam, picturæ & descriptioni DILLENI per omnia similem, sed absque spinis. Dein quaero annon haec planta non spinosa, siue sit species siue varietas, genere separari debeat ab *Atraphax. undulata* LINN. diuersa Calyce monophyllo ad basin diuiso in segmenta quatuor aequalia, defectu petalorum, stilo bifido. Et porro annon

Atra-

Atraphaxis spinosa L. cum *Lapatho daurico montano fruticante, ramis late sparsis* Amm. ruth. n. 227. siue *Polygono fruticante* L. genere, a *Polygono* diuerso, conjungi debeat. Omnes enim notae & in *Polygono fruticante* & in *Lapatho daurico* plenissime consentiunt, si solum partium numerum & figuram seminis excipias. In vtraque enim planta calyx diphyllus exiguus, foliolis deflexis. Petala cordiformia calyce majora longitudinaliter deorsum vel extorsum conuoluta, primum patentia, dein erecta magis, per margines sinuata & crispa. Filamentorum bases latiae in circulum quasi coniunctae. reliqua pars capillaris longitudine calycis. Antherae subrotundae. Stilus nullus. Stigmata capitata. Pericarpium nullum; sed corolla persistens, erecta, semen includit, non calyx, qui tunc reflectitur. Habet vero *Atraphaxis spinosa* duo tantum petala, stamina sex, stigmata duo, fructum compressum. *Polygonum fruticans* autem petala tria, stamina octo, stigmata tria, fructum triquetrum.

VIII.

Fagopyrum scandens, *altissimum dumetorum*, *seminibus tribus alis pellucidis cinctis* R V P P. jen. pag. 99. quod circa Nordheim nascitur, & quale ex Heluetia habeo, lobos baseos foliorum raro rotundatos habet, sed plerumque sub-acuminatos. Caulis vtique striatus, striis plerumque manifestis, raro obscuris. In origine petiolorum eminencia obscura est, quae foueam habet manifestam. An ergo *Polygonum dumetorum* & *scandens* L. satis distincta & recte determinata sunt?

X.

Gramen loliaceum spica longiore seu Lolium *Dioscoridis C. B. theatr. p. 121.* Majora hujus graminis specimina, praeter calycem exteriorem, omnibus dictum, & spiculis singulis fere aequalem aut paulo longiorem, in qualibet spicula ex inferioribus calycem etiam habet interiorem, latum, lineae longitudine, margine membranaceo instructum, incisurae scapi arce adpressum, spiculae mediae binos habent huiusmodi calyces interiores sed angustiores; spiculis supremis

premis hic interior calyx omnino deest;
 & in minoribus hujus plantae specimi-
 nibus vel plane nullus, vel admodum
 exiguis.

XI.

Milium paradoxum LINN. a Dn. de
 scopoli missum, tripedale est. Pa-
 nicula viridis, summitate glumarum ca-
 lycinarum excepta, quae albent. Sed
 an re vera semen nudum, apice ari-
 stam emittens, annon haec de corollae
 valuula exteriore dicenda?

XII.

*Gramen foliis juncis oblongis radice
 alba* C. B. est forte specimen adultum
Graminis foliolis juncis radice jubata C.
 B. siue *Airae canescens* LINN. & video
 Cl. HOFERVM cum planta LINNAEI
 conjungere in *Act. helv.* II. p. 149. n. 3.

XIII.

Phleum nodosum LINN. & *Phleum
 pratense LINN.* an re vera differunt.
 Video enim plantas i. radice non bul-
 bosa, caule erecto, foliis pedalibus, spi-
 ca quinque vnciarum cylindrica, basi
 steri-

sterili. 2. culmo inferius bulboso, adscendente, foliis biuncialibus, spica cylindrica biunciali vndique fertili. 3. vti n. i. sed spica tantum sesqui & biunciali, basi sterili. 4. vti n. i. basi fertili.

XIV.

Linagrostis seu *Eriophorum alpinum* LINNAEI omnino diuersum est a *vaginato*. Sed annon in *alpino* caulis aequae vaginatus est. Certe in specimini bus meis *alpini* a Cel. scopol missis, de quibus monet, quod in paludibus depresso longe ab alpibus crescant, caulis pars inferior vaginas habet manifestas, quales schevchzer vs in *prodr. tab. VIII.* pinxit, & in *Agrost.* p. 305. descripsit. In *vaginato* dum adhuc floret, vaginae totum pene culmum occupant, quem elongatum non sequuntur. Annon idem obtinet in *alpino*? Supereft vt inquiratur an *vaginati* duae sint species vel varietates caule foliis que teretibus & iisdem triquetris.

X V.

Juncus spicis multifloris in ala sessilibus, petiolis squamosis HALL. emendat.

III.

III. n. 167. *Juncoides alpinum flosculis junci glomeratis atrofuscis* SCH. agr. p. 323.
l. 7. f. 9. Etsi quam optime hunc dum descripserit SCHEVCHZERVS & denuo a. 1762. HALLERVS, video tamen etiam nunc pro varietate *junci laevis panicula sparsa majoris* C. B. seu *junci effusi* L. haberi, cum quo tamen ne comparari quidem posse Dn. de HALLER dicit. Si tamen lubet comparationem instituere, tunc videbis in *effuso* pedunculos florales tenues numerosos ramososque ex culmi latere subito egredi, sed in atro-fusco vnicus pedunculus crassior, qui pro culmo continuato haberi potest, secedit, vncialis forte, in folio (nisi id, potius pro culmo continuato habeas) diu latens. Cuireliquas notas diuersitatis ex SCHEVCHZERO & HALLERO facile addes, forte etiam ex JACQVINO. Videtur enim Hujus *juncus folio subulato*; *capitulo subquadrifloro*, *terminali*: *fl. vindob.* p. 237. T. 4. f. 2. ab atrofusco non differre.

XVI.

Juncus foliis mollioribus carinatis, panicula multiplice & ramosa HALL. enumer.

mer. helv. p. 254. n. 10. *Obseruatt. meae*
1762. n. 27. Hunc Dn. de LINNE omni-
 no dudum reensuit in *fl. suec.* I. n. 284.
 & in *Spec.* I. & 2. *bulbosif* nomine. JAC-
 QVINVS cum nomine *compressi* egre-
 gie descripsit in *fl. vindob.* p. 235. & in
Observ. I. p. 47. cum *bulboso* coniunxit.
 Folium florale non est longitudine co-
 rynbi, sed longius. Nullus adest co-
 rynbus communis, sed semper duo ad-
 sunt corymbi, ita facti uti JACQVIN
 eos describit. Cur vero Dn. de LIN-
 NE *Gramen. junceum foliis & spica jun-*
C. B. quod *juncos squarroso addiderat;*
 ad *bulbosum* repetit?

XVII.

Si quidem *Typham palustrem majo-*
rem C. B. a. Typha palustri clava gracili
 Ejusd. separare placet, & omnino re-
 ste separari puto, tunc etiam tertia C.
 BAVHINI *typha*, nempe *palustris mi-*
nor specie separari debet. Sed in no-
 tas discriminis in omnibus vberius in-
 quirendum. *Typhas palustres clava gra-*
cili coram habeo, ubi spica mascula &
 feminea aequa adproximatae sunt ac in
 majore, etsi alias per sesquiunciam sint
 remo-

remotae. *Minoris* specimina mea, quae ex Heluetia habeo, partem marem a femina per duas ferę lineas remotam habent, & vniuersa planta sesquipedem forte altitudine adaequat, non vero semper claua ouata est, interdum cylindrica vncialis.

XVIII.

Commelina radice anacampserotidis
DILL. *elth.* p. 94. l. 79. f. 90. Pedunculus non est teres, sed latus ejus caulem respiciens, planum, latus vero a caule auersum, conuexum est. Involucrum est cordatum, carinatum & complicatum, in quo striae longitudinales transversalibus longe manifestiores sunt.

XVIII.

Commelina africana L. Non intra omnem vaginam exteriorem, alia est minima, sed tantum intra eas, intra quas ramus oritur, tunc enim initium rami alia vagina circumdatur, quae in folium non producitur, sed in vagina exteriore latet, ista non multa breuior; Folia autem quae nulos ramos sustinent, altera ista vagina destituuntur.

Inuolucrum est cordatum, compressum, neruis longitudinalibus, nullis reticulatis, instructum.

XX.

Allium umbellatum, foliis fistulosis, compressis, radice obducta reticulo HALL. comm. gott. T. II. radicem senescentem lignosam habet, recta in terram descendente.

XXI.

Synonyma ni fallor & ideo a botanicis colliguntur, ut plantae inde certius cognoscantur & lector certus sit plantam quam coram habuit Autor, esse eamdem cum istius Autoris planta cuius synonymon citatum est. Ergo synonyma non obiter sunt adscribenda. Ergo *scorodoprasum latifolium spontaneum italicum floribus dilute purpureis odoratis* MICH. vel ab *Ampelopraso* vel à *rotundo* separandum erit. Ergo *Allium montanum capite rotundo* C. B. vel à *rotundo* vel à *sphaerocephalo* remouendum. Ergo *Allium montanum bicine latifolium flore purpurascente* C. B. vel ab *arenario* vel à *scorodopraso* remouendum.

dum. Porro *Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite suauerubente sphaerico, non bulbifero, radice laterali* HALL. de All. edit. I. p. 22. n. 8. est ipsissimum *Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, spica sphaerica non bulbifera suauerubente* HALL. de All. edit. 2. p. 353. n. 10. nec aliter vnuquam docuit Dn. de HALLER; Dn. de LINNE tamen prius cum descendentio iungit, posterius vero cum *sphaerocephalo*.

XII.

Thaliētrum foliis decompositis: pinnis sessilibus linearibus sulcatis rugosis: marginibus reflexis scopolifl. carniol. p. 554. n. 4. Plantam ab ipso Cl. SCOPOLI accepi, & cum *Thaliētro foliis lanceo-lato-linearibus integerrimis* ZINN. h. gott. p. 118. contuli, & valde suspicor, cum videam hortensem cum germinibus septem & octo habere caulem sulcatum angulis rufescentem, foliaque rugosa marginibus reuolutis, saepe valde angusta & plerumque integerrima, LINNAEVM vtramque recte coniunxisse, & forte vtraque vna cum *lucido*, tandem in *flavum* degenerat, quod vlti-



mum foliis varia admodum latitudine
ludens coram habeo.

XXIII.

Coryophyllata virginiana albo flore mi-
nore, radice inodora H E R M. Geum.vir-
ginianum LINN. spec. 2. p. 716. n. 1. Fo-
lia radicalia interdum vnicum par pin-
narum habent, interdum duo paria,
Folia caulina ternata, in origine auri-
culata, auriculis dentatis. Petala alba,
calyci aequalia, aut parum maiora,
nunquam in meis breuiora. Calyx bis
5 fidus, segmentis nempe quinque ma-
ioribus & quinque valde exiguis. Pe-
dunculi versus florem parum incrassa-
ti. Semina superne manifeste pilosa.

XXIV.

Malua peruviana LINN. spec. 1. p.
688. n. 4. Pili in caule breues, rarius
gemini, & plures ex eodem puncto.
Folia quinquelobata, plicata, glaberrima,
venosa, inaequaliter dentata, mar-
ginibus subfuscis. Stipulae basi lata,
fine lanceolato. Pedunculus axillaris
nudus, longitudine folii. Spica secun-
da, interdum ramosa. Corolla calyce
mo-

modice maior, purpurea. Semina exasperata. Calyces interdum sessiles, interdum pedicellati, punctati ceterum & venosi.

XXV.

*Saxifragia foliorum margine ciliari, floribus luteis maculosis HALL. enumerat. p. 399. n. I. emendat. I. n. 97. & V. n. 31. Saxifraga autumnalis LINN. spec. I. p. 402. n. 16. Hanc plantam a *Saxifraga petalis latissimis luteis lineatis* HALL. enum. n. 2. *Saxifraga hirculo* L. spec. I. n. 18. abunde distinctam esse, nunc nullum dubium est. Sed adhuc sub iudice lis est, an planta **HALLERI** enum. n. I. siue *autumnalis LINNAEI* & *aizoides* EIVSD. n. 16. re vera different. **HALLERVS** suspicatur non differre, idem manifesto facit **JACQVINVS** fl. *vindob.* p. 240. Dicit enim *sedum minus VI.* siue *alpinum I. CLVSIR* p. LX. esse *autumnalem LINNAEI*, idemque synonymon **CLVSIANVM HALLE** RVS ad suam *primam* refert, & subiungit porro **JACQVINVS** coniecturam, *autumnalem L.* & *aizoidem* vnam esse eamdemque plantam. *Saxifragae**

autem 2dae HALLERI siue *Hirculi* L.
nullam iniecit mentionem. Etsi vero
Cl. SEGVIER suppl. p. 200. *Sedum al-*
pinum flore pallido C. B. synonymum
nempe *aizoidis*, ab *autumnali* diuersum
in Baldo non repererit, forte tamen re-
perient ILL. CRANZIVS aut Dn. de
SCOPOLI plantam in suis alpibus, plan-
tam foliis sedo minori luteo folio acu-
to C. B. siue Triquemadame, similio-
rem, qualia CLVSIVS postulat. Etsi
enim tunc *f. autumnalis* in MAGNI VI-
RI operibus desideretur, tolerabile ta-
men id est, cum videamus plantas etiam
vulgatores interdum a diligentissimis
viris & a CLVSIO praeteruisas esse e.
g. *Trifolium fragiferum frisicum*, vulga-
tissimam plantam, quam demum in Cu-
ris posterioribus a DORTMANNO ha-
bet. Et praeterito anno post tot alio-
rum excursiones *Ranunculum hedercce-*
um L. Gottingae demum reperit Cl.
RÜLINGIVS.

XXVI.

Et omnino Cel. SCOPOLI *Saxifra-*
gae trichodis nomine plantam misit *au-*
tumnali multum similem, diuersam ta-
men,

men, quantum in siccis exemplis vi-
deo, foliorum initii angustioribus &
quasi petiolatis, forte neruosis, floribus
paulo angustioribus, petalis, ni fallor,
lineatis. Cum figura Sedi VI. CLVSII
aliqua habet communia, alia tamen di-
uersa. Inter Saxifragas, quas nume-
rosas a Dn. de HALLER accepi, non
adest. Et in hac *trichode* & in *autum-
nali*, qualem a Dn. de HALLER acce-
pi, folia inferiora ubique magis adgre-
gata sunt, quam superiora, quae ma-
gis remota.

XXVII.

Linum perenne, foliis lanceolatis, ar-
gute mucronatis, calyce mutico HALL.
enum. helv. p. 371. n. 2. folia villis glan-
dulosis pubescentia non habet. De alia
ergo specie loquitur ILL. SCOPOLI
fl. carniol. p. 509. n. 3. & absque dubio.
Linum sylvestre I. *latifolium* CLVSII
hist. p. 317. siue *hirsutum* LINNAEI in-
telligit.

XXVIII.

Silene sylvestris sexta CLVS. hist. p.
289. sq. Hanc plantam ad Silenem co-

nicam pertinere suspicatur Cel. J A C-
Q V I N V S. Sed quaero annon icon-
C L V S I I forte ad *lusitanicam stellato flo-*
re DILL. elth. p. 420. ob habitum &
petala ferrata pertineat, descriptio au-
tem, ob colorem floris, ad *Silenem 5 vul-*
nera L.

XXIX.

Si quidem *Lychnis coronaria* *Diosco-*
ridis sativa C. B. & *Lychnis umbellifera*
montana heluetica. Z A N. re vera diffe-
runt, in alia nota, quam quidem in pe-
talibus emarginatis vel integris discrimen
erit ponendum. Nam *sativa* C. B. siue
coronaria LINN. utique petala habet
leuiter emarginata, qualia B A R R E-
L I E R pingit in *icone* 1006 & Dn. de
H A L L E R describit in *enumerat.* p. 376.
n. i. & huic calyces, antequam corol-
lam excludunt, sessiles sunt, florentes
vero pedunculum habent sesquiuncia-
lem, & talis est, ni fallor, quae nupe-
ris temporibus in Heluetia lecta est,
certe ego non aliam ex ea regione acce-
pi. Z A N O N I autem plantam suam
perfecte umbelliferam pingit, floribus
omnibus sessilibus, petalis magis emar-
ginatis;

ginatis; cum qua **I V S S I A E V S** coniungit Lychnidem coronatam vmbelliferam alpinam flore purpureo **B A R R.** **ic.** 1005. quae in iconē iterum perfecte vmbellifera est, sed floribus longe pendunculatis, & plane non vel parum emarginatis.

XXX.

Viscago foliis angustissimis recuruis
HALL. *Emendat.* I. n. 85. *enum.* *helv.* p. 380. n. 5. Dn. de **HALLER** suae plantae subiungit synonymon *Lychnis alpina foliis angustis reflexis petalis quadripartitis* **SEGV.** *subpl.* p. 186. t. 5. f. 1. Et idem **SEGVIERI** nomen Dn. de **s c o - P O L I** subiungit suae *Lychnidi floribus trigynis, petalis quadrilobis, foliis linearibus.* *Fl. carniol.* p. 504. n. 7. Sed dum plantam ab **Vtroque** **V I R O** missam confero, diuersitas mihi videtur subesse. Planta enim **HALLERI** admodum tenera est, foliis semilineari latis, plerumque curuatis, vel certe ad angulos recte propiores a caule distantibus. **s c o - P O L I A N A** autem planta cum paruitate sua robur tamen habet & in caule & in foliis, quae duplo latiora sunt, an-

gulos acutos cum caule faciunt, summis exceptis, quae ad angulum recto vicinorem recedunt & curuantur. An **HALLERI & SCOPOLIANA** planta auriculas habent? Certe mentionem eorum non injiciunt, nec in siccis specimibus eas detegere valeo. Planta **SEGVIERII** iis instructa est. Dn. de **SCOPOLI** plantae suae ad me missae adscripsit nomen *Silenes quadrifidae* **LINN. syst. nat. X.** p. 1032. qui habet in spec. 1. & 2. synonymon *Caryophylli minimi humilioris alterius exotici flore candido amoeno* **LOB. ic. p. 445.** quae icon apud **CLVSIVM** exstat cum nomine *Lychnidis sylvestris* **III. pannon.** p. 333. siue *Lychnidis sylvestris* **X. EIVSD. hist.** p. 291. & hae icones auriculas habent & plantae **SCOPOLIANAE** similliores sunt, quam quidem **HALLERIANAE.**

XXXI.

Postquam *Caryophyllum sylvestrem* secundum **CLVSI hist.** p. 282. ex Austria obtinui, & cum *Tunica petalis serratis in fauce lanuginosis* **HALL. enum.** p. 382. n. 6. *Excerpt. helv. & ital. litt.*

T. I.

T. I. p. 154. n. 89. contuli, facile vidi,
nomen CL V S I A N V M ab HALLERI
planta ad *Dianthus alpinum LINNAEI*
reuocandum esse.

XXXII. —

Postquam obseruationes DNI DE
HALLER de *Alpine altissima nemorum*
& *aquatica* in *Emendat.* I. n. 80 - 83. &
IV. n. 31. legi, ipsiusque altissimae ne-
morum specimina ab OPTIMO PRAE-
CEPTORE accepi, facile separo utram-
que plantam. Confirmanda nunc su-
perest *Stellaria dichotoma LINNAEI*,
& a vicinis certius separanda.

XXXIII.

Myosotis apetala. *Myosotidis foliis*
ouatis acuminateis, flore calyci aequali va-
rietas apetala in horto nata HALL. h.
gott. 2. p. 157. Hanc & in meo hortu-
lo sponteam reperio. Caulis vel sim-
plex, tuncque optime eam exprimit
Myosotis arvensis hirsuta minor. VAILL.
bot. t. 30. f. 2. vel ramosus brachiatus.
Folia pene ouata, viridia, hirsuta, non
viscida. Petala nulla. Stamina tantum
quinque, antheris effoetis. Tubae
tres

tres & quinque exiguae, vt tamen numerus posterior naturalis esse videatur. Capsulae oblongae fine paulum incuruo decemfido. An sit varietas, & cuiusnam speciei, haec tenus non dixerim.

XXXIV.

Myosotis exigua pentasteman HALL.
enum. helv. p. 384. n. 5. h. gott. 2. p. 157.
 Caulis ex radice plerumque vnicus simplex, vncialis, & sesquiuncialis, raro plures, sed ii quoque simplices. Ex summo vero caule plures egrediuntur pedunculi per aetatem ramosi. Quando vnicus adest caulis tunc is semper erectus est, quando plures, tunc medii erecti sunt, reliqui decumbunt. Stamina tantum quinque fertilia, nulla abortiua. Tubae certo quinque, exiguae, vt lentem adhibeas. Descriptio
Myosotidis hirsutae minoris TOVRN. aut.
de par. p. 120. egregie nostram plantam delineat, si numerum tubarum excipias, quem ternum facit TOVRNEFORTIVS. *Myosotidem autem aruensem hirsutam minorem* VAILL. bot. t. 30. f. 2. nostram esse plantam, dubito, cum VAILLANTII icon nimis magna sit,
 nec

nec is petala adpinxerit, quare eam pro *Myos. apetala* numero praecedente descriptam habeo. Neque ob numerum filamentorum potest esse *Cerastium semidecandrum* LINN. nec *pentandrum* EIVS D. ob petala in nostro emarginata.

XXXV.

Paris RVPP. Etiam filaments staminum persistunt & versus pedunculum reflectuntur, eorumque initium latiusculum tunc incrassatum est & coloratum. Bacca, quam coram habeo, perfecte matura, glebus est, superne & inferne compressus, non tetragonus, germinis fulcis penitus oblitteratis.

XXXVI.

Vaccinium viginosum L. Neque ego vlla in foliis aut petiolis cilia reperire potui, quae in *Arbuto alpina* L. manifesta sunt C L V S I O dicta.

XXXVII.

Ad *Pimpinellam saxifragam* LINNAEVS in *Spec. 2.* p. 378. n. i. E. refert *Pimpinellam saxifragam tenuisfoliam* C. B. sed cum B A V H I N V S suae plantae pe-

peculiarem locum natalem adsignet, lacum nempe Geneuensem, addatque se semen non vidisse, vix probabile est illum de vulgatissima planta loqui potuisse; & Ipse LINNAEVS in eodem opere p. 374. n. II. eamdem *Pimpinellam tenuifoliam* C. B. ad *Seseli saxifragum* refert. HALLERVS in *Emendat.* I. n. II4. suspicatur esse suum *Seseli foliis linearibus triplicato-pinnatis, caule vaginoso*, quod cum nomine *Seseli annui* LINN. a JACQVINO missum est. Quando vero C. BAVHINVS suae plantae adsignat folia intenues primum, dein pene capillares partes divisa, in HALLERIANA autem foliola omnia vbiuis aeque lata sint, tunc etiam ab hac differre videtur.

XXXVIII.

Etsi vero Dn. de LINNE, synonymon TOVRNEFORTIANVM, quod Dn. de HALLER ad *Seseli* priore numero ex *Emend.* I. n. II4. citatum refert, in *Spec. 2.* p. 372. n. 3. cum alia planta coniungat, fide tamen ILL. JACQVINI *Seseli* hoc HALLERI & annuum. L. coniunxi. An vero *Foeniculum*

lum sylvestre annuum tragofelini odore,
vmbella alba VAILL. bot. t. 9. f. 4. hoc
referri debeat, parumper dubito, non
quidem ideo, quod VAILLANTIVS
vnum ramum pinxerit ramosum, hu-
iusmodi enim exemplar ex Heluetia
coram habeo, cum tamen reliqua ra-
mhos habeant simplices; sed dubium
mouent foliola quae VAILLANTIVS
nimiris lata & breuia sistit, vt & inuo-
lucrorum partialium pictura, quae in
nostra planta flores si non superant, ta-
men adtingunt cum in ione VAIL-
LANTII pedunculis dimidio breuio-
res sint.

XXXIX.

Inter plantas meas *Sium* est *Gryphis-*
waldiae olim lectum, quod pro *Sio lati-*
folio habui, & etiam nunc habeo, et si
inter foliola Inuolucri vniuersalis pau-
ca adsint pinnatifida, ea nempe quae
prae reliquis lata sunt, & quamuis vmb-
bellae axillares pedunculatae sint. Ni-
mirus enim est consensus inter plantam
Gryphiswaldensem & *Sium latifolium*
Göttingae lectam, quam ut ex ista vni-
ca nota, nempe inuolucro pinnatifido,
se.

separari possint. Dico ex vnica nota, nam etiam in Sio latifolio vmbellas axillares perpetuo pedunculatas reperio, & foliola aliquando superiora angulis posticis sinu ita diuisa, ut latus certe exterius magis promineat. Si ergo *angustifolium* LINN. spec. 2. p. 1672. ab eius *latifolio* distinctum, aliis cum notis id erit determinandum. *Suum* quoque *Sisarum* ex foliis floralibus ternatis tuto distingui non potest, nam & in *latifolio* haec frequenter ternata sunt.

XXX.

Perfoliatum angustifolium montanum
COL. ecphr. I. p. 247. Radix annua. Folia sessilia semiamplexicaulia, non petiolata, valde parum falcata. Rami interdum denuo ramosi. Involucrum universale a tribus ad quinque foliola habet modice inaequalia, sustinens pedunculos inaequales. Involucrum particulare longe plerumque pentaphyllum, pedunculis partialibus duplo longius. Vmbellulae particulares aliquando sex adsunt, quarum quaelibet septem ad decem continet flores ex pedunculis inaequalibus; Non solus enim cen-

centralis super reliquos insigniter semper eminet, sed ex reliquis etiam aliqui eamdem adtingunt altitudinem aut super breuissimas eminent. Petala lutea, inflexa.

XXXXI.

Astrantiae albae nomine a Dn. de SCOPOLI missa, videtur esse *Astrantia floribus pedunculatis, seminum angulis alato plicatis fl. carniol.* p. 338. n. 4. An ab *Astrantia foliis quinquelobis, lobis tripartitis* HALL. helv. p. 439. n. 1. diuersa? Non dum videtur; eadem enim in planta SCOPOLIANA cum eadem altitudine omnia sint minora, & radii petala vix adtingant, & in semine etiam diuersitas adesse dicatur, denuo tamen haec utriusque plantae semina conferantur, in siccis enim nihil discriminis reperio. Etiam folia in *maiore* triloba dici possunt, lobis lateralibus denuo profundissime incisis, eodem modo ut se res habet in *alba*, & prouti Dn. de SCOPOLI ea ex *alba* describit. Ab *Astrantia foliis agitatis septenis* Ec. HALL. enum. n. 2. haec *alba* certo differt, & foliis & semine.

XXXXII.

Scandicis infestae nomine a Cl. MARTINI, missae plantae caulis est subsca-
ber & fere laevis, humanae altitudinis,
non caius, lineis rufis inferius percur-
sus. Folia pinnata, pinnis denuo pin-
natis vel incisis, subtus glauca, super-
ne breuissimis pilis obsita, habitu ta-
men glabro, iuniora viridia, per ae-
tatem ruffa vel nigrescentia. Involu-
crum vniuersale nullum, particulare ex
ligulis angustis horizontalibus, longi-
tudine pedunculorum partialium. Um-
bellae particulares sex ad nouem, den-
sae. Petala alba in floribus exteriori-
bus inaequalia siue radiata inflexo-cor-
data, in interioribus aequalia, semina
exteriora hirta, interiora glabra, omnia
ouata. Tuba persistentes, primum
rectae, dein reflexae. Odor plantae
nullus. Patria, ni fallor, Aegyptus
est.

XXXXIII.

Myrrhis radice lignosa perenni foliis
hirutis, seminibus flavis, obscure stria-
tis HALL. h. gott. 2. p. 184. & apud
Rupp. p. 282. t. V. quam *Chaeophylli*
aurei

aurei nomine, ab *hirsuto* nunc separat
LINNAEVS, caulem habet non magis
 aequalem quam quidem *sylvestre* LINN.
 potius mihi videtur versus cuiuslibet
 articuli finem superiorem in *aureo* etiam
 magis intumescere quam in *sylvestri*.

XXXXIV.

Pimpinella agrimonoides odorata.
BARR. *icon.* 632 caules habet manife-
 ste angulosos. Planta ceterum *hirsuta*,
 graui odore, filamentis perbreuibus.

XXXXV.

Centauro palistri luteo minimo RAI,
 a **VAILLANTIO** *bot.* p. 32. t. 6. f. 3. egre-
 gie picta video pro synonymo *tubungi*
Centaurium luteum pusillum C. B. P.
 278. An recte? **BAVHINVS** enim sua
 plantae iungit *Centaurium luteum nouum*
COL. *ecphr.* 2. p. 78. t. 77. Ego plan-
 tam, **VAILLANTII** iconi perfecte respon-
 dentem duce **HALLERO** copiosissime
 legi in ducatu Cellensi circa Engsen,
 corolla perpetuo quadrifida, laciniis
 magis obtusis quam in **COLVMNAE** ico-
 ne, calyce pro portione plantae multo
 latiore quam calyx in **COLVMNAE** fi-

gura, qui tamen ibi triplo longior pingitur, quam in nostra planta est, deinceps etiam COLVMNAE planta ideo non videtur esse posse VAILLANTIANA, quod in tanta sua magnitudine nimis simplex sit, pedunculosque habeat breues, cum nostrae multo minora exempla perpetuo ramosa sint pedunculosque habent praelongos, folia vero longe angustiora & breuiora quam icon COLVMNAE. Verosimilius ergo est plantam COLVMNAE, adeoque & c. BAVHINI esse varietatem Centaurii minoris vulgaris purpurei. Et ita RAIUS hist. p. 1092. se reperisse sibi videtur.

XXXVI.

Primula foliis petiolatis ouatis serratis hirsutis scapo paucifloro HALL. enum, n. 6. emendat. I. n. 147. rarer. n. 634. omnino differt a *Primula minima* IACQV. fl. vindob. p. 32. obs. I. t. 14. vti ex plantis, ab utroque VIRO missis, patuit. Icon vero CLVSII hist. p. 305. pertinet ad plantam IACQVINI, ab HALLERI planta multum recedens. Folia in HALLERI planta sunt ex lanceolatis ouata, non resecta, anterius ita ferrata, vt etiam

iam laterum aliqua pars dentes habeat, petiolata, hirsuta. Scapus est absque eiusmodi longis stipulis quales CLVSII & IACQVINI planta habent. Calyx in Heluetica multo brevior. Haec ex siccis speciminibus, quibus ex recentibus plures siue dubio addi poterunt notae.

XXXVII.

Lysimachia punctata LINN. staminum filamenta basibus in tubum connata habet.

XXXVIII.

Alkekengi indicum glabrum chenopodii folio DILL. *h. elth.* p. 13. t. 12. f. 12. DN. DE LINNE' & cum *Physalide angulata*, & cum *pruinosa* spec. 2. p. 262. & 263. n. 7. & 10. coniungit. Videtur tamen DILLENII planta a *pruinosa* remouenda esse, ob folia quae habet glabra, antherasque coeruleas, & ramos angulosos vbiuis nudos, ad *angulatam* vero relinquenda.

XXXIX.

Verbascum caule ramoso, spica laxa, foliis inferioribus petiolatis oblongo-acu-

tis denticulatis glabris, flore obsolete fusco TREW ehret. p. 3. t. 16. f. I. Cum *Verbasco nigro* TRAG. p. 217. adcurate contuli, nec ullam inueni diuersitatem, praeter colorem & magnitudinem corollae, quae in fusco duplo fere maior est, etsi plantae eiusdem sint magnitudinis; folia contra in nigro fere maiora & constantius ad caulem petiolata sunt. Ceterum stilus in *fusco*, colore est *fusco*, stigma autem viride.

L.

Viola HALLERI Enum. n. 8. & 9. in *Emendat enim coniungit*, vtique ab *alpina JACQVINI* differt, utriusque enim specimina, etsi sicca, coram habeo, ex quibus adparet in *HALLERIANA* folia in vniuersum duplo breuioribus petiolis instructa esse, & raro ac forte nunquam ad basin rotundata, sed plerumque ibi adtenuata. At in primis calcar in *HALLERIANA* longitudine petalis est aequale, cum in *JACQVINI* planta calycem non multum superet & magis obtusum sit.

LI.

Veronicae alpinae bellidis folio hirsutae HALL. enum helv. p. 531. n. 9. t. 12. f. I.

f. I. *Ver. bellidoidis* LINN. spec. I. p. II. n. 10. specimina heluetica mea, ad caulem paria foliorum habent duo & tria, & ita pingit Dn. de HALLER.

LII.

Lepidium caule repente, foliis ovatis amplexicaulibus HALL. enum helv. p. 546. n. 3. emendat. 2. n. 8. quod Cl. ALLIONI cum eodem nomine bene pinxit pedem. t. 4. f. I. Iconem BARREL. 848. *Thlaspi nempe montanum ferrato cepeae folio* huc pertinere, nullum est dubium, sed de altera eius iconē 1305. n. 2. *Thlaspi subrotundo folio, utriculo gruinali* disputatur. HALLERVS & ALLIONI huc referunt, IVSSIEVVS autem & GOVAN. ad *Bursam pastoris montanam folio globulariae* I. R. H. siue *Thlaspi montanum* LINNAEI. Verum TOVRNEFORTII planta praeter alias diuersitatis notas folia longe plura habet in caule, quam quidem BARRELLIER pingit, siliculamque emarginatam. Sed an ideo certe est planta HALLERI & ALLIONI? Videtur mihi differre foliis ad caulem nimis paucis, habitu nimis simplici & erecto, petalis nimis exiguis, et si siliqua conueniat. For-

te vera BARRELIERI planta nuperis latet. Ceterum HALLERVS plantae suae corollam adsignat aequalem, LINNAEVS vero in *syst. nat.* X. p. 1129. subaequalem, qualem etiam BARRELIER in iconē 848. pingit. ALLIONI de aequalitate petalorum filet, videor tamen mihi in eius iconē aliquam inaequalitatem reperire.

LIII.

Lithonthlaspi quartum carnoſo rotundo folio COL. *ecp̄ar.* p. 279. t. 277. fig. inferior, quae optima. Folia succulenta, glauca, conferta, lanceolato elliptica, superiora angustiora. Calycis foliola angusta, subaequalia. Petala vnguis latis, fine pene angustiore, certe non latiore, parum reclinato, non emarginato, lineis roseis latiusculis pīto. Filamenta duo breuiora incurua, duo recta firmiora in fine diuergentia ut antherae pedunculatae esse & lateraliiter adstare videantur. Quae structura eodem iure nouo generi ansam dare posset, ac quidem ista antherarum in Inulae LINN. genere. Germen ouatum absque stilo, stigmate globoſo crasso. Pedunculus filiculae inferius rectus, ſupe-

superius curuus, reflexus. Silicula obcordata resupinata, sursum caua, deorsum conuexa, hilo excisa, absque stilo, margine crenato. LINNAEVS & ZINNIVS cum nomine COLVMNAE supra posito coniungunt *Lepidium foliis pulposis subrotundis, antheris lateralibus* HALL. h. gott. p. 245. Sed cum ista petala habeat emarginata tubamque longam nostra esse nequit. *Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore, plana* & *cordata siliqua* BARR. ic. 845. plantam nostram bene exprimeret, nisi silicularum margo absque crenis pingetur. In *Thlaspi flore albo siliqua triangulari crenata* BARR. ic. 846. ex ipso nomine flos albus est, & in icona, nostram plantam quoad reliqua bene exprimente, hilus in silicula deficit.

LIV.

Vberius indagandum esse videtur an *Sisymbrium bursifolium* LINN. spec. 2. p. 918. n. 9. & *Hesperis dentata* EIVSD. p. 928. n. 6. re vera differant. LINNAEVS ad utramque plantam citat *Hesperidem flore albo minimo, siliqua longa, folio profunde dentato*, pro priore quidem ex BOERHAAVIO, pro alte-

ra ex DILLENI O. Sed ipse DILLENIUS ad suam plantam BOERHAAVIVM citauerat, vt dubium vix esse debeat BOERHAAVII & DILLENII plantas fuisse diuersas. Dn. de HALLER in *Emendat.* 3. n. 231. dicit, *Sisymbrium foliis radicalibus ouatis dentatis caulinis pinnatis, pinnis linearibus, extrema maxima*, in loco citato vberius descriptum, sibi cum planta DILLENII in horto Gottingensi olim culta, omni dote eamdem videri. An forte *Hesperis dentata* est planta hortensis, *Sisymbri. bursifolium* autem spontanea. Ex descriptione & nomine LINNAEI id certum esse videtur, *bursifolium* esse idem cum HALLERI Sisymbrio, si id excipias, quod pedicellorum ex *bursifolio* descriptio potius DILLENIANAE plantae, quam ex horto Gottingensi olim accepi, magis conuenire videatur, quippe qui in meo exemplo vix lineae longitudinem habent, cum in HALLERIANA non maiori planta, certe durorum lineorum longitudine sint.

LV.

Phaca caulescens erecta subhirsuta, leguminibus cordato-oblongis inflatis subpilosis;

losis, in *Observ.* a 1762. editis descripta, non est *Phaca frigida* LINNAEI. Mea potius planta videtur ab *Astragalo Onobrychide* L. non multum differre, & forte eadem est.

LVI.

Phaca frigida JACQV. vindob. p. 265. omnino est *Astragaloïdes caule erecto ramoso, siliquis semiqualibus* HALL. enum helv. p. 569. *Phaca caulis erectis ramosis, foliis ouatis tredecim.* Emendat. 2. n. 27. Comparaui enim specimina ab utroque viro missa. Sed DN. DE LINNE' nunc *Phacam frigidam & alpinam* coniungit. Velit autem denuo conferre, videbit *alpinae* esse folia minora, numerosiora, ad decem paria & ultra, stipulas florales diuersas, calycem breuiorem, floris strueturam diuersam, & quae praeterea DN. DE HALLER docuit in *Emendat.* 2. n. 27. & 3. n. 234.

LVII.

Astragalus austriacus JACQVINI cum *Astragalo sulcato* LINNAEI magnam adfinitatem habere videtur, & forte idem est, etsi enim in altero caulis dicatur erectus esse, in altero procumbens; etsi etiam folia in *austriaco* dicant-

dicantur emarginata, in *sulcato* angusto-lanceolata siue linear-lanceolata, haec forte discrimina, cum reliqua consentiant, non tanti momenti sunt, & legumina in *Onobrychide secunda* CLV-SII, quam iconem non malam esse J A C-
Q V I N V S adserit, partim erecta pinguntur, qualia re vera ex parte sunt in vnico specimine *austriaci* a CL. J A C-
Q V I N O misso, dum reliqua leuiter propendentes, neque figura leguminum differt. Cum *Astragalo alpino LINNAEI*, qui est *Astragalus HALLERI decimus* in *Enum. helv.* p. 568. *Emendat.* 2. n. 26. in tanta vtriusque diuersitate vix conferri debet, quippe cui flores maiores in spicam pene capitatam collecti, siliquae intra calycem pedunculatae, ita propendentes ut pedunculo pene parallelae sint. LVIII.

Scrophularia peregrina Cam. *hort.* t. 43. Huius descriptionem, quod nullibi repererim, etsi planta dudum notatur, ex hortensibus subiungo. Tota planta glaberrima est, & insigniter foetet. Radix fibrosa absque nodulis. Caulis erectus, pedalis & sesquicubitallis, quadrangulus, non alatus. Folia cor-

cordata; petiolata, petiolis basi decurrentibus, inferius obposita petiolis longioribus, superius alterna petiolis brevioribus, omnia dentata, dentibus singulis interdum in duos dentes subdivisis. Pedunculi ex alis foliorum raro bistori, saepe tres, quinque & plures flores habent. Calyx pene ad basin usque diuisus, segmentis angustis acutis. Corolla coloris sanguinei. Tubus globosus inflatus brevis. Laciniae duae superiores semiincumbentes maiores erectae, duae laterales paulo minores similiter rectae, quinta imarreflexa. Squamula exigua in fauce floris sub laciinis superioribus. Stamina quatuor ex basi tubi floralis orta, quorum duo matura eaque pene recta, longitudine tubi floralis, duo seniora filamentis adhuc recuruis. Fruktus pene globosus, qui ob tubam persistentem acuminatus dici possit. An *Scrophularia flore rubro Camerarii* I. B. 3. 422. huc pertineat dubitat ZINNIVS, sed cum BAVHINV'S ico-ne CAMERARII vtatur, omniaque sua de hac planta ex eodem CAMERARIO desumferit, et si icon, ipso fatente BAVHINO, a pictore omissis capsularum apicibus,

cibus, paulum depravata sit, tuto planta **BAVHINI** ad nostram referri potest. Neque, a mea certe planta, differt *Scrophularia peregrina frutescens foliis teucrii crassioribus* **HALL.** *h. gott.*
 2. p. 310. Dubium tamen est, annon planta **HERMANNI** cum eodem nomine in *h. lugd.* p. 545. & 547. descripta & depicta, a nostra differat. Habet enim **HERMANNVS** folia omnia sessilia vnguem vix excedentia, quae in nostris multo maiora, lacinias calycis rotundatas, stamina eminentia.

LVIII.

Pedicularem caule simplici, spica foliosa; corollis galea obtusissimis integris; calycibus quinquedentatis **JACQV.** *vin-dob.* p. 112. & p. 253. eamdem esse cum *Pediculari foliis alternis, pinnis pinnatis, floribus ex spica florigera longe eminentibus* **HALL.** *enum helv.* p. 623. II. 8. t. 17. f. 2. ex speciminibus ab Vtroque **VIRO** missis didici. Videtur vero *Alestorolophus alpina prima* CLVS. *hist* CCX. a planta **JACQVINI** remouenda esse, & pictura & descriptione diuersa. **DN.** de **HALLER** plantam CLVSII ad speciem suam primam, quae est *tuberosa*

LIN-

LINNAEI, verosimilius retulerat, etiam si neque istam satis referat. Ceterum dubium quod **ILL. JACQVIN** de **LINNAEI** *comosa* mouerat nunc in *specierum* edit. 2. ipse soluit **LINNAEVS**, dum **HALLERI** nomen sub *comosa* deleuit.

LX.

Teucrium supinum LINN. a montano vtique differt odore aromatico, monente ita in litteris **ILL. JACQVINO**. Cum itaque **DN. DE HALLER** in *Enum. helv.* p. 632. n. 4. dicat Chamaedrin istam n. 4. huiusmodi odore praedicam esse, omnino & *supinum* *Teucrium* & *montanum* Heluetiae indigenum sit, necesse est, etsi omnia specimina a **PRAECEPTORE** variis annis missa, odore isto destruantur, qui in siccissima **JACQVINI** planta admodum grauis est. *Polium* ergo VIII. **CLVS. hist.** p. 363. quod inodorum sit, non potest pertinere ad *supinum*.

LXI.

Nardo celticae similem inodoram C. B. pin. p. 165. *prodr.* p. 88. **LINNAEVS** & ad *saxatilem* suam & ad *montanam* simul refert. Sed descriptio **BAVHINI** fatis

satis demonstrat, nomen istud cum *saxatili* relinquendum esse, & a montana remouendum. Quod vero C. B A V H I N V S *saxatilem* in eadem pagina bis posuerit, nempe primum cum nomine *Valerianae alpinae nardo celticae similis* & dein cum nomine supra posito, ideo forte factum est, quod plantae eius, & quas partim a B V R S E R O acceperat, folia habuerint C L V S I A N A iconē duplo latiora & integra, quale specimen a D N. SCOPOLI missum, coram habeo.

LXII.

Scabiosa cretica, *capitulo pappos mentiente* I. R. H. *coroll.* p. 34. Est planta annua, pedalis & bipedalis, erecta, ramosa, ramis patentibus. Folia mollia, subalbentia, hirsutula, subcrassula, ad terram petiolata, ouata, ferrata, reliqua pinnatifida, pennis paucis, longis, angustis. Flores in pedunculis praelongis axillaribus terminalibusque. Calyx ex vnica fere serie squamarum foliacearum, quarum aliquae corollas parum superant, reliquae iis aequales, vel etiam minores sunt. Corollulae in ambitu ex violaceo albent, easque potius quadrisidas dixerim, quam quinque-

quefidas, nam segmentum superius, quod simul reliquis minus est, modice saepius incisum est, interdum tamen paulo profundius, reliqua tria segmenta modice maiora sunt, inque iis medium iterum paululum maius. Omnia vero haec segmenta erecta sunt nec radiantia. Corollulae in disco similiter quadrifidae vel quinquefidae dici possunt, nam unum segmentorum similiter semiincisum est. In uniuersum autem corollulae in disco minores sunt & albidiiores. Germen cinetum inuolucro modice laxo in anulum subtumidum non membranaceum terminato. Ex seminis apice stilus breuissimus, cuius anulus duodecim forte cilia fert fusca, mollia, plumosa, corollulae pene aequalia. Nulla inter flores folia, nec pili.

LXIII.

Arctium alpinum JACQVIN vindob.
p. 276. certo est *Carduus mollis lappae*
capitulis, foliis imis acanthi superioribus integris HALL. enum. helv. t. XIX.
docente id planta quam in horto Gottingensi cum hoc nomine olim ostendit
PRAECEPTOR & dein aliquoties ex Hel-

uetia misit, collata cum specimine a JACQVINO misso. Sed velim denuo peruideat ILL. VIR *Arctium* suum. *Personatum*. Valde vereor ne sit *Cardui crispi* varietas, qualis Gottingae frequenter nascitur, foliis nempe latioribus, incisis, infra tomentosis, & vbi planta alpina nunquam sponte nata reperta fuit.

LXIV.

Cirsium aculeatum foliis tomentosis spinos, capitulis cylindricis subhirsutis HALL. h. gott. 2. p. 359. Est *Carduus leucographus* LINN. Spec. i. p. 820. n. 2. Vere satum, eodem anno floret. Radix fibrosa. Caulis erectus, ramosus, foliis decurrentibus alatus. Folia semipinnata, pinnis inaequalibus dentatis, dentibus in spinulam terminatis, subtus tomentosa, superne hirsuta, venis albicantibus debiliter pecta. Pedunculi non longi, tomento albo obducti frequenter duo & tria capitula sessilia sustinent. Calyx tomentosus; squamis multorum ordinum angustis in spinulam terminatis, squarrosis. Corollae Jaciniae aequales, nec unica profundius separata. Pappus in semine forte sim.

simplex. Placentae pappus & femina
visco conglutinata.

LXV.

Carduus erisithales JACQV. vindob.
p. 146. & 279. obseruat. I. p. 28. t. 17.
idem est cum *Cirsio foliis amplexicauli-
bus pinnatifidis subspinosis, floribus cer-
nuis calycibus inermibus* SCOPOLI fl.
carniol. p. 358. n. 6. Qui plantam in-
uenit, vel certe restituit. Neque vi-
detur differre *Cirsium foliis pinnatis ser-
ratis, squamis calycis recurvis* HALL.
emendat. 3. n. 244. Dn. de LINNE' ad
Cnicos forte ob aliquam cum *Cnico ole-
raceo* in habitu similitudinem retulit,
etsi calyx bracteis non obuallatus sit,
nec squamas calycinis ramosas habeat.
Erisithalen LVGD. p. 1094. ob picturam,
descriptionem & colorem floris diuer-
sam aegre hoc referto, adeoque nec *Car-
duum pratensem, foliis tenuibus lacinia-
tis* C. B. P. 376. *Cirsio foliis ciliatis, imis
ouatis, superioribus semi-pinnatis* ab HAL-
LERO dudum descriptum & depictum
in *Comm. gott.* 1751. p. 206. t. 8. proxi-
mum est, differt tamen floribus pauci-
oribus, calyce, & colore floris, & ad
HALLERI plantam potius pertinere vi-

dentur synonyma flore purpurascente
a Dn. DE LINNE' *Erisithali* subiecta.

LXVI.

Asteris secundi supini CLVS. seu
Buphtalmi maritimi LINN. stigma flos-
culorum hermaphraditicorum non est
simplex siue indiuisum, sed manifeste
bifidum, simile stigmati femineorum.

LXVII.

Achillea inodora LINN. Plantae, cu-
ius semen cum hoc nomine accepi, ra-
dix annua est, tenuis, paucas e lateri-
bus fibras demittens. Folia pulposu-
la glauca linearie cuneiformia dentata,
dentibus longis paucis, laciniarum si-
milibus, fine foliorum plerumque la-
tiore trifido, in superioribus diuisione
simplici, in inferioribus denuo & in-
aequaliter diuisa. Flores in corymbum
arctissime congesti, breuissime pedun-
culati. Calyx ouatus, inbricatus squa-
mis cauulis obtusis margine membra-
naceis, exterioribus minus, interiori-
bus magis. Radius nullus. Flosculi
lutei omnes androgyni, tubulosi, quin-
quedentati, segmentis parum reflexis.

Squa-

Squamae inter flosculos latae membranaceae, pellucidae, dorso eminente viridi, non emarginatae, exteriores angustiores, interiores longiores, omnes flosculis paulo breuiores. Semen coronatum corona exigua membranacea, non papposa. Valde vereor LINNAEVM hanc plantam bis posuisse. Primum cum nomine *Athanasiae annuae* Spec. 2. p. 1182. n. 9. & dein sub titulo *Achilleae inodora*e p. 1265. n. 9. Synonymon enim Achilleae inodora ex BOERHAAVIO citatum, ipse BOERHAAVIUS cum Synonymia Athanasiae annuae coniungit. Mea planta certo est *Sontolina quae Agerratum laciniatis foliis inodorum africana*num HALL. h. gott. 2. p. 375.

LXVIII.

Cel. JACQVINVS *Solidaginis alpinae tomentosae* nomine omnino loquitur de *Senecione* foliis *lingulatis tomentosis simplicissimis* HALL. enum. helv. n. 18. vti ex planta a Cel. JACQVINO missa adparet. Et certum est, etsi folia *tomentosae* a foliis *alpinae nudae & alatae* egrégie diuersa esse videantur, superiorem tamen harum plantarum partem ita si-

milem esse, vt vnam pro altera facile sumas, vnde haec tenus. Cel. JACQVINO fidem adhibeo, dicenti, specimina intermedia docuisse, varietates esse. Id tamen mirum est Florarum germanicarum autores plerosque RUPPIVM, VAN LINDEERN, DE BERGEN, DILLENIVM, KRAMERVVM, SCOPOLI, solam *tomentosam* recensere, vnuis forte LEYSERVS cum BUXBAVMIO *nudam* simul habet. Sed praeter *tomentosam* Dn. de LINNE' nunc etiam *helenitin* coniungit, circa Nordheim abunde prouenientem, vbi tamen haec tenus nec *tomentosa* nec *nuda* reperita est. Videat vero Dn. de LINNE' annon *helenitis* cum *palustri* spec. 2. p. 1243. n. 6. tutius coniungi possit. In planta certe, quam Berolini lectam olim donauit Cl. RAMSPECK, Celeberrimus Basileensium Professor, non aliam ab *heleniti* diuersitatem reperio, praeter caulem simpliciorem, foliaque angustiora minusque dissecta; & omnino circa lacus nostros mixtim nascuntur plantae quae utriusque LOBELII iconi p. 347. respondent.

LXVIII.

Hieracim foliis lanceolatis glaucis caule brachiato multifloro HALL. emendat. 2. n. 96. & *Hieracium porrifolium* JACQVINI easdem esse plantas, docuerunt specimina ab Utroque viro missa. Et si enim plantae HALLERIANAE foliis plerumque sint rariter dentatis, caule que pene nudo, monuit tamen iamiam LINNAEVS de utraque varietate, & olim IOH. BAVHINVS varie eam plantam pinxit. Plantam HALLERI alias quoque Clarus Vir misit cum nomine *Hieracii blattarioidis* LINNAEI, abunde diuersi. *Hieracium autem VI. montanum* CLVSII est *Hieracium incanum* LINN. spec. I. quod in edit. secunda cum *Hieracio hispido* coniungit, JACQVINVM in fl. vindob. p. 269. sequutus.



ettare

een

A6
—

NOUVELLES PUBLICATIONS

QUI SE TROUVENT

CHEZ J.-B. BAILLIERE,

LIBRAIRE DE L'ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE,

Rue de l'École-de-Médecine, 17, à Paris.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIERE, 219, REGENT-STREET.


DICTIONNAIRE DES TERMES DE MEDECINE, DE CHIRURGIE, DE PHARMACIE, des Sciences accessoires et de l'Art vétérinaire, de P.-H. NYSTEN; revu successivement et considérablement augmenté en 1824, 1833, 1839 et 1841, par MM. Bricheteau, O. Henry et J. Briand; *neuvième édition* revue de nouveau par le docteur A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie de médecine, etc. Paris, 1845, in-8° de 860 pages à 2 colonnes, avec 107 figures intercalées dans le texte. 11 fr.


Les progrès incessants de la science rendaient nécessaires, pour cette *neuvième édition*, de nombreuses additions, une révision générale de l'ouvrage, et plus d'unité dans l'ensemble des mots consacrés aux théories nouvelles et aux faits nouveaux que les progrès de l'anatomie, de la physiologie, etc., ont créés. C'est M. le docteur Jourdan, connu par sa vaste érudition et par son savoir étendu dans la littérature médicale, nationale et étrangère, qui s'est chargé de cette tâche importante.

BIBLIOTHEQUE DU MEDECIN-PRATICIEN, ou Résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques, anciens et modernes, publiés en France et à l'étranger, par une société de médecins, sous la direction du docteur FABRE, chevalier de la Légion-d'Honneur, auteur du Dictionnaire des Dictionnaires de Médecine, rédacteur en chef de la *Gazette des Hôpitaux*. — Ouvrage adopté par l'Université, pour les Facultés de Médecine et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du royaume; et par le ministère de la guerre, sur la proposition du conseil de santé des armées, pour les hôpitaux d'instruction. Paris, 1843-1847.

Cet ouvrage, accueilli dès le principe avec faveur par les sociétés savantes, par la presse médicale, par les médecins et les élèves, vient d'être adopté par l'Université sur un rapport sérieux, longuement motivé et très-favorable de l'un des membres du conseil supérieur pour l'examen des livres, et sur l'approbation la plus large accordée par le Conseil royal de l'instruction publique.







New York Botanical Garden Library

QK314 .W4

Weigel, Christian E/Flora Pomerano-Rugic

gen



3 5185 00122 3740

